

Profil II (Abb. 5 bis 8 und Tab. 1)

Schicht (Horizont)	altes A/C-Profil	rezentes Profil über Lessivé- Profil	cm	
I	—	A _p	0—22	dunkelbrauner, humoser, sandiger Lehm, vereinzelt Ziegelsteinbrocken, Ackerzone
II	—	}	22—76	hellbrauner, sandiger Lehm, im unteren Teil weißgraue Einsprenkelungen (Staubsand)
III	—		76—103	schwach brauner, sandig schluffiger Lehm mit gering erhöhtem Humusgehalt (kurzfristiger A-Horizont)
IV	—		103—126	hellbraun bis grauweißer, sandiger Lehm mit weißgrauen Einsprenkelungen, nach unten zu Linsen von eingeschwemmtem Gesteinsgrus, in 1,15 m Tiefe ein kleiner rotbrauner Scherben (15. Jh.)
V	—		126—136	weißgrauer, sandiger Lehm mit drei dunkelbraunen 0,1 bis 0,2 cm starken, tonigen Bändern
VI	—	}	136—190	Schwemmschichten unterschiedlicher Korngrößenzusammensetzung (Bodenprobe 7: dunkelbrauner Lehm; Bodenprobe 8: weißgrauer, sandiger Lehm) mit Zwischenlagen von Grus (Bodenprobe 9) und verlagertem bandkeramischem Grubenmaterial, in 1,80 m Tiefe ein kleiner rotbrauner Scherben (15. Jh.) sowie zwei vorgeschichtliche Scherben
			C	

Fortsetzung siehe Seite 15