

Schwein und Wildschwein (Fortsetzung)

Tibia

Gruppe	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
1) Größte Breite dist.				27	28	28	29	30	30	30	30	31	
2) Kleinste Breite der Diaph.				17,5	18,5	19	19	18	19	21	21	20,5	
3) Kleinster Umfang der Diaph.				51	53	58	56	55	56	58	58	62	

Gruppe	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
1)	32	32	32	32	32	32	33	33	—	—	—	—	—
2)	20	21	22	22	22,5	—	22	—	16	16	17	17,5	18
3)	60	61	62	65	65	—	64	—	47	49	50	51	53

Gruppe	I	I	I	II	II	II							
1)	—	—	—	29	29	29	30	30	31	31	31	31	33
2)	18	18,5	19	17	19	21	20	21	21	21	21,5	—	22,5
3)	54	56	58	51	55	59	60	61	58	59	61	63	—

Gruppe	II	III	III	III	III	III	III	III	I	I	I	I	I
1)	—	29	31	31	32	32	—	—	34	35	35	36	
2)	23	19,5	18,5	19	21	—	16,5	20	24	23	25	23,5	
3)	65	57	56	56	61	—	50	59	—	68	—	70	

Gruppe	WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS
1)	I	I	I	I	I	I	II	II	II	II	II	II	II
2)	37,5	38,5	39	40	40	—	37	38,5	38,5	38,5	40	41	
3)	24	26	26	26	27	25	23	24	24	25	26	26,5	

Gruppe	WS	WS	WS	WS	WS	WS
1)	II	II	II	II	II	III
2)	41	42	43	44	—	39
3)	26,5	27	28	—	27	—

Calcaneus

Gruppe						I	I	I	I	I	I	I	I
1) Größte Länge						82	90	—	—	—	—	—	—
2) Größte Breite						24	26	22	25	27	27		
3) Höhe am Proc. lateralis						31,5	33	30	35	32	34		
4) Länge des Proc. calcanei am oberen Ende						47	47	—	—	—	—	—	—
5) Kleinste Breite des Proc. calcanei						10,5	11,5	9	12	10,5	10,5		
6) Widerristhöhe (Teichert 1966) in cm						76,5	84	—	—	—	—	—	—

Gruppe	I	II	II	II	II	I	I	I	I	II	II	III
1)	—	79	83	84	95	103	104	107	—	104	—	105
2)	27	23	21,5	23	26	29	31	29	30	31	31	30
3)	36	31	28	31	36	41	39	41,5	40	40	40	39
4)	62	45	49	52	55	59	61	62	—	60	—	61
5)	12	12	10	10	12,5	15	14	14	14	15	12,5	14
6)	—	74	77,5	78	89	96	97	100	—	97	—	98