

wässrige Schicht eine blaßrothe Färbung angenommen hat. Zur Erzielung dieser Färbung sollen nicht mehr als 5,4 ccm und nicht weniger als 4,1 ccm Lauge erforderlich sein. Der zum Titriren nicht benutzte Theil der wässrigen, salzsauren Lösung soll die Reaktionen des Morphinhydrochlorids geben.

Eine Regelung des Morphingehaltes soll nur durch Mischen zweier verschieden morphinreicher Opiumsorten bewerkstelligt werden.

Vorsichtig aufzubewahren.

Größte Einzelgabe 0,15 g.

Größte Tagesgabe 0,5 g.

Oxymel Scillae. — Meerzwiebelhonig.

Ein Theil Meerzwiebeleßsig	1
und	
Zwei Theile gereinigter Honig	2
werden im Wasserbade auf	
Zwei Theile	2
eingedampft und durchgeseiht.	

Meerzwiebelhonig ist klar und gelblichbraun.

Paraffinum liquidum. — Flüssiges Paraffin.

Klare, farblose, nicht fluorescirende, öartige, aus dem Petroleum gewonnene Flüssigkeit ohne Geruch und Geschmack. Spez. Gewicht mindestens 0,880. Flüssiges Paraffin siedet bei 360° noch nicht.

Werden 3 ccm flüssiges Paraffin in einem zuvor mit warmer Schwefelsäure ausgespülten Glase mit 3 ccm