

tur, quando hominis corpus, aut eius pars sudore perfusa frigidō aëri exponitur. Ibi etiam sudoris materia in tuberculā vertitur, quæ, si iam ipsa materia putruerit, pruriunt: si minus non pruriunt. Sed si putruerit non solūm suscitatur vesiculæ in cute, sed etiam animalcula ex pedicularum genere, quæ à nostris Gallis cyrons dicuntur: ac quæ ibi scabiem fore indicant, vbi naſcuntur. In cute etiam oriuntur aliæ vesiculæ paulò minores papulis, atque bullis aquæ feruentis similes quæ phlyctenæ nominantur. Hæ autem tibijs ac cruribus potissimum eueniunt, atque, si rumpuntur crustam efficiunt nigricantem & dolorificam. Distinguuntur autem materia ab ipsis bullis, quæ carbunculos sequuntur: quandoquidē phlyctenæ ex seroso humore gignuntur: carbunculorum verò bullæ ab atra bile originem habēt. Phlyctenæ quoque, atque etiam papulæ ab ijs vesicis, quæ variolæ & morbilli à medicis praticis vocatæ, distinguntur. Nam hi affectus epidemij sunt, & contagiosi, qui sæpius malignam accersunt & continuam febrem: papulæ verò & phlyctenæ non pestilentes sunt, nec epidemij: neque ullam afferūt, febrem: quibus omnibus cutis affectibus pueri & adolescentes magis obnoxij sunt, quam viri & senes. Item, in cute tumores fiunt, in quorum numero thymus est, qui sæpius anum & penis glandem quam

*Phlyctenæ*

*Variola  
Morbilli*

*Thymus*