

simplices, vel compositæ. Simplicium materia est mel, quod tantisper coquitur, dum crassescat & insipitetur. Tunc vero satis coctum est, quando super orbem stanneum aut lapidem marmoreum effusum concrescit; & ficus arida inuersa. Fiunt etiam ex lardo salso, conciso ad longitudinem minimi digiti; ex seuo, candela, ex saponis albi ȝ. ȝ. ex radice aliqua, succum lento habente, ut altheæ, maluæ, vel quæ nitrostatem habent, ut betæ, mercurialis, bryoniae, brassicæ excorticatae, quæ ut facilius subeant, usus tempore, vel butyro, vel oleo, vel adipe, vel axungia illinuntur. Fiunt etiā ex caulis herbarum detergentium, ut betæ, brassicæ, mercurialis. Nonnulli mercurialis folia contusa in anum intrudunt. Hinc Aetius k, optima ser. 3. c. 360. glandula fit ex foliis mercurialis viridibus tritis. Alii amygdalas saccharo obductas, aut trochiscos saccharatos indunt. Fiunt & simplices ex allio solo ad flatus discutiendos, in pueris præterim. Sed quia ad irritandā facultatē expultricē tam simplices interdū non sufficiant, vel propter facultatē expultricem pigram, vel propter partis obtusiorem sensum, tum glandes lenes, sed compositæ fiunt ex melle, addito sale ad acuendam vim glandis, maxime in pueris, quibus & salis l grumus inditus, ce- paque & porrum capitatum sufficit. Dosis est ad ȝ. j. mellis, salis communis pulueriz. ȝ. ȝ. vel ȝ. j. quæ simul coquuntur. Et hoc est suppositorium cōmune appellatum in officinis. Sed aduertendū, ut in conficiendis suppositoriis ex melle cocto & digitos & omnia instrumenta, quib. vteris, prius oleo aut butyro inungas, nisi omnia tam digitis quā instrumentis adhærere velis.

Alii

*I Aegin. O-
ribas. Ae-
tius.*