

Alii conficiunt ex farina hordei vel tritici, vel filiginis cum aqua in massam redacta, & sale modico condita, quæ exiccantur, & vñus tempore oleo inunguntur. Aliqui radices prædictas vel caulis oleo inunctas sale modico asperso indunt.

Nonnulli loco glandium nodulis vtuntur; sumentes vitellum ouī, salis communis 3.ij. miscentes, quæ linteo raro excipiunt, filum appendunt, quo retrahere possint, oleo inungunt, & in anum intrudunt.

Mediocres sunt, quæ parantur quidem ex melle, tanquam materia communī, sed adduntur etiam medicamenta, vt sunt species hieræ Galeni, agaricus, senna, nitrum, in quibus est dosis mellis ab 3 j. ad 3 ij. Specierum vero, quæ admiscentur, octaua vel decima pars, vt,

*24. Mellis comm. 3 j.*

*specier. hieræ 3 j.*

*vel agarici 3 ij.*

*salis comm. & nitri, an. 3 ff. misce.*

Sunt, qui sterlus muris antiquum addunt ad 3 ff. edocti à Dioscoride m, qui muscerdas subditas infantibus, alui deiectionem promouere scribit. Verum Galenus n irridet, & reuera pudendum esse inquit, alia experiri velle, cum tot sint, circa finem. Sic ad necandos Aecarides fiunt ex pulueribus amaris, vt ex aloë & melle, ex agarico, puluere hietæ simpl. Galeni, puluere absynthii, centaurii, addita farina lupini. Exemplum:

*24. Absynthii, centaurii, vel abrotani, vel aloës trite 3 j.*

*mellis*

*m lib. 2. c. 98.*

*n 10. simpl.*

*circa finem.*