

sensu præditis, utimur. Blandior tamen erit, si æqua portio axungiæ aut adipis, ut gallinæ, anatis, & micæ panis loco ficuum ipsi sinapi adieceris. Fortior erit, si ex sinapi partibus duabus, & una ficuum siccorum componatur. Si vero æqualis portio fermenti cum ficubus accesserit, vehementior adhuc erit; vel si semen nasturtii aut thlaspi contusum admisceatur, quo in robustioribus, & hebetiore sensu preditis utimur.

Tertia media est, quæ ex æquis partibus ficuum & sinapi conficitur.

b *Egin. l. 7.*
c. 19.

Oribas. 10.
coll. 13.

Myrepſ ſect.
40. c. 13.

c *Caiſius
Medic. in
problemate
62. querit,
eūr ſinapi a-*

*qua ſubacti
magis rube-
faciat, quam
aceto ſub-
actum.*

Parandi b modus talis est; Ficus siccæ ſive cariæ in aqua tepida per diem macerantur, deinde expressæ contunduntur, mox ſinapi per ſe contusum ſubtiliſſ. leuigatum, inter leuigandum aqua, in qua ficus maduerint, ſenſim affunditur, & ambo permifcentur in modum cataplasmatum, quod parti calidæ & frictione præparata, admouetur. Quod ſi vero ipſius ſinapi acrimoniam domare velimus, in aceto macerabimus. Si vero & alia adiicere libeat, ſimiliter, quemadmodum ficus, maceranda erunt, & contundenda.

In dolore Ischiadico plerunque utuntur ſtercore capriño, cum aceto; veheſentior erit, ſi rad. thapsiæ tritæ pars j. axungiæ ſuillæ partes iij. commiſceantur. Exemplum:

2. Rad. bryoniae crude contusæ vel cyclamini 3j.

axungiæ 3 ij.

miſceantur, parti applicentur:

Hoc