

Friedrich von Zezschwitz vorm. Fr. Eugen Köhlers botan. Verlag  
Gera (Reuss j. L.):

[55681]

Nachstehende Werke gingen mit allen Rechten und Platten aus dem Verlage von Johann Ambrosius Barth in Leipzig\*) in meinen Besitz über.

Reichenbach u. H. G. fil,

Icones Florae Germanicae et Helveticae simul Pedemontanae, Istriacae, Dalmaticae, Hungaricae, Transylvanicae, Borussicae, Holsaticae, Belgicae, Hollandicae ergo mediae Europae, exhibens nuperrime detectis novitiis additis collectionem compendiosam imaginum characteristicarum omnium generum atque specierum, quas in sua Flora germanica excursoria recensuit. 4<sup>o</sup>-Ausgabe. Vol. I—XXII.

Das Werk erscheint dekadenweise (immer 10 Tafeln zusammen) und zwar wie früher:

- 1) 4<sup>o</sup>-Ausgabe mit lateinischem Texte:
  - a) mit ganzkolorierten Tafeln. Pro Lieferung (Dekade) 6 *M.*
  - b) mit schwarzen (nichtkolorierten) Tafeln. Pro Lieferung (Dekade) 4 *M.*
- 2) 4<sup>o</sup>-Ausgabe mit deutschem Texte:
  - a) mit ganzkolorierten Tafeln. Pro Lieferung (Dekade) 6 *M.*
  - b) mit schwarzen (nichtkolorierten) Tafeln. Pro Lieferung (Dekade) 4 *M.*
- 3) 8<sup>o</sup>-Ausgabe mit halbkolorierten Tafeln und deutschem Texte. Pro Lieferung (Dekade) 3 *M.*

Inhalt der Bände:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| Vol. I. Agrostographia Germanica, cum tabulis 121. Editio secunda. (80 S.)<br>Koloriert 54 <i>M.</i><br>Schwarz 30 <i>M.</i>  | Vol. VII. Isoëteae, Zosteraceae, Aroideae, Potamogetoneae, Alismaceae et Hydrocharideae cum Nymphaeaceis, in tabulis 72. (40 S.)<br>Koloriert 33 <i>M.</i><br>Schwarz 18 <i>M.</i>                | Vol. XVI. Corymbiferae, in tabulis 150 (86 S.)<br>Koloriert 68 <i>M.</i><br>Schwarz 38 <i>M.</i>  |
| Vol. II. Tetradynamae seu Cruciferae cum Resedeis, in tabulis 102. (VII u. 31 S.)<br>Koloriert 46 <i>M.</i><br>Schwarz 26 <i>M.</i>   | Vol. VIII. Cyperoideae, Caricineae, Cyperinae et Scirpinae, in tabulis 126 (50 S.)<br>Koloriert 57 <i>M.</i><br>Schwarz 32 <i>M.</i>  | Vol. XVII. Gentianaceae, Apocynaceae, Asclepiadeae, Oleaceae, Styracaceae, Ebenaceae, Aquifoliaceae, Primulaceae, Plumbagineae, Bicornes, Caprifoliaceae, Rubiaceae, in tabulis 150. (113 S.)<br>Koloriert 68 <i>M.</i><br>Schwarz 38 <i>M.</i> |
| Vol. III. Papaveraceae cum Fumariis et Berberideis, Capparideae, Violaceae, Cistineae et Ranunculacearum: Myosurus, Ceratocephalus, Ficaria, Ranunculus, Callianthemum, Adonis et Thalictrum, in tabulis 106. (16 S.)<br>Koloriert 48 <i>M.</i><br>Schwarz 27 <i>M.</i> | Vol. IX. Typhaceae, Irideae, Varcisseae et Gunaceae, in tabulis 100. (24 S.)<br>Koloriert 45 <i>M.</i><br>Schwarz 25 <i>M.</i>  | Vol. XVIII. Labiatae, Verbenaceae, Heliotropeae, Borragineae, Convolvulaceae superadditis Polygalaceis, in tabulis 150. (103 S.)<br>Koloriert 68 <i>M.</i><br>Schwarz 38 <i>M.</i>  |
| Vol. IV. Ranunculaceae: Anemoneae, Clematideae, Helleboreae et Paeoniceae, in tabulis 82. (VIII u. 12 S.)<br>Koloriert 37 <i>M.</i><br>Schwarz 21 <i>M.</i>   | Vol. X. Veratreae et Colchiceae, Smilacinae et Liliaceae, in tabulis 102. (34 S.)<br>Koloriert 46 <i>M.</i><br>Schwarz 26 <i>M.</i>   | Vol. XIX. Cichoriaceae, Ambrosiaceae, Campanulaceae, Lobeliaceae superadditis Cucurbitaceis, in tabulis 260. (135 S.)<br>Koloriert 117 <i>M.</i><br>Schwarz 65 <i>M.</i>  |
| Vol. V. Rutaceae cum Euphorbiaceis, Sapindaceae, Malvaceae, Jeraniaceae, Oxalideae et Caryophyllacearum pars (Sagineae, Arenarieae, Stellarinae) in tabulis 103. (38 S.)<br>Koloriert 47 <i>M.</i><br>Schwarz 26 <i>M.</i>  | Vol. XI. Coniferae, Taxineae, Cytineae, Santalaceae, Elaeagneae, Phymelaceae et Amentacearum Salicineae, in tabulis 100. (32 S.)<br>Koloriert 45 <i>M.</i><br>Schwarz 25 <i>M.</i>                | Vol. XX. Solanaceae, Personatae, Orbancheae, Acanthaceae, Globulariaceae, Lentibularieae, in tabulis 220. (125 S.)<br>Koloriert 99 <i>M.</i><br>Schwarz 55 <i>M.</i>  |
| Vol. VI. Caryophyllaceae (Cerastieae, Diantheae, Sileneae et Lychnideae) Theaceae, Tiliaceae et cum Lineis Hypericineae, in tabulis 124. (46 S.)<br>Koloriert 56 <i>M.</i><br>Schwarz 31 <i>M.</i>  | Vol. XII. Amentaceae: Betulineae et Cupuliferae, Urticaceae, Aristocolchiaceae, Laurineae et Dipsaceae cum Valerianeis, in tabulis 111. (34 S.)<br>Koloriert 50 <i>M.</i><br>Schwarz 28 <i>M.</i> | Vol. XXI. Umbelliferae, in tabulis 210. (108 S.)<br>Koloriert 95 <i>M.</i><br>Schwarz 55 <i>M.</i>  |
|   | Vol. XIII et XIV. Orchideae, in tabulis 170. (X u. 194 S.)<br>Koloriert 77 <i>M.</i><br>Schwarz 43 <i>M.</i>  | Vol. XXII. Papilionaceae im Erscheinen!   |
|   | Vol. XV. Cynarocephalae et Calendulaceae, in tabulis 160. (106 S.)<br>Koloriert 72 <i>M.</i> Schwarz 40 <i>M.</i>   | Vol. XXIII u. XXIV wird die noch fehlenden Familien enthalten.  |
|   |   | Vol. XXV. Rosaceae. (Schluss.)  |

Kohl, Prof. Dr. F. G., Die officinellen Pflanzen der Pharmacopoea Germanica für Pharmazeuten und Mediziner. VI u. 246 Seiten Text und 173 mit der Hand kolorierte Kupfertafeln.  
In Mappe 105 *M.*

\*) Wird bestätigt: Leipzig, 2. Dezember 1898.

Johann Ambrosius Barth.