

rursus febris si sit valida, anhelitusque difficultas maxima. Prout itaque accidentia intensa sunt vel remissa, secundum hoc magnitudinem periculumque pleuritidis prognosticare licet. Occidit autem suffocatione, aut nimio dolore, aliisve huiusmodi symptomatibus magnis, aut denique translatione materiei in pulmones, unde vlcera atque tabes.

Methodus pro curatione

PLEVRITIDIS IN SERVIENS.

Perficitur autem subsequentibus remediorum generibus.

VICTVS RATIONE.

Aer fit temperatus; modice interim ad calidum declinet.

Cibus sit leuis atque tenuis, ut iuscula gallinarum, cremor ptisanæ, tremor amygdalorum. Parum autem in morbi principio alendum erit, posteà verò plenius offeretur alimentum.

Conueniunt vuæ passæ, amygdala, mala dulcia. Inter olera, malua, intubus.

Potus: pusana, decoctum cinnamomi, glycyrrhizæ, florrum violarum. Vinum nō admittatur antequam morbus non nihil fuerit remissus.

Quies corporis imperanda.

Somnus protrahatur solito diutius.

Excrementa alui-mouenda indies.

A VERTENTIBVS.

Venæ cubiti sectio fieri etiam media nocte, ita occasione dictante; perniciem enim minatur tum febris acuta, tum respiratio impedita, tum dolor acerbissimus. Secabimus autem ubi non nihil mitius se habebit basilicam.