

3. pr. Med. p 2, f. 2. c. 2. (i) libr. 21. obs. s. chol. (k) cent. 3.
obs. 74. (l) l. 3. pr. admirand. obs. 129. (m) cent. 3. obs. 48.

V I I.

Causis positis, cum ponantur effectus, nec, nisi subla-
tis istis tollantur, eas ut inquiramus, necessum habemus.
Proximam verò causam doloris nostri solutionem esse con-
tinui, unò ferè ore Medicorum profiteretur chorus. Cau-
sas equidem plurimas esse, palam est: omnes tamen in eo
convenire, eaq; ratione dolorem excitare, quatenus con-
tinuum solvunt, haud ἀλόγως concludere *Sennertum* (a)
accipimus. Hòc verò modò dolorem restringi ad sensum
tactus, supra innuimus, cum in omni sensu dolor fiat se-
demq; inveniat citra unitatis solutionem, solò exceptò ta-
ctu, docente cum multis aliis laudatò *Sennertò*. (b)

(a) alleg. loc. (b) libr. 2. Instit. Med. part. 3. sect. 1.
c. 6.

I I X.

Mediate verò causa, quas continuum solvere modò
diximus, id præstant vel *distensione* vel *rosione*: Internæq;
sunt vel externæ. Internas agnoscimus

I X.

I *Flatus*. Flatuum enim sedem & receptaculum,
præcipuum esse colon, edoctus est *Fernelius* (a) qui in non
paucis, flatus cohibere qui consueverant, colon dilatatum
brachii amplitudinem æquantem, sectionis beneficio ad-
notavit. Eiusdem beneficio *idem*, sed majoris quod est
momenti, observavit *Petræus* (b) in puerulo quopiam,
cui venter paucis à partu diebus stupendum in modum in-
tumuit, cum sævissimis & continuis torsionibus. Causam
enim tantæ intumescentiæ, quæ latebat singulos, solum ex-
titisse