

CHRYSANTHEMUM INODORUM.

TABULA XXIII.

SYNGENESIA SUPERFLUA.

CHRYSANTHEMUM. WUCHERBLUME.

Der Kelch halbkugelförmig, mit dachziegelartig sich deckenden Schuppen, die am Rande trocken sind. Der Befruchtungsboden erhaben und nackt. Keine Samenkronen.

**C**hrysanthemum *inodorum* mit einem markigen, kegel- oder halbkugelförmigen Befruchtungsboden und fast dreifach-fiederspaltigen Blättern, deren Einschnitte linienförmig sind. *Hayne Darstell. und Beschr. der in der Arzneyk. gebr. Gew. 4 t. 4.*

*Chrysanthemum (inodorum) foliis pinnatis multifidis, caule ramoso diffusis. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. II. p. 1253. Roth Flor. Germ. T. I. p. 357. T. II. P. II. p. 319. Hoffm. Deutschl. Flor. P. I. p. 302.*

*Pyrethrum (inodorum) foliis sessilibus pinnatis capillaceo-multifidis, caule ramoso patulo, corona feminum integra. Smith Flor. britann. Vol. II. p. 901.*

*Matricaria inodora, receptaculis hemisphaericis, radiis patentibus, feminibus coronato-marginatis, squamis calycinis margine obsolete. Linn. Flor. suec. 2. n. 765.*

*Chamaemelum inodorum annuum humilius, foliis obscure virentibus. Moris. hist. 3. p. 36. Raj. angl. 3. p. 186.*

*Chamaemelum inodorum f. Cotula non foetida. Joh. Bauh. hist. 3. p. 120.*

*Chamaemelum maritimum. Linn. westgöta resa. p. 148.*

Geruchlose Wucherblume, feinblättrige Johannisblume.

Auf Aeckern, Gartenland und Schutthaufen, wie auch am Seestrand und an den Ufern der Flüsse. (Hamburg, auf dem Stadtdeich, in Billwerder und auch anderwärts.)

Blühet vom Julius bis in den September.

Die Wurzel ist einjährig, stockartig, etwas ästig und mit *Wurzelfasern* besetzt. Die Stengel, deren gewöhnlich mehrere aus einer Wurzel kommen, sind leicht gefurcht, ästig und aufwärts gebogen; der *mittlere* aber aufrecht. Die *Aeste* einfach. Die Blätter sind fleischig, sitzend, wechselweis stehend: die *untern* fast dreifach-fiederspaltig; die *obern* doppelt- oder einfach-fiederspaltig; die *Einschnitte* linien-