

durch Ableger. Der Saame wird aus Amerika geschickt, und lieget ein ganzes Jahr in der Erde, ehe er aufkeimet. Die Ableger erfodern zwei Jahre Zeit, ehe sie Wurzeln erhalten.

So lange die Pflanzen noch jung sind, muß man sie gegen die Kälte bedeckt halten, so bald aber der Stamm nur ein wenig stark geworden ist, verträget er unsere Winter ohne Bedeckung.

Im feuchten Erdreiche kommen sie besser fort als im trocknen, und sie wachsen in Nordamerika eigentlich an feuchten Orten und Bächen, zu acht bis zehen Schuh hoch. Der hiesige Stamm, der als ein solcher aus England gekommen ist, und dessen Alter ich daher gewiß zu bestimmen nicht im Stande bin, hat kaum die Hälfte dieser Höhe.

Von einer besondern Verukung kann ich außer der frischen Aussicht in Gärten und Pflanzungen nichts anführen.



XXIII. COLUTEA. The Bladder Senna.

Le Baguenaudier. Der Blasenbaum.

Die Blätter der Blasenbäume sind allezeit gesiedert, und bestehen aus ovalen und Herzförmigen kleinen ungezähnten Blättern, zwei und zwei gegen einander über, welche sich mit einem einzigen Blatte endigen.

Die Blumen sind Papilionsblumen, und sitzen zu mehreren Stücken an einen gemeinschaftlichen Stiele.

Die Blumendecke ist einblättrig, Glockenförmig,