

Botan. Namen	Wuchs und Verwendung	Blüte:		Besondere Bemerkungen
		Zeit	Farbe	
Anthericum ramo- sum	50—80 cm, Einz.- oder Rabatten- pflanze	Sommer	reinweiß	Ist seltener als vorige und macht von Natur stärkere Pflanzen als diese. Beide geben ein werivolles Bindematerial.
Asphodeline lutea	bis 1 m hoch, Gruppenpflanze	"	grüngelb	Eine unverwüfliche, interessante Pflanze für sonnige Hügel mit leichtem Boden. Wird für kleine Verhältnisse durch Bestockung und Selbstaussaat lästig.
Asphodelus ramosus	bis 1,20 m hoch, Einzel- od. Grup- penpflanze	"	weiß, bräunlich gerändert	Liebt sonnigen Standort u. durchlässiger Boden ist für diese stolz wirkende Pflanze aus dem Orient unerlässlich. Auf anderem Standort ist sie nicht von langer Dauer.
Bulbocodium vernum	5—8 cm hoch, Hügelpflanze	Februar—März	violettrosa	Habitus wie Herbstzeitlose. Wächst auch im Halbschatten und dünnem Gras. Verdient weiteste Verbreitung als ganz zeitiger Blüher.
Camassia esculenta	50—70 cm hoch, Hügel- od. Ra- battenpflanze	Sommer	dunkelblau	Ein sehr schöner Sommerblüher. Liebt kräf- tigen Boden und volle Sonne und ist für jeden Garten zu empfehlen. Setzt sehr reich- lich Brutzwiebeln an.
Chionodoxa Luciliae	20 cm hoch, Hü- gelpflanze	zeitig. Frühjahr	blau mit weiß. Auge	} Beide sind äußerst dankbare, reizende Frühblüher. Dazu wünschen sie aber volle Sonne, kräftigen Boden. Ihre Vermehrung ist oft durch Samenausfall so reich, daß sie in kleinen Verhältnissen lästig werden. Diese beiden Arten ersetzen alle anderen Arten dieser Gattung.
— sardensis	20 cm hoch, Hü- gelpflanze	"	hellblau	

