

Botan. Namen	Wuchs und Verwendung	Blüte:		Besondere Bemerkungen
		Zeit	Farbe	
Crocus moesiacus, frühjahrsblühend Crocus chrysanthus, frühjahrsblühend Eranthis hiemalis	bis 10 cm, für Ra- batt. o. Grasfläch. " bis 10 cm niedr. Wiesenpflanze	Frühjahr " zeitig. Frühjahr	gelb " ockergelb	Eine der haltbarsten u. vermehrungsfähigsten.  Der zeitigste Frühjahrsblüher unter den Knollenpflanzen. Durch abendliches Schließen seiner Blütensterne, das auch bei Regenwetter erfolgt, erstreckt sich seine Blütezeit auf 3-4 Wochen. Liebt kräftigen Boden und wächst am schönsten in lockerem Rasen oder ebensolchen Gebüschgruppen. Durch Samenausfall ungemein vermehrungsfähig. Diese Pfl. sollte deshalb in keinem Garten fehlen.
Eremurus robustus	bis 2 m hoch, Hügel- od. Gruppenpflanze	Sommer	weiß	Diese, aus dem Orient stammende Kleopatranel, gen. Liliacee, ist durch ihre Größe und Schönheit auffallend imposant. In milden Gegenden hält sie unter guter Decke im Freien aus, in rauhen Lagen ist Herausnehmen im Herbst und frostfreies Überwintern anzuraten. Gegen jede stauende Nässe ist sie sehr empfindlich, sonst liebt sie aber kräftigen nährstoffreichen Boden.
Erythronium Deus canis	bis 10 cm hoch, Hügelpflanze	Frühjahr	weiß, rot, gescheckt	Dieser einheimische Hundszahn verdient durchaus nicht die bis jetzt gegen ihn gezeigte Interesselosigkeit. Er ist von eigenartiger Anmut auf sonnigen Hügeln mit sehr durchlässigem Boden.