

- Adiantites Germari* G. Wettin bei Halle.
- *reniformis* G. Fréjus, Departement du Var.
- *obliquus* G. Yorkshire in England; Charlottenbrunn in  
Schlesien.
- *giganteus* G. Waldenburg.
- *umbilicatus* G. Felling in England.
- *heterophyllus* G. Schlegel in der Grafschaft Glatz.
- *otopteroides* G. Zalenze in Oberschlesien.
- *auriculatus* G. St. Etienne in Frankreich; Radnitz in Böhmen;  
Waldenburg und Charlottenbrunn.
- *Villiersii* G. Alais in Frankreich.
- *trilobus* G. Bensham in England.
- *cuneatus* G. Unbekannt.
- *concinus* G. Jarrow in England.
- *oblongifolius* G. Charlottenbrunn.
- *microphyllus* G. Newcastle in England.
- *Murchisoni* G. Knowlsburg in England.
- *pachyrrhachis* G. Burdihouse in England.
- Alethopteris lonchitidis* Sternb. Namür in Belgien; Newcastle in England;  
Duttweiler in Rheinpreussen; Ibbenbü-  
hren bei Osnabrück; Königshütte in Ober-  
Schlesien.
- *Sternbergii* G. England; Böhmen; Waldenburg.
- *Davreuxii* G. Löwen in Belgien.
- *Mantelli* G. Newcastle und Pontnewydd in England; Wal-  
denburg.
- *heterophylla* G. Felling in England.
- *Dournaisii* G. Valenciennes; Waldenburg.
- *aquilina* G. Geislautern bei Saarbrück in Rheinpreussen;  
Ibbenbühren bei Osnabrück; Wettin; Ma-  
nebach und Waldenburg.
- *Grandini* G. Geislautern bei Saarbrück.

\*