

Acker-Steinsame (*Lithospermum arvense* L.) Früchtchen klein, birnförmig, runzelig rauh, grau, Erdklümpchen ähnlich, Größe 4 mm, sehr hart, schwer auszusondern.

Gemeiner Stechapfel, Rauhapfel, Dornapfel, Tollkraut, Krötenmelde (*Datura stramonium* L.) Same: nierenförmig, netzig-grubig, rotbraun bis schwarz. Der Same ist in hohem Grade narkotisch-giftig. Größe 3—4 mm.

Acker-Winde (*Convolvulus arvensis* L.) Same klein, dreikantig, rundlich zugespitzt, gewölbt, Größe 4—5 mm.

Acker-Wachtelweizen, Ruhweizen (*Melampyrum arvense* L.) Same: länglich oval, walzig, gewölbt mit Längsfurche, Weizenkorn ähnlich, je 2 Früchtchen liegen in einer Kapsel, braun bis schwarzbraun, Größe 6 mm; färbt in größerer Menge das Mehl bläulich und gibt ihm einen bitteren Geschmack, sonst unschädlich; verschmiert die Steine und Zylinderbezüge.

Acker-Krauzdistel, Saudistel, Haferdistel (*Cirsium arvense* L.) Samen und Blütenköpfe kommen im Getreide vor, Blütenköpfe rundlich, Same länglich, leicht auszusondern.

Kornblume, Cyane, Ziegenbein (*Centaurea cyanus* L.) Same: klein, walzig mit verhältnismäßig langen Borsten besetzt, Größe (ohne Borsten) 3 mm, leicht auszusondern.

Feld-Ampfer, Sauerklee, kleiner Ampfer (*Rumex acetosella* L.) Same: sehr kleine dreieckige Nüsschen, braun; leicht auszusondern.

Windenknöterich (*Polygonum convolvulus* L.) Same dreiseitig, dreikantig, zugespitzt eiförmig, Buchweizen ähnlich, Größe 4 mm, mehlig, färbt aber das Mehl dunkel, leicht auszusondern.

Pfirsichblättriger Knöterich, Flohknöterich, Flohkraut (*Polygonum persicaria* L.) Der Same gleicht dem des Winden-Knöterich ist aber um mehr als die Hälfte kleiner.

Ampferblättriger Knöterich, Ackerknöterich (*Polygonum lapathifolium* L.) Same: klein, plattgedrückt mit