

Leipziger Tageblatt

und

Anzeiger.

N 143.

Freitag, den 22. Mai.

1840.

Vermietung.

Das zum Holzhofe gehörige, sub Nr. 979 in der Holzgasse allhier gelegene, 2 große Stuben mit Vorhaus parterre und 2 geräumige Böden enthaltende Commungebäude, in welchem sich bisher die Unterrichtsstuben der hiesigen Garnison befunden haben, soll von jetzt oder nach Befinden von Johanni dieses Jahres an auf drei Jahre, jedoch mit Vorbehalt der Auswahl unter den Licitanten und jeder sonstigen Verfügung, als Niederlage vermiethet werden.

Die Miethlustigen, welche die nähern Bedingungen bei der Rathsstube erfahren können, haben sich daher

den 29. Mai d. J.

Vormittags um 11 Uhr daselbst einzufinden, ihre Gebote zu thun und sodann weiterer Nachricht sich zu gewärtigen.

Leipzig, den 16. Mai 1840.

Der Rath der Stadt Leipzig.
Dito.

Auswahl blühender Topfgewächse in den Leipziger Gärten, Mitte Mai 1840.

(Züher erwähnte Arten, man vergleiche Tageblatt vom 17. Februar, 21. März und 21. April, werden hier übergangen.)

Es blühen:

A) In dem botanischen Garten der Universität:

Acetanthus diphyllus MORR. & DESC. (Berberideae.) Japan.
Begonia heracleifolia CHAM. & SCHLEENT. (Begoniaceae.) Mexiko.

Bletia verecunda BR. (Orchideae.) Ostindien.

Ceropegia stapeliaeformis HAW. (Asclepiadeae.) Ostindien.

Cinnamomum eucalyptoides FR. N. v. E. (Laurineae.) Java.

Chorozema rhombeum BR. (Leguminosae.) Neu-Holland.

Cliffortia cuneata AIT. (Sanguisorbeae.) Cap.

Dianella coerulea CURT. (Asphodelaeae.) Neu-Holland.

Dracaena reclinata HORT. BELVED. (Asphodelaeae.) Cap?

Epidendron elongatum SW. (Orchideae.) Süd-America.

Erica gilva WENDL. (Ericaceae.) Cap.

— *virescens* LK. (—) —

Eupatorium adenophorum SPR. (Synanthereae.) Mexico.

— *australe* BARTL. (—) N.-Holland.

Eutaxia myrtifolia BR. (Leguminosae.) —

Maxillaria Harrisoniae LINDL. (Orchideae.) Brasilien.

Melastoma cymosa SCHRO. & WENDL. (Melastomeae.) Sierra Leone.

Pernetia mucronata GAUD. (Ericaceae.) Chile, Patagonien.

Pimelea drupacea BR. (Thymeleae.) Neu-Holland.

Primula longiflora AIT. (Primulaceae.) Alpen.

— *uralensis* FISCH. (—) Siberien.

— *verticillata* FORSK. (—) Sinai.

Russelia multiflora SIMS (Scrofularinae.) Mexico.

Sarracenia purpurea L. (Sarraceniaceae.) Florida.

Sphaerolobium vimineum SM. (Leguminosae.) N.-Holland.

Thomasia quercifolia GAY (Lasiopetaleae.) Neu-Holland.

Verbena sulphurea SWEET (Verbenaceae.) Chile.

B) In dem Förster'schen Garten zu Klein-Ischocher:

Acacia alata BR. (Leguminosae.) Neu-Holland.

Bauera humilis SWEET (Cunoniaceae.) —

Camellia japonica L. var. *incomparabilis* (Camelliaceae.) Japan.

— — — *multiflora* (—) —

— — — *sanguinea* (—) —

Chorozema Henchmanni LOBB. (Leguminosae.) Neu-Holland.

— *Manglesii* HORT. (—) —

Coleonema pulchrum HOOK. (Diosmeae.) Cap.

Daviesia latifolia BR. (Leguminosae.) Neu-Holland.

— *longifolia* HORT. (—) —

Dillwynia floribunda SM. (—) —

Erica campanulata SALISB. (Ericaceae.) Cap.

— *gracilis* WENDL. (—) —

— *Linnaeana* AIT. (—) —

— *paniculata* L. (—) —

— *suaveolens* LOBB. (—) —

— *tenella* ANDR. (—) —

Eutaxia Baxteri ANGL. (Leguminosae.) Neu-Holland.

Fabiana imbricata R. & P. (Solaneae.) Chile.

Helipterum (Helichrysum) spectabile DC. (Synanthereae.) Cap.

Hovea Celsii BONPL. (Leguminosae.) Neu-Holland.

Kennedyia nigricans LINDL. (—) —

Oxylobium Pultenaea DC. (—) —

Polygala speciosa SIMS (Polygaleae.) Cap.

Pimelea sylvestris BR. var. *Elphinstoni* HORT. (Thymeleae.) Neu-Holland.

Rhodanthe Manglesii LINDL. (Synanthereae.)

C) In den Frege'schen Gärten,

a. in der Stadt:

Acacia lineata A. CUNNIGH. (Leguminosae.) Neu-Holland.

Amaryllis (Brunsvigia) multiflora SIMS (Amaryllideae.) Cap.

Boronia pinnata ANDR. (Rutaceae.) Neu-Holland.

Brugmansia bicolor P. var. *flava* (Solaneae.) Peru.

Enkianthus quinqueflorus LOUR. (Ericaceae.) China.

Epacris pungens SIMS (Epacrideae.) Neu-Holland.

Erica cylindrica THUNB. (Ericaceae.) Cap.

Fuchsia microphylla HBK. (Onagraceae.) Mexico.

Gnaphalium (Helichrysum) appendiculatum THUNB. (Synanthereae.) Cap.

Helipterum (Helichrysum) humile DC. (Synanthereae.) Cap.

Kennedyia longiracemosa BOT. MAG. (Leguminosae.) Neu-Holland.

Pimelea linoides CUNNIGH. (Thymeleae.) Neu-Holland.

— *rosea* BR. (—) —

b. in Abtnaundorf:

Alstroemeria psittacina LEMM. (Amaryllideae.) Mexico.

Boronia alata SM. (Rutaceae.) Neu-Holland.

Calceolaria pendula SWEET. (Scrofularinae.) Chile.