

voraussichtlich noch geringeren Gewinn übrig lassen würden, als durch die Rente mit Rücksicht auf die zu ersparende Benutzung der jetzigen Localien des Salzschänken erlangt werden konnte, aus welchen Gründen daher auch das Collegium dem Beschlusse des Magistrates einhellig beitrug.

Hierauf wurde auf den Antrag eines Mitgliedes beschlossen, die Veranstaltung einer Feier des diesjährigen Constitutionsfestes in der bisher üblich gewesenen Weise bei dem Magistrate zu beantragen und nachdem sodann die von einem Mitgliede angeregte Anlegung einer Eisenbahn nach Hof eine Besprechung veranlaßt hatte, wurde in nicht öffentlicher Sitzung noch wegen Regulirung einer der Commun zuständigen alten Lotterieforderung und zum Schlusse über einen die Deposita des hiesigen Stadt- und Landgerichtes betreffenden Antrag verhandelt.

Auswahl blühender Topfgewächse in den Leipziger Gärten, aufgezeichnet am 16. August 1840.

(Man vergleiche Tageblatt vom 17. Februar, 21. März, 21. April, 22. Mai, 20. Juni u. 24. Juli. Dort erwähnte Arten sind übergangen.)

Es blühen:

A) In dem botanischen Garten der Universität:

Acacia penninervis DC. (*impressa* SIEB.) (Leguminosae.) Neu-Holland.

Acropera Loddigesii LINDL. (Orchideae.) Mexiko.

Adesmia microphylla HOOK. (Leguminosae.) Chile.

Begonia diversifolia GRAH. (Begoniaceae.) Mexiko.

— *Martiana* LK. & OTTO. (—) —

— *sanguinea* RADDI (—) Brasilien.

Benninghausenia (Ruta Hook.) albiflora RECHB. (Rutaceae.) Nepal.

Castilleja Ehrenbergiana KEB. (Scrophulariaceae.) Mexiko.

Clidemia hirta DON. (Melastomeae.) Süd-Amerika.

Costus speciosus SM. (Scitamineae.) Ostindien.

Curcuma Amada ROXB. (—) —

Diplacus (Mimulus) puniceus HOOK. (Scrophulariaceae.) Californien.

Diplopappus incanus LINDL. (Synanthereae.) Californien.

Erica cernua L. (Ericaceae.) Cap.

Francoa ramosa DON. (Crassulaceae.) Chile.

Hedyohium Gardnerianum R. & S. (Scitamineae.) Nepal.

Nepenthes phyllamphora W. (Nepentheae.) Ostindien.

Peperomia maculosa HOOK. (Piperaceae.) St. Domingo.

Sansevieria guineensis W. (Hemerocallidaceae.) Guinea.

Thunbergia grandiflora ROXB. (Acanthaceae.) Ostindien.

B) Im Fürster'schen Garten zu Klein-Locher:

Banksia formosa HORT.

— *latifolia* BR.

— *serratifolia* SALISB.

(Proteaceae.) Neu-Holland.

Crinum amabile KUN (Amaryllidaceae.) Sumatra.

Erica exaudans LODD. } (Ericaceae.) Cap.

— *procera* WENDEL. }

Escallonia floribunda HBK. (Saxifragaceae.) Süd-Amerika.

Eugenia (Jambosa) DC.) australis WENDEL. (Myrtaceae.)

Neu-Holland.

Gesneria Cooperi PAET. (Gesneraceae.) Brasilien.

Hibiscus rosa sinensis L. f. *luteo* pl. (Malvaceae.) Indien.

— *speciosus* AIT. (Malvaceae.) Carolina.

Nandina domestica THUNB. (Berberideae.) China.

Polygala (Muraltia) DC.) mixta THUNB. Cap.

Salvia involucrata CAV. (Labiatae.) Mexiko.

Tristania nerifolia BR. (Myrtaceae.) Neu-Holland.

C) In den Frege'schen Gärten,

a. in der Stadt:

Anagallis Monelli L. var. *grandifl.* (Primulaceae.) Italien.

Cassia tomentosa L. (Leguminosae.) Süd-Amerika.

Erica incarnata W. var. *may.* (Ericaceae.) Cap.

Gardouquia multiflora RUIZ & PAV. (Labiatae.) Chile.

Grevillea acanthifolia CUNGH. (Proteaceae.) Neu-Holland.

Hypericum floribundum AIT. (Hypericaceae.) Madeira.

Jasminum gracile ANDR. (Jasminaceae.) Norfolkinsel.

Pentstemon argutus BOOTH (Scrophulariaceae.) Mexiko?

Stachys coccinea JACQ. (Labiatae.) Mexiko.

b. in Abtnaundorf:

Cassia Wallichiana DC. (Leguminosae.) Ostindien.

Cuphea silenoides NE. (Lythraceae.) Mexiko.

Erica stricta DON. (Ericaceae.) Cap.

Gloxinia hirsuta LINDL. (Gesneraceae.) Brasilien.

Hedychium coccineum SM. (Scitamineae.) Nepal.

Humea elegans SM. (Synanthereae.) Neu-Holland.

Verbena venosa GILL. (Verbenaceae.) Buenos-Ayres.

D) Im Kob'schen Garten:

Cactae:

Lepismium myosurus PFR. Brasilien.

Mammillaria Andreae OTTO Mexiko.

— *columnaris* KARW. —

— *depressa* SCHEIDW. —

— *polythale* MART. —

— *pyramidalis* OTTO. —

— *quadrispina* MART. —

— *simplex* HAW. Süd-Amerika.

Opuntia polyantha HAW. —

Rhipsalis fasciculata HAW. Westindien.

Calothamnus villosa BR. (Myrtaceae.) Neu-Holland.

Lobelia fulgens W. (Lobeliaceae.) Mexiko.

Sedum Sieboldtii MAK. (Crassulaceae.) Japan.

E) In dem Böhr'schen Garten:

Begonia nitida AIT. (Begoniaceae.) Westindien.

Brexiamadagascariensis PET. TH. (Brexiceae.) Madagaskar.

Calceolaria arachnoidea GRAH. (Scrophulariaceae.) Chile.

— *Youngii* SWEET (—) —

Cajophora (Loasa) lateritia KLIZON. (Loaseae.) Tucuman.

Cassia laevigata W. (Leguminosae.) Brasilien.

Chironia linoides L. (Gentianeae.) Cap.

Erica abietina L. (Ericaceae.) Cap.

Erythrina crista galli L. (Leguminosae.) Brasilien.

Gesneria bulbosa KEB. (Gesneraceae.) —

— *magnifica* OTTO. (—) —

Jasminum azoricum L. (Jasminaceae.) Madeira.

Maranta bicolor KEB. (Cannaceae.) Süd-Amerika.

Mimulus mosohatus DOUGL. (Scrophulariaceae.) Columbien.

Punica Granatum L. *flavescens* (Granateae.) Süd-Europa.

Rochea falcata DC. (Crassulaceae.) Cap.