

In der Hauptredaktion oder den im Stadtbezirk...

Die Morgen-Ausgabe erscheint um 1/2 Uhr...

Redaction und Expedition: Johannstraße 8.

Die Expedition ist Hochachtungsvoll anzuwenden...

Filialen:

Ette Klemm's Contin. (Wlfrd Gschl), Universitätsstr. 3 (Waldau), Remis Böde, Rathhausstr. 14, post. und Königspl. 7.

Leipziger Tageblatt

und Anzeiger.

Amtsblatt des königlichen Land- und Amtsgerichtes Leipzig, des Rathes und Polizei-Amtes der Stadt Leipzig.

Die 6spaltige Zeitzeile 20 Hg. Reclamen unter dem Redactionsstrich...

Extra-Beilagen (gratis), nur mit der Morgen-Ausgabe, ohne Postlieferung...

Annahmeschluss für Anzeigen: Abend-Ausgabe: Vormittags 10 Uhr...

Bei den Filialen und Annoncenstellen je eine halbe Stunde früher. Anzeigen sind stets an die Expedition zu richten.

Druck und Verlag von G. Volz in Leipzig.

Die Parteinahme für die Deutschen in Oesterreich und die deutsch-österreichischen Beziehungen.

In dem consequenten Streben der englischen Presse, Deutschland, wo es nur angeht, Schwärzereien zu bereiten...

Ueber diese alberne Behauptung des englischen Blattes könnte man in der sichern Erwartung, daß sie in Oesterreich richtig...

Diese Behauptung ist vollkommen unzutreffend. Die unfreundliche Haltung gegen Deutschland durch die Grafen...

Und hiergegen richtet sich auch nur die Agitation der nationalen Elemente in Deutschland, gegen die übermäßige...

würde, wenn endlich Deutschland aufhört ihre gesammten Ost- bzw. Westgrenze nach einander grenzen zu ziehen...

Obwohl die Regierung noch weit entfernt von der Anerkennung der österreichischen Machtstellung ist, so hat sie doch in der letzten Zeit...

Das neue Linienschiff „Ersah“, „König Wilhelm“.

Das neue Linienschiff „Ersah“, „König Wilhelm“ wird in diesen Tagen eine werthvolle Bereicherung erfahren durch das Linienschiff „Ersah König Wilhelm“...

werden sollen, deutlich hervor. Zur Zeit der Erbauung der „Brandenburg“-Klasse, die damals als die modernsten Schlachtschiffe...

Trotz dieser erheblichen Beschädigung des Schiffkörpers hat eine gegen die „Brandenburg“-Klasse erhöhte Feuerschuttmitteligkeit erzielt...

In den Waffen soll eine Veränderung dahin herbeigeführt werden, daß eine Beschädigung der Schmelzgeschütze durch Schornsteinrauch ausgeschlossen bleibt...

Deutsches Reich.

C. H. Berlin, 26. Mai. Unser österrösisches Geschwader wird in nicht zu ferner Zeit infolgedessen vollkommen modernisiert sein...

werden, ist unbestritten; es wird vielmehr aus verschiedenen Gründen mindestens in gewissen Stufen erhalten bleiben müssen...

A. Berlin, 26. Mai. (Der Alkoholismus in Frankreich — eine nationale Gefahr.) Der Professor der Medizin Debove hat letzten eine Broschüre über den Alkoholismus in Frankreich erschienen lassen...

Feuilleton.

Ameisenigel.

Unser zoologischer Garten beherbergt gegenwärtig ein höchst merkwürdiges Säugethier, ja wohl eine der merkwürdigsten, die in der Jetztzeit leben.

Die Ameisenigel, es gibt ihrer mindestens zwei Arten, aber dennoch nur eine Anzahl gut charakterisierter Localrassen, bilden mit dem Schnabeltier eine Unterklasse der Klasse der Säugethiere...

Es handelt sich bei dieser Klasse der Monotremen um einen allerschlimmsten Zustand, der an die Beschaffenheit, wie sie uns bei den Säugeln und Reptilien entgegensteht, wenn auch nicht ganz unmittelbar ansetzt.

Auch sonst haben jene am tiefsten stehenden Säugethiere noch beschriebene Punkte in ihrer Organisation, die sich wohl bei niederen Wirbelthieren, aber nicht bei den anderen Säugethiere wiederfinden.

Säugeth und beim Menschen findet, aber ohne Selbstthätigkeit zu erlangen. Er vermischt nämlich, obwohl er aus einem...

Bei den Kloakthieren, Säugeln und Reptilien verbindet das schließliche Ruderschnabeltier, wie das Schließbein, gleichfalls das Schulterblatt mit dem Brustbein, aber auch auch von jenem.

Freier verschmelzen bei den Monotremen, wie bei den Säugeln, die einzelnen Knochen, die den Hinterschädel bilden, sehr zeitig miteinander.

Es gibt nämlich außer den erwähnten Eigenthümlichkeiten im Knochenbau, der Klasse und dem jahreslosen Schmelz, noch einen sehr bedeutungsvollen Zug der Ueber einstimmung der Kloakthiere mit den Säugeln: Sie legen Eier wie diese.

Schon Jos. Friedr. Meckel, ein weitbekannter, hervorragender Anatom, hatte aus gewissen Eigenthümlichkeiten im inneren Bau des weiblichen Schnabelthieres den Schluss gezogen, daß dem so sei.

Obwohl vom Eierlegen der Kloakthiere als irrthümlich bei Seite gelassen.

Trotz alledem wäre es unrichtig, die Monotremen als ein reines Bindeglied zwischen Säugthieren und Vogeln zu ohne Weiteres hinstellen zu wollen.

Bekanntlich unterscheidet man unter den Wirbelthieren Reptilien und Monotremen, aber besser: nachwarmes, poliothermes, und gleichwarmes, homoiothermes. Zu den ersteren gehören die Fische, Lurche und Reptilien, zu den letzteren die Vögel und Säugthiere.

Bei den wärmeliebenden Wirbelthieren richtet sich die Temperatur des Blutes nach der des umgebenden Mediums, in dem sie sich befinden, sei es die Luft oder das Wasser, bei den gleichwarmen ist sie aber unabhängig von dieser und beträgt 38,5° (Säugethiere) bis etwa 40° C. (Vögel).

Die Unterklasse der Kloakthiere zerfällt in zwei Familien, in die der Schnabelthiere (Ornithorhynchidae) und in die der Ameisenigel (Echidnidae). Die letztere ist bloß aus dem Fest-

lande von Australien und in Tasmanien vertreten, die größte findet sich aber auch auf Neu-Guinea.

Die Ameisenigel sind graubraune Lebewesen mit verhärteter, langer, cistiförmiger, in jedem Alter zahlloser Säughaare, mit mittellangen, sehr kräftigen, nicht stehenden, sondern fruppigen Haaren durchwachsenen Schwänzen auf dem Rücken, an den Seiten und auf dem Schenkel, rudimentäre Schwänze, sehr kurze Beine, von denen das hintere Paar etwas länger als das vordere ist, unüberbundenen, mit starken breiten Krallen besetzten Füßen.

Man hat die Thiere in zwei Gattungen gebracht: in die der echten Ameisenigel (Echidna) mit fünf und die der Urechidnen (Proechidna) mit drei wohl entwickelten Zähnen an beiden Backenzähnen. Wegen die Berechtigung dieser beiden Gattungen liegen sich mancherlei Bedenken geltend machen.

Die Gattung Echidna umfaßt eine Art (monocata) mit drei Localrassen: einer nördlichen (prospira) vom südöstlichen Brasilien, einer centralen (sotosa) vom Continente von Australien und einer südlichen (Lawsoni) von Tasmanien. Der in unserem zoologischen Garten befindliche Ameisenigel gehört zur Rasse vom Continente.

Auch von der, meiner Meinung nach, unbedingten Gattung Proechidna hat man zwei Arten angenommen: eine (Brayni) vom West-Gebirge im nordwestlichen und eine zweite (microscoulesca) vom Charles-Streit-Gebirge im westlichen Neu-