Die Spitzen der Blätter. Apices foliorum. Les Sommets des feuilles.

d) an der Spitze ausgerandetes Blatt;
fólium ápice emarginátum; échancrée au sommet;

3) spitzwinklig;
ángulo acúto;
en angle aigu.

2) verkehrt-herzförmig;
ápice obcordátum;
obcordée au sommet.

1) stumpfwinklig;
ángulo obtuso;
en angle obtus.

e) an der Spitze abgebissen;
ápice præmórsum;
mordue au sommet.

b) an der Spitze eingedrückt;
ápice retúsum;
rétuse ou écrasée au sommet;

a) an der Spitze eingedrückt mit verlängerter Achse;
retúsum axi prolongáto; rétuse à l'axe prolongé.

7.

Kelchblatt der weichblühenden Bärenklaue;
Acánthus mollis. *L.*
(sépalum.)

6.

Samenblatt der purpurrothen Winde;
Convólvulus purpúreus. *L.*
(fólium seminále.)

5.

Tulpenbaum;

Liriodéndron Tulipífera. *L.*

4.

reichblättrige Banksie;

Bánksia quercifólia; *R. Br.*

3.

lederblättrige Cassine;
Cassine Maurocénia. *L.*

2.

balearischer Buchsbaum;
Buxus baleárica. *Lam.*

1.

Fiederblättchen der Saat-Wicke;
Vícia sativa. *L.*
(foliolum.)

h) dreispitzig;
tricuspidátum; tricuspidée.

g) stumpf ohne Stachelspitze; *ápice máticum; mutique au sommet.*

f) sechsspaltig;
ápice sexifidum;
sexifide au sommet.

zweispaltig an der Spitze; *ápice bifidum;*
bifide au sommet.

c) an der Spitze gekerbtes Blatt;
fólium ápice crenátum;
feuille crénée au sommet.

14.

pennsylvanischer Ahorn;
Acer pensylvánicum. *L.*

13.

knollige Fett-Henne
Sedum Telephium. *L.*
Sedum purpuráscens. *Koch.*



(bracténe.)

12.
a & b (Deckblätter) der stinkenden Nießwurz;
Helléborus fœtidus. *L.*

10. rasenförmiger Steinbrech:
Saxifrága cæspitósa. *L.*
11. astmoosähnlicher Steinbrech;
S. hypnoides. *L.*

9.

Limonenbaum;
Citrus Limónum.
Risso.

8a.

8b.

8a & b

chamädrysblättrige Spierstaude;
Spiræa chamædryfólia. *L.*

m) stechend, *pungens;*
piquant au sommet.

l) dornspitzig; *spinóso-mucronátum; terminée en épine.*

k) borstenspitzig; *ápice setáceo-mucronátum;*
munie de soie au sommet;

i) haarspitzig; *ápice pilíferum;*
feuille portant un poil au sommet.

23.

chinesische Cunninghamia;
Cunninghámia sinénsis.
Rich.

22.

stechender Mäusedorn;
Ruscus aculeátus. *L.*

21.

großblättrige Stielfrucht;
Podocárpus macrophyllus.
Wall.

20.

lanzettblättrige Krahdistel;
Cirsium lanceolátum.
Scop.

19.

Stengelblatt der größeren Klette;
Lappa major. *Gärtn.*
(fólium caulínum.)

18.

orientalischer Mohn;
Papáver oriéntale. *L.*

17.

weidenblättrige Eiche;
Quercus Phellos. *L.*



16.

Fleisch-Mohn;
Papáver Rhœas. *L.*

15.

Kelchzipfel der blauen Passionsblume;
Passiflóra cærúlea. *L.*
(lacínia cálycis.)

G. Ch. Kuhns, Pflanzenblätter in Naturdruck.

Kupferdruck von J. Niederbühl.

Verlag von E. Schweizerbart (E. Koch) in Stuttgart.