

Rand der Blätter.

Kleinere Vorragungen.

Margo foliorum.

Prominentiae minores.

Le bord des feuilles.


Petites prominences.

c) kraus; crispum; frisée;




4. krause Käspappel; Malva crispa, L.

b) am Rand ausgestossen; margine erosum; rongée au bord.



3. fächerförmigblätterige Salisburia; Salisburia adiantifolia, Smith.

a) Handschweifig; ausgeschweift; margine repandum; chantournée au bord.



2. hahnenkamm-ähnlicher Fuchsschwanz; Amaranthus celosoides, H. B.

1. beigebret-artiger Nachtschatten; Korallen-Airshier; Solanum Pseudo-Capsicum, L.

f) doppelt-gekerbt; duplicato-crenatum; deux fois crénée.



8. rothblühende Wald-Salbei; Salvia silvestris, L. (fl. rubro.)

e) fein gekerbt; gekerbelt; crenulatum; crénelée;



7. Meer-Kettig; Cochlearia Armoracia, L.



6. nutzbarer Salbei; Salvia officinalis, L.

d) grob-gekerbt; grosse crenatum; grossièrement crénée.




5. gebräunliche Betonier; Betonica officinalis, L.

k) schief-gekerbt; oblique crenatum; crénée en biais.



12. Richard's Planera; Planera Richardi, Michx.

l) stumpfwinklig-gekerbt mit Stachelspitzen; crenatum angulis obtusis ac mucronatis; crénée en angles obtus et mucronés.



11. Sumpf-Dotterblume; Caltha palustris, L.

h) rundbogig-gekerbt; semicirculari-crenatum; crénée en demicircles.



10. gebräunliche Betonier; Betonica officinalis, L.

g) spitzbogig-gekerbt; crenatum ad arcum gothicum; crénée en ogives.



9. Verschaffelt's Schidenlippe; Colus Verschaefelti, hort.