

bibendū dedit. panos furtunculos incipiētes: du rīcias oēs uel cocto uel crudo utiliter illini putāt. itē  
īguē sacrū cū melle aceto nitroq; similiter podagris. Vngues scabros detrahere dicīt sine ulcere. Sūt  
qui in morbo regio dent semen eius cū melle. arterias & tōsilas nitro addito pficēt. Aluū moueant.  
Cocto aut per se aut cū malua aut lenticula cōcitātes uomitiōes. Siluestri capillos tingūt. & ad supra  
dicta utuntur medicina.

De malua malope: & althea: & la-

patio & oxylapato: & hydrolapato: & bubalapato.

cap. xxii.

**Q**Ontrario ī magnis laudibus malua est utraq; & satiua & siluestris. Duo genera eaq; āpli-  
tude folii discernūt. Maiorē græci malopē uocat in satiuis. alterā ab emolliēdo uētre dictā  
putāt malachē. E siluestribus cui grāde foliū & radices albe althea uocat ab excellētia esse  
etius a quibusdā aristalthea. omne solū in quo serunt pinguius faciunt. Huic cōtra oēs aculeatos iſtū  
efficacior uis: præcipue scorpionū: uespae: similiū: & muris aranei. Qui & tria cū oleo quilibet ea  
rū peruncti ante uel habentes eas nō feriūt. Folium ipositum scorpionibus torporē affert. Valēt &  
cōtra uenena. A culos oīs extrahunt illitæ crudæ aut cū aneto potea. Decocte uero cū radice sua lepo-  
ris marini uenena restringunt. Et ut quidam dicunt si uomatūt. de iisdē mira & alia tradūt. Sed ma-  
xime si quotidie quis succi ex qualibet eaq; forbeat cyathū dimidiū oībus morbis caritūt. Ulcera ma-  
natiā in capite sanat. in urina putrefactæ lichenas. Et ulcera oris cū melle radix decocta furfures capi-  
tis & dentiū mobilitates. eius que inum. caulē habet radice circa. dentem qui doleat perunge. donec  
desinat dolor. eadem strumas & parotidas panosq; addita hoīs saliuia purgat citra uulnus Semen i ui-  
no nigro potū a pituita & nauiseis liberat. Radix mammarum uitiis occurrit ad alligata in luna nigra  
Tussim in lacte cocta & forbitonis modo sumpta quinis diebus emendat. Stomacho iutiles sex ni-  
gra dicit. olympiades thebanus abortiuas esse cū adipe anseris. aliqui purgari foeminas foliis eaq; ma-  
nus planæ mensura in oleo & uino sumptis. Vtq; cōstat parturiētes foliis substrat s celerius solui p-  
tinus a partu de reuocādo: ne uulua sequatur. Dat & succū bibendū parturientibus i: iuniis i uino d-  
cocta hiemia. Quin & semē tritū ad alligāt brachio genitale nō continentium. adeoq; eae ueneri na-  
cuntur. ut semē unicaulis aspersum cubitali foeminarum auiditatis augere ad infinitū xenocrates tra-  
dat. item tres radices iuxta ad alligatas. Tenasco & dysentericis utilissime infūdi. itē fœdis uitiis: uel  
si foueātur. melācholicis quoq; succus datur cyathis tēmis tepidus. Et in sanientibus quaternis. deco-  
cte comitialibus heminē succi hic. & calculosis & inflatione & torminibus aut opistotonico iaborā-  
tibus tepidus illinitur. & sacris ignibus & ambustis decocta in oleū folia imponuntur. & ad uulnē  
impetus cruda cū pane succus decocte neriis: pdest: & uescicæ: & testinorē rosionib⁹ uulnas & cibo &  
infusiōe mollit in oleo. succus decocte pori meatus suaves facit. artheæ ī oībus supradictis efficacior  
radix p̄cipue conuulsis ruptisq;. Cocta in aqua aluū sifit. ex uino albo strumas & parotidas & māma  
rū inflāmationes. & panos in uino folia decocta & illita tollūt. eadē aida in lacte decocta q̄libet pri-  
ciose tussi citissime medētar. hippocrates uulneratis sitiētibusq; defectu sanguinis radicis decocte suc-  
cū bibēdū dedit. & eā uulneribus cū melle & resina. itē cōuulsis: luxatis: tumētibus: & musculis neriis  
articulis imposuit. & astmaticis ac dysentericis in uino bibēdū dedit. mirū aquā radice ea addita adē  
sari sub diuo: atq; elactescere. efficacior aut quo recētior. nec lapatiū dissimiles effectus habet. Est autē  
filestre: quod alii oxalidē appéllant: satiū proximū: foliis aquofis: colore betæ cādide: radice mini-  
ma. nostri uero rumicē: alii lapatium cantherinū ad strumas cū axungia efficacissimū. est & alterē ge-  
nus fere oxylapaton uocant. Satiū idē similius: & acutiora habet folia ac rubriora: nō nisi ī palustri-  
bus nascentis: Sunt qui hydrolapaton tradunt in aqua natū. est. & aliud hippolapatō maius satiū. cā-  
didiusq; ac spissus. Siluestria scorpionū ictibus medetur: & ferire prohibent habētes. Radix aceto de-  
cocta si colletur succus dētibus auxiliatur. Si uero bibatur morbo regio semē stomachi inextricabilia  
uitia sanat. hippolapati radices priuati ungues scabrosos detrahūt. Dysentericos semē duabus drā-  
mis in uino potū biberat. oxylapate semen lotū in aqua cælesti sanguinē pdest reiētibus adiecta  
acacia lentis magnitudine prodest. præstatiſſimos pastillos faciunt ex foliis & radice addito nitro &  
lure exiguo. in usu aceto diluunt. Sed satiū in epiphoris oculorū illinunt frōtibus. Radice melice  
rias & lepras curāt. in uino uero decocta strumas & potidas & calculos. poto uino & lienes cœliacos  
æque & dysentericos & tenascos. ex eadēq; omnia efficacius ius lapati & ructus facit: & urinā ciet:  
& caligine oculorum discutit: item pruritum corporis in folia balnearum additum: aut prius ipsū  
illitū sineo. Firmat & cōmanducata radix dentes eadem decocta cum uino sifit aluū. folia soluunt  
adiecto sale adiecit Solō nq; ut omittamus bulapaton: radicis tantum altitudine differens est & erga  
dysentericos efficacis effectus potum ex uino:

De sinapis tribus generibus: & marrubio: & serpillo: & sisymbrio siue thymbreo & de lini semi-

ne & a blito.

cap. xxii.

Sinapis cuius in satiuis tria genera diximus. Pythagoras principatū habere ex iis quorū sub-

Ceria

