

Liber

rum duum a radice spergens folia sere lappathi ferrata stamine purpureo. Folia siccantur i satinā plu-
rimos ad usus. Filiū ex ea & acetū stomacho & claritati oculorū. Tantūq; gloriæ hēt: ut domus in
qua sata sit tuta existimetur a piaculis oībus. In eadē hispania inuenta est cantabrica p Diui Augusti
tempora a cantabris reperta. Nascitur ubiq; caule iunceo pedali in quo sunt flosculi oblongi uelut cala-
thi. In iis semen perquā minutū. Nec alias defuere hispaniæ hærbis exquirēdis: ut in qbus etiamnum
hodie in uiro & latiore cōiectu potionē e cētu hærbis mulso additis credidere saluberrimū suauissi-
māq;. Nec quisquā genera eāq; iam nouit aut multitudinē. Numerus tantū cōstat in nomine. Nostra
ætas meminit hærbā in marsis repertā. Nascit æquiculis circūuicū neruesiae: uocat cōsiligo. prodest
ut demōstrabimus suo loco deploratis in pthisi. Inuenit nup & Seruilius Democrats primus medē
tiū quā appellauit hiberidā quaquā ficto nomine inuentioni eius assignato carmine. Nascit maxime
circa uetera monumēta parietinasq; & inculta itinerū. Floret semper folio nasturtii: caule cubitali: se-
mine tā paruo: ut uix aspici possit. Radici odor nasturtii. Usus æstate efficacior: & recēti tātū. Tundit
difficulter. Coxendicib⁹ & articulis oībus cū axūgia modica utilissima: uitis plurimis q̄ternis horis:
fœminis minus dimidio adalligata: ut dein in balneū descēdatur i calidā & postea oleo & uino cor-
pus perūgatur: diebusq; uicēnis īterpositis idē fiat sicca admonitio doloris supersit. Hoc mō rheuma-
tismos oēs sanat occultos. Imponitur nō in ipsa inflāmatione: sed iminuta. Animalia quoq; inuenere
hærbas: in primisq; chelidoniā. Hāc enim hirundines oculis pullo& in nido restituūt uisū: ut quidam
uolunt ērūt oculis. Genera eius duo. Maior fruticoso caule: folio pastinacæ erraticæ ampliore ip-
sa altitudine duū cubito&. Colos albicás. flos luteus. Minori folia hedere rotūdiora minus candida.
Succus croci mordax. Semen papaueris. Florent aduentu hitundinū. Discessu marcescūt. Florentib⁹
succus exprimitur: & in æreo uase cū melle attico leniter cinere seruēti decoqtur: singulari remedio
cōtra caligines oculorū. Utuntur & p se succo in collyriis: quæ chelidonia appellātur ab ea. Inueniunt
& canes canariā: qua fastidiū deducūt: eamq; in nostro cōspectu mandūt: sed ita ut nunquā intelliga-
tur quæ sit etiā depasta cernitur. Notata est aut hæc animalis huius malignitas in alia hærbā maior.
percussus enim a serpente: mederi quadā sibi dicitur: sed illā homine inspectate nō deceperit. Simpli-
cius ceruæ mōstrauere elaphoboscōn: de qua diximus. Itē seseli enixa a partu dictamū ostendere (ut
indicauimus) uulneratæ eo pastæ stati decidētibus telis. Nō est alibi q̄ in creta: ramis prætenue: pule-
gio simile: seruens & acre gustu: foliis tantū utūt. Flos nullus ei est: aut semen aut caulis. Radix te-
nuis & superuacua. Et in creta aut non spatiose nascit: mireq; a capris expetitur. pro eo ē & pseudo
dictamū multis in terris nascēs: folio simili: ramulis minoribus a qbusdā condris uocatū. Minoris
effectus statim intelligitur. Dictamū enim minima portiōe accēdit os. Qui legere eā: in ferula uel arū
dine condunt: præligantq; ne potentia euanscat. Sunt q̄ dicant utrāq; nasci multifariā: sed deterio-
res in agris pinguibus: uerā quidā dictamū non nisi in asperis. Est & tertium genus dictamū uocatū:
sed neq; facie neq; effectu simile folio sisypri: ramis maioribus procedente persuasione illa: quicqd in
cteta nascitur: infinito præstare cæteris eiusdem generis alibi gentis. p̄xime quod in parnaso: alioq; in
herbiferum esse & peliu monte in thessalia. Et telethrium in eubœa. Et totā arcadiam ac laconicam.
Tradunt arcades quidē nō medicaminibus uti: sed lacte circa uer: quoniā tunc maxime succis hærbē
turgeant: medicenturq; uberes pascuæ. Bibunt autem lac uaccinum: quoniā boues omniuoræ sūt in
hærbis. potentia earum per quadrupedes etiamnū duob⁹ claris exemplis manifesta fit. Circa abderāt
& limitē: qui Diomedis uocatur equi pasti inflāmantur rabie: circa pothniam uero & asini. Inter no-
bilissimas aristolochiæ nomen dedisse grauide uidentur: quoniā effet aristæ lechuses. Nostri malum
terræ uocat & quattuor genera eius seruant. Vnū cuberibus radicum rotundis foliis inter maluā &
hederam nigrioribus pinguioribusq;. Alterum masculæ radice longa quattuor digito& lōgitudine
bâculi crassitudine. Tertium longissimæ tenuitatis uitis nouellæ cui fit præcipua uis: quæ clematicis
uocantur: ab aliis cretica. Omnes colore buxeo. caulibus paruis: flore purpureo. Ferunt bacculas pat-
uas uelut cappari. Valent radice tantum. Est & quæ pistolochia uocatur quarti generis: tenuior q̄ p
xime dicta: densis radicis capillamentis iunci plenioris crassitudine: Hanc quidam polyyrrhizon co-
gnominant. Odor omnium medicatus. Sed oblonga radice tenuioriq; gravior. Carnosi enim est cor-
ticis: unguentis quoq; nardinis conueniens. Nascuntur pinguibus locis & campestribus. Effodere
eas messibus tempestuum: ita desquamato terreno seruantur. Maxime tamen laudatur pontica. Et
in quocunq; genere ponderosissima quæq; medicinis aptior. Rotunda contra serpentes. Oblonga
in summa tamen gloria est etiam modo. A conceptu admota uuluis in carne bubula mares figurati:
ut traditur. pescatores campaniae radicem eam: quæ rotunda est. uenenum terræ: uocant: coramq; no-
bis contusam immixte calce in mari sparsere: aduolant pisces cupiditate mira: statimq; exanimati
fluitant. Quæ polyyrrhizos cognominatur: conuulsis contusis ex alto præcipitatis radice pota-