

Ziber

Alas ro-
rantium
uel recen-
tium
Vstiones
Diosco.

unguntur ante: qbus paracentesis fit. lumentorū quoq; oculis medent. Succus caput purgat per narcs
infusus: ita ut deinde uino colluatur. Bibitur & contra angues succi drachma in uino. Mirum q; fo-
minā pecora uitant. At si decepta similitudine (flore enī tantū distant) degustauete statim eā quæ asy
la uocatur in remedio quærunt. Ea a nostris ferus oculus nuncupatur. Præcipiunt aliqui effossuris an-
te solem ortum prīusq; quicq; aliud loquātur ter salutare eam: tūc sublatā exprimere. Ita præcipuas es-
se uires. De euphorbio satis dictū est: cuius succus lippitudini si tumor erit. Item absinthium cū melle
tritum. Itemq; betonicæ farina cōueniet. Et egilopas sanat hærba eodem nomine: quæ in hordeo na-
scitur tritici folio semine contrito cū farina permixta īpositaq; uel succo. Exprimitur hic caulibus
foliisq; pregnantibus dempta spica: & in trimestri farina digerit in pastillos. Aliq; & mādragora ute-
ban̄. postea abdicatus in hac curatione est. Sed epiphoris quod certū est medetur: & oculoꝝ doloris.
Radix tusa cū rosaceo & uino. Nam succus multis oculoꝝ medicamētis miscetur. Mandragorā alii
circeum uocant. Duo eius genera. Candidus qui & mas: niger quæ fœmina existimatur. Angustiori
bus foliis quā lactucæ. Hirsutis & caulibus: radicibus binis ternis nigris foris. Intus albis: carnosis:
tenerisq; pene cubitalibus. Ferūt mala auellanarū nucum magnitudine. Et iis semen ceu pyrorū. Al-
bum hoc alii arsen. alii morion: alii hippoplomon uocant. Huius folia albaq; alterius latiora ut lappa-
ti satiuæ. Cauent effossuri contrariū uentū. Et tribus circulis ante gladio circuſcribūt. postea fodunt
ad occasum spectante. Succus fit & emalis & e caule deciso cacumine & radice. punctis aperta aut de-
costa utilis hæc uel surculo. Concisa quoq; in orbiculos seruatur in uino. Succus nō ubiq; inuenitur:
sed ubi potest: circa uindemias quærit. Odor grauis eius sed radicis & mali grauior. Mala matura in
umbra siccantur. Succus ex iis sole densatur. Itē radicis tusa: uel in uino nigro ad tertias decoctæ. Fo-
lia seruātur in muriis efficacius. Albus tori tantū succus pestis est. Sic quoq; noxiæ uires. Grauedinē
afferrūt etiā olfactu: q; mala in aliis terris mandan̄. Nimio tamen odore obmutescut ignari. potu q;
dem lasgiore etiā moriūt. Vis somnifica pro uiribus bibentiū. Mediapotio cyathi unius. Bibitur &
cōtra serpentes: & ante sectiones punctionesq; ne sentiantur. Ob hæc satis est aliqbus somnū odore
quæsisse. Bibitur & p helleboro duobus obolis in mulso. Efficacius helleborꝝ ad uomitiōes & ad bi-
lem nigrā extrahendā. Cicutæ quoq; uenenū est: publica atheniensiū poena intusa. Ad multa tamen
usus nō omittendi. Semen habet noxiū. Caulis at eius & uiridis: plerūq; & in patints. Lenis hic & ge-
niculatus ut calami īgricās. Altior sæpe binis cubitis: in cacuminibus ramosus. Folia coriātri tenuio-
ra: graui odoratu. Semen aniso crassius: radice cōcaua nullius usus. Semini & foliis refrigeratoria uis:
quæ si enecat: incipiūt algere ab extremitatibus corporis. Remedio est: priusquā perueniat ad uitalia:
uini natura excalactoria. Sed in uino pota irremediabilis existimatur. Succus exprimitur foliis florī-
busq;: tūc enim maxime tēpestiuus est & melior. Semine trito expressus & sole densatus in pastillos
necat: sanguinē expisando. Hæc altera uis. Et ideo sic necatoꝝ maculae in corporib⁹ apparent. Ad dis-
soluēda medicamēta utūt illo, p aqua. Fit ex eo ad refrigerandū stomachū malagma. præceptius ta-
men est ad cohibendas epiphoras æstuas oculorūq; dolores sedandos circumlitū. Miscetur collyriis:
Et alios oēs rheumatismos cohibet. Folia quoq; tumorem omnem doloremq; & epiphoras sedant.
Anaxilaus auctor est māmas a uirginitate il̄itas semper staturas. Quod certū est: lac puerperaꝝ mam-
mis imposta extinguit. Veneremq; testibus circa pubertatem illita. Remedia liberationi qbus biben-
da censetur: nō equidem præcipiūs. Maxima uis terræ parthotum: mox laconicæ: creticæ: asiaticæ. In
græcia uero megaricæ: deinde atticæ. Cremonos agrios gremias tollit oculoꝝ impositus: tumorem:
quoq; bolenta addita. Nascitur uulgo molibdena: id est plūbago etiā in aruo: folio lappati: crassa ra-
dice hispida. Hæc cōmāducata: si oculis subinde religatur: plumbū quod est genus uitii: ex oculis tol-
lit. Capnos pria quā pedes gallinaceos uocant: nascēs in parietinis: & sepibus ramis tenuissimis spar-
sisq;: flore purpureo uiridis: succo caliginē discutit. Itaq; in medicamenta oculoꝝ additur. Similis &
noie & effectu' alia est capnos fruticosa prætenera foliis coriātri: cineracei coloris: floř purpureo. Na-
scitur in hortis & segetib⁹ hordeaceis. Claritatem facit inūctis oculis delachymationēq; ceu fumus:
unde nomē accepit. Eadē euulas palpebras renasci phibet. A coron iridis folia hēt angustiora tamē
& lōgiore pediculo: radices nigras: minusq; uenosas. Cætero & has similes iridis: gustu acres: odore
nō igratas: ruftu faciles. Optimæ pōticæ: dei galaticæ: mox creticæ. Sed primæ i colchide iuxta pha-
sin amnē: & ubiq; i aquosis. Recētib⁹ uirus mai⁹ q; uetus. Creticæ cādidiōres pōticis. Siccatur utri-
b⁹ i umbra dygitalib⁹ fructis: necnō iueniūtur q; oxymyrsinæ radicē acorō uocat ideoq; qdā hāc acrō
agriō uocare malūt. Vis ei ad calfaciēdū extenuādūq; efficax cōtra suffusioñes & caligines oculoꝝ sue-
co eiusdē poto: cōtraq; serpētes. Cotyledō parvula herba cauliculo tenero: pusillo pingui folio: & cō-
cauo ut coxēdices. Nascitur in maritimis petrosisq; uiridis: radice oltuæ mō rotūda. Oculis medetur
succo. Est aliđ gen⁹ eiusdē sordidis foliis: latorib⁹: dēsiorib⁹ circa radicē uelut oculoꝝ: cingētib⁹ asp-