

Trigesimus octauus

men ex causa accepit per mediū foliū candida linea transcurrente. Quare mesoleucon quidā uocat. Succus eius fistulas sanat. ipsa contrita carcinomata. fortassis eadē sit quæ leucas appellatur. Contra omnia marina uenena efficax. Speciem eius auctores non tradunt: nec aliud q̄ siluestrem latioribus foliis esse efficaciorē hanc semine aciore. leucographis qualis esset scriptū nō reppi: Quod & magis miror: quoniā utilis proditur sanguinem excreantibus tribus obolis cū croco. itē cœliacis trita aqua & apposita. profluuio fœmina. oculoꝝ quoq; medicamentis. Et explendis ulceribus quæ fiūt i teneris partibus corporis.

De medio: & myosota: & myagro: & natrice: & othōe: & onosma: & onopordo: & oxyri: & oxye: & batrachio: & polygono: & leucanthemo: & plythema: & phyllo: & phellādrio: & phuleri & polyrhizo: & proserpinaca: & de rhecoma: de reseda & stoechade. Cap. xii.

Seridis
Diosc.

M Edion folia habet iridis fatiua: caulem tripedalem: & in eo florem grandē purpureū rotū dū semine minuto: radicem semipedalē. in saxis opacis nascitur. Radix drachmis .ii. cum melle menses fœminarū sistit eclegmate per aliquot dies sumpto. Semen quoq; i uino tritum contra abundantiam fœminarū datur. Myosota siue myosotis leuis hærba: caulibus plurib⁹ ab una radice aliquatenus rubentibus concauis ab imo: foliis angustis oblongis: dorso acuto nigris p̄ iterualla assidue geminantibus & tenuibus cauliculis ex alis prodeuntibus. flore caruleo. Radix digitali crassitu dine multis capillamentis fibrata. uis ei styptica & exulceratrix. ideoq; ægilopas sanat. tradunt ægyptii mensis quē thiatin uocant: die. xxvii. fere in augusto mense incurrente. si quis hui⁹ hærbae succo inungat mane piusq; loquatur nō lippitur eo anno. Myagros hærba ferulacea ē foliis similis rubiæ tripedanea. Semē oleosū: quod & fit ex eo: medetur oris ulceribus perunctis hoc succo. hærba q̄ uocat nigina tribus follis longis intubaceis illita: cicatrices ad colorē reducit. nattix uocat hærba cuius radix euulsa uirus hirci redolet. Hac in piceno a fœminis abigūt: quos mira persuasione fatuos uocant. ergo species lymphantiū hoc mō animoꝝ esse credim⁹. qui tali medicamento inuenitur. odonties inter fœni genera est: cauliculis densis ab eadem radice geniculatis triagulis nigris geniculis folia parua hēt longiora tamen q̄ polygonon. Semē in alis hordeo simile. florē purpureū pusillū. Nascitur in pratis. Decoctū cauliculoꝝ eius in uino austero quantum manus capiatur: dentiū dolori medetur: ita ut contineatur ore. Othōe in syria nascitur. similis erucæ perforatis crebro foliis flore croci: quare quidam anemones uocauerunt. Succus eius oculoꝝ medicamentis cōuenit. Mordet enim leuiter & excalfacit astringitq; siccando. purgat cicatrices & nubeculas. & quicquid obstat. q̄ det enim leuiter & excalfacit astringitq; siccando. purgat cicatrices & nubeculas. & quicquid obstat. q̄ dā tradunt lauari: atq; ita siccata digerit in pastillos. onosma longa folia hēt fere ad tres digitos in terra iacentia tria ad similitudinē ancuse incisa sine caule sine flore sine semine. pragnans si edat eā aut sup gradiat: abortū facere dicitur. onopordon si comederint asini. crepitus reddere dicūtur. Trahit urinas & menses. Aluum sistit suppurationes & collectiōes discutit. osiris ramulos fert nigros tenues lentos & in iis folia nigra ceu lini. Semenq; in ramulis nigrū initio. colore mutato rubescēs. Smegmata mulieribus faciunt ex iis radicū decoctū potū sanat arquatos. Eadem priusquā mature. scat semen: concisa & sole siccata aluū sistunt. post maturitatē uero collecta & in sorbitiōe decocta rheumatismis uentris medentur: & per se trita ex aqua cœlesti bibūtur. oxis folia terna hēt. Datur ad stomachum dissolutum. Edunt & qui enterocelon habent. polyanthemū. quā quidā batrachion appellant: caustica ui exulcerat cicatrices. & colorem reducit. adēq; utiligines concorporat polygonon. non græci uocant quā nos sanguinariā: non attollitur a terra foliis rutæ similis gramini. succus ei⁹ ifusus naribus supprimit sanguinē. & potius cū uino cuiuslibet partis profluuū excreatiōesq; cruetas inhibet. Qui plura genera polygoni faciunt: hanc marē intelligi uolunt. appellariq; a multitudine feminis. aut densitate fruticis calligonon. Alii polygonon a frequētia geniculoꝝ. alii athalida: alii carcinathro alii clema: multi n. yrtopetalon. nec nō inueniūt q̄ hanc fœminā eē dicāt. Marē at maio rē minusq; nigrā & geniculis densiorē. semine sub oibus foliis turgescētē. Quocūq; hæc mō se habeant: uis earum est spiffare ac refrigerare. Semine aluū soluūt largius sumpto. Vrinā ciēt. Rheumatismos cohibent. Qui si nō fuerit: nō profunt. Stomachi feruori folia imponūtur Vesice dolori illitūtur & ignibus sacris. Succus & auribus purulentis instillatur. & oculoꝝ dolori p̄ se. Dabatur & in febribus ante accessiones duobus cyathis in tertianis quatemisue p̄cipue. item choleticis dysentericis. & i solutione stomachi. Tertiū genus oreon uocatur in montibus nascens. atundini tenere simile. uno caule. densis geniculis. & in se fractis. foliis at piceæ. radicis superuacua. inefficacius q̄ supiole. peculiare ischiadicis. Quartū gen⁹ siluestre appellatur pene arboris frutice radice lignosa stirpe cetera. spiffadi natura Sapor mali cotōei. Deccoq; in aq̄ ad tertia. aut aridi farina insp̄ gi. ē & oris ulcerib⁹ & atritis partib⁹ p̄pter gig. uag. uero uitia ipsa cōmāducat. nomas sistit. oiaq; q̄ serpūt aut difficilem

Poligo
naton :

B iii