

## TAFEL XII

Fig. 1 und 2 *Kontheria striata* ROSELT n. sp.

Fig. 1 Ausschnitt von Tafel VIII, Fig. 1. Links Hauptspindel mit abgehenden Fiederspindeln. In der Mitte der Fiederspindeln sowie in der Hauptspindel (durch die seitliche Lage mehr seitlich) ist mehr oder weniger deutlich der Verlauf je einer Furche oder Leiste zu erkennen.

Auffällig ist die charakteristische Längsstreifung. Borstenhaare hier weniger deutlich.

Maßstab 2:1

Fig. 2 Stück einer Hauptspindel des auf Tafel X abgebildeten Stückes mit deutlicher Längsstreifung und gut sichtbaren Borstenhaaren bzw. Abdrücken ihrer runden bis ovalen Haarbasen. (Die Tafel ist bei Betrachten des Bildes um 90° nach rechts zu drehen.)

Maßstab 2:1

Fig. 3 *Callipteris scheibei* GOTHAN

Wedelstück mit weniger deutlich erhaltenen Borstenhaaren auf der Unterseite der Spindeln. Auffällig ist die Übereinstimmung mit Fig. 1, wo ebenso die Längsstreifung sowie der herablaufende Ansatz der Fiederspindeln vorhanden ist. Ausschnitt von Tafel V, Fig. 1.

Maßstab 2:1