

## TAFEL XXI

Fig. 1 bis 4 *Callipteris scheibei* GOTHAN

Reste von Fiedern 2. und 3. Ordnung mit den charakteristischen keulen- bis birnenförmigen, z. T. etwas abgestutzten Fiederlappen, aus dem Unteren Rotliegenden von Mähren (CSSR), Antonin-Mine bei Zbýšov. Das Stück in Fig. 1 und 2 ist ein Original zu AUGUSTA 1947, Tafel III, Fig. 8.

Fig. 1 und 3 Maßstab 1:1

Fig. 2 und 4 Maßstab 2:1

Fig. 5 bis 8 *Callipteris naumanni* (GUTBIER) STERZEL

Fig. 5 und 6 Ein Wedelstück mit ansitzenden Fiedern und Zwischenfiedern bzw. mit kata-drom-winkelständigen Fiederchen.

Sammlung ARNHARDT. Unteres Rotliegendes, Manebacher Schichten; Pfanntal bei Gehlberg/Thür., Grube Fürchtegott

Fig. 5 Maßstab 1:1

Fig. 6 Maßstab 2:1

Fig. 7 und 8 Ausschnitte, die sphenopteridische Gestalt der Fiederchen und ihren Aufbau aus 3 bis 4 verwachsenen Fiederlappen zeigend.

Fig. 7 Maßstab 5:1

Fig. 8 Maßstab 3:1