

# Synopsis der Europäischen Fledermäuse.

Sippe. Zunft.	Genus.	Subgenus.	Arten.				
Chiroptera entomophaga. Fledermäuse. Blattansätze an der Nase. vorhanden. Fibula fehlt. verwachsen. Epiblema. fehlt. Zähne. 34 Zähne. Phyllorhina. Blattnäser. Rhinolophus. 32 Zähne. Kammnase.	32. <i>Vesperus</i> . Abendflatterer. 34. <i>Vesperugo</i> . Segler. 38. <i>Vespertilio</i> . Nachtschwirrer. 36. <i>Miniopterus</i> . Kleinflügler. 36. <i>Plecotus</i> . Flechtohr. 32. <i>Dysopes</i> . Grämaler. <i>Synotus</i> . Bindohr. <i>Rhinolophus</i> . 32 Zähne. Kammnase.	Ohrdeckel erreicht die grösste Breite Zehenwurzel. Tragus erreicht die grösste Breite Fusswurzel. Tragus erreicht die grösste Breite Fusswurzel. kürzer ebenso lang. länger nicht länger. bis zur Zehenwurzel nicht bis zur Fusswurzel. bis zur Fusswurzel. Ohreinschnitt Ohren ragen	Nur eine Art . . . . . Nur eine Art . . . . . Nur eine Art . . . . . Nur eine Art . . . . . Nur eine Art . . . . . Nur eine Art . . . . . Nur eine Art . . . . . Nur eine Art . . . . . Nur eine Art . . . . . Nur eine Art . . . . . Nur eine Art . . . . . Nur eine Art . . . . . Nur eine Art . . . . . Nur eine Art . . . . . Nur eine Art . . . . .	<i>Serotinus</i> . <i>Nilssonii</i> . <i>Discolor</i> . <i>Savii</i> . <i>Leucippe</i> . <i>Aristippe</i> . <i>Maurus</i> . <i>Nathusii</i> . <i>Pipistrellus</i> . <i>Kuhlii</i> . <i>Leisleri</i> . <i>Noctula</i> . <i>Mystacinus</i> . <i>Daubentonii</i> . <i>Dasycnemus</i> . <i>Nattererii</i> . <i>Ciliatus</i> . <i>Bechsteini</i> . <i>Murinus</i> . <i>Schreibersii</i> . <i>Auritus</i> . <i>Cestonii</i> . <i>Barbastellus</i> . <i>Clivus</i> . <i>Euryale</i> . <i>Hippocrepis</i> . <i>Ferrum equinum</i> .			
					vorhanden. Zähne.	unter der Mitte des Aussen-Tiefflatterer. <i>Cateorus</i> .	länglich. Ohr endet am Mundwinkel. <i>Nilssonii</i> .
					frei. Epiblema	über der Mitte des Aussen-Hochflatterer. <i>Meteorus</i> .	rundlich. Ohr endet unter dem Mundwinkel. <i>Discolor</i> .
					fehlt. Zähne.	Tragus erreicht die grösste Breite	nierenförmig. <i>Savii</i> .
					vorhanden. Zähne.	in der Mitte. <i>Hypsugo</i> . Alpensegler.	halb-rund. Schnauze. gerundet. <i>Leucippe</i> .
					fehlt. Zähne.	unter der Mitte. <i>Nannugo</i> . Zwergsegler.	spitz. <i>Aristippe</i> .
					fehlt. Zähne.	Tragus erreicht die grösste Breite	unter dem Mundwinkel. 1. Schneidezahn. zwei-spitzig. <i>Nathusii</i> .
					fehlt. Zähne.	unter der Mitte. <i>Panugo</i> . Wald-Segler.	an dem Mundwinkel. 1. Schneidezahn. grösser. <i>Pipistrellus</i> .
					fehlt. Zähne.	Fusswurzel. Tragus erreicht die grösste Breite über der Mitte.	gleich-gross. <i>Leisleri</i> .
					fehlt. Zähne.	Tragus erreicht die grösste Breite	grösser. <i>Noctula</i> .
					fehlt. Zähne.	Tragus erreicht die grösste Breite	bis zur Zehenwurzel. <i>Mystacinus</i> .
					fehlt. Zähne.	Tragus erreicht die grösste Breite	nicht bis zur Zehenwurzel. { zur Mitte der Fusssohle <i>Daubentonii</i> . zur Ferse . . . <i>Dasycnemus</i> .
					fehlt. Zähne.	Tragus erreicht die grösste Breite	über die Mitte der Fusssohle Uropatagium dicht wimperig <i>Nattererii</i> .
					fehlt. Zähne.	Tragus erreicht die grösste Breite	zur Zehenwurzel. Uropatagium dünn wimperig <i>Ciliatus</i> .
					fehlt. Zähne.	Tragus erreicht die grösste Breite	zur Zehenwurzel. <i>Bechsteini</i> .
fehlt. Zähne.	Tragus erreicht die grösste Breite	zur Mitte der Fusssohle . . . . . <i>Murinus</i> .					
fehlt. Zähne.	Tragus erreicht die grösste Breite	bis zur Schnauzenspitze. <i>Clivus</i> .					
fehlt. Zähne.	Tragus erreicht die grösste Breite	über die Schnauzenspitze <i>Euryale</i> .					
fehlt. Zähne.	Tragus erreicht die grösste Breite	spitzwinkelig . . . . . <i>Hippocrepis</i> .					
fehlt. Zähne.	Tragus erreicht die grösste Breite	flachwinkelig . . . . . <i>Ferrum equinum</i> .					