

Durchschnittliche Maasse der Europäischen Fledermäuse.

Fledermaus - Art.	Körperlänge.		Schwanzlänge.		Flugweite.		Vaterland.
	Zoll.	Meter.	Zoll.	Meter.	Zoll.	Meter.	
<i>Vesperus serotinus.</i> Daub., der späte Tiefflatterer.	2" 6'''	0,0691	2"	0,0555	13"	0,3618	Europa.
<i>Vesperus Nilsonii.</i> Blas., der Umlerflatterer.	2"	0,055	1" 9'''	0,0485	10"	0,277	Ost-Europa.
<i>Vesperus discolor.</i> Kuhl., der weissscheckige Hochflatterer.	2"	0,0555	1" 6'''	0,0416	10" 6'''	0,29	Europa.
<i>Vesperus Savii.</i> Bonap., der Herz-Abendflatterer.	2"	0,0555	1" 9'''	0,0485	10"	0,277	Italien.
<i>Vesperus Leucippe.</i> Bonap., der Seiden-Abendflatterer.	1" 9'''	0,0485	1" 3'''	0,0349	9"	0,25	Sicilien.
<i>Vesperus Alcippe.</i> Bonap., der spitzmäulige Abendflatterer.	1" 6'''	0,0416	1" 3'''	0,0349	8" 2'''	0,2257	Sicilien.
<i>Vesperugo maurus.</i> Blas., der Alpensegler.	1" 9'''	0,0485	1" 3'''	0,0349	8" 6'''	0,236	Alpen.
<i>Vesperugo Nathusii.</i> Blas., der schienharige Zwergsegler.	1" 6'''	0,0416	1" 4'''	0,0375	8"	0,222	Deutschland. Griechenland.
<i>Vesperugo pipistrellus.</i> Daub., der gemeine Zwergsegler.	1" 3'''	0,0349	1"	0,028	7"	0,195	Europa.
<i>Vesperugo Kuhlii.</i> Natterer., der haarbindige Zwergsegler.	1" 8'''	0,047	1" 4'''	0,0375	8"	0,222	Transalpin.
<i>Vesperugo Leisleri.</i> Kuhl., der kleine Waldsegler.	2"	0,055	1" 6'''	0,0416	11"	0,305	Deutschland.
<i>Vesperugo Noctula.</i> Daub., der grosse Waldsegler.	3"	0,0835	2"	0,0555	14" 6'''	0,403	gemässigte Eu- ropa.
<i>Vespertilio mystacinus.</i> Kuhl., das schnurrbärtige Kurzohr.	1" 6'''	0,0416	1" 6'''	0,0416	8"	0,222	Mittlere Schwe- den. Westeuropa. Deutschland.
<i>Vespertilio Daubentonii.</i> Kuhl., das rothgraue Kurzohr.	1" 9'''	0,0485	1" 6'''	0,0416	9"	0,25	Westeuropa. Deutschl. Schwe- den. Sicilien.
<i>Vespertilio dasycnemus.</i> Boie., das flughaarige Kurzohr.	2" 3'''	0,0624	2"	0,0555	11"	0,305	mittlere Europa.
<i>Vespertilio Nattererii.</i> Kuhl., das gewimperte Gleichohr.	1" 8'''	0,047	1" 6'''	0,0416	9" 6'''	0,26	von Schweden bis zum Mittelmeere.
<i>Vespertilio ciliatus.</i> Blas., das fuchsrothe Gleichohr.	1" 6'''	0,0416	1" 7'''	0,044	9"	0,25	Mitteleuropa.
<i>Vespertilio Bechsteinii.</i> Kuhl., das grossohrige Mäuseohr.	2"	0,0555	1" 6'''	0,0416	10"	0,277	Mittel- und Süd- europa.
<i>Vespertilio murinus.</i> Linné., das mittelohrige Mäuseohr.	2" 8'''	0,0745	2"	0,0555	14"	0,3885	Mittel- und Süd- europa.
<i>Miniopterus Schreibersii.</i> Kuhl., der Taschen-Kleinflügler.	1" 11'''	0,053	2" 2'''	0,062	11"	0,305	Ungarn und Süd- europa.
<i>Plecotus auritus.</i> Linné., das Flechtohr.	1" 9'''	0,0485	1" 6'''	0,0416	9" 6'''	0,26	Europa.
<i>Dysopes Cestonii.</i> Savi., der europäische Grämmler.	3"	0,0835	1" 11'''	0,053	14"	0,388	Italien.
<i>Synotis barbastellus.</i> Schreb., das Bindeohr.	2"	0,055	1" 6'''	0,0416	9"	0,25	Europa.
<i>Rhinolophus clivosus.</i> Rüpp., die Hügelkammnase.	2"	0,055	11"	0,0258	8" 6'''	0,236	Dalmatien.
<i>Rhinolophus Euryale.</i> Blas. die Zackenkammnase.	1" 8'''	0,047	1"	0,028	10"	0,277	Nördliche Italien.
<i>Rhinolophus Hipposcopsis.</i> Herm., die kleine Hufeisennase.	1" 6'''	0,0416	1" 1'''	0,032	8" 6'''	0,236	Mittel- und Süd- europa.
<i>Rhinolophus ferrum equinum.</i> Daub., die grosse Hufeisennase.	2" 2'''	0,062	1" 4'''	0,0375	12"	0,334	Mittel- und Süd- europa.