

Ausmaass.
 Körperlänge: 0,0485
 Schwanzlänge: 0,035
 Flugweite: 0,25 Pariser Meter.

Vorkommen. Sicilien.

5. Art: *Aristippe**) BONAPARTE. *Der spitzmäulige Abendflatterer.*

Bonaparte Iconographie. 20.

Blasius et Keyserling Wirbelth. Europ. 52.

Temminck Monogr. Mamm. II. 200.

Giebel allg. Zool. Säugeth. 1855. 10. pag. 943.

Schnauze spitz, zusammengedrückt, die Ohren von $\frac{3}{4}$ Kopfeslänge, etwas gerundet, aussen unter der Mitte sehr schwach gebuchtet, der Ohrdeckel halb elliptisch, über $\frac{2}{3}$ Ohrlänge, der angedrückte Unterarm überragt die Schnauzenspitze, die Füße klein und wenig frei, der Pelz der Rückenseite mit dunkelbraunem Grunde, an der Oberfläche blass graugelblich, der Bauchseite mit dunkelbraunem Grunde, an der Oberfläche grauweisslich, das 0,007 Pariser Meter lange Haar mit 535 Spiralumgängen, von denen 179 von den charakteristischen der 3. Art gar nicht verschieden sind.

Ausmaass.

Körperlänge: 0,046

Schwanzlänge: 0,0352

Flugweite: 0,235 Pariser Meter.

Vorkommen. Sicilien.

6. Art: *Savii* BONAPARTE. *Der Herz-Abendflatterer.*

Bonaparte Iconographia. 20.

Blasius et Keyserling Wirbelth. Europ. 51.

Temminck Monogr. Mamm. II. 197.

Giebel allg. Zool. 10. pag. 942.

Schnauze spitz, der erste obere Schneidezahn fast so gross wie der zweite, die Ohren von $\frac{2}{3}$ Kopfeslänge, breit herzförmig, aussen schwach gerundet, der Ohrdeckel nierenförmig, nicht bis zur Ohrmitte reichend, der angedrückte Unterarm reicht bis zur Schnauzenspitze, der Pelz an der Rückenseite rauchbraun ins Umerbraune ziehend, an der Bauchseite am Grunde schwärzlich mit grauweisslichen Spitzen, das Kinn schwärzlich.

Ausmaass.

Körperlänge: 0,053

Schwanzlänge: 0,035

Flugweite: 0,278 Pariser Meter.

*) Noch wahrscheinlicher ist es, dass diese Art ein Jugendzustand oder eine klimatische Abart des *V. discolor* sei, nachdem der *discolor* in Sicilien vorkommt. Nur die Vergleichung mehrerer Exemplare kann uns Gewissheit verschaffen.