

stumpfen Winkel mit den Umgangswänden bildet. Bewohnen Höhlen und schwirren von früher Dämmerung bis Mitternacht. Eine Europäische Art.

1. Art: *Schreibersii* KUHL. *Der Taschen-Kleinflügler.*

Kuhl in Wetterauer Annalen. IV. 41.

Blasius et Keyserling Wirbelth. Europ. 45.

Lüben Säugeth. 1848. pag. 269. Taf. XXIII. B. Fig. 1.

Kolenati Zoologie 1855. § 116. pag. 254.

Giebel allg. Zool. Säugeth. 10. Lief. 1855. pag. 950.

Miniopterus Ursinii. Bonaparte. Iconograp. ital. 21. Fol. 106.

Vespertilio Orsini } Temminck Monogr. Mammal. II. 179. 212.

Vespertilio dasythrix } Tab. 49. Fig. 1. 2. Tab. 53. Fig. 1. 2.

Vespertilio blepotis }

Die oberen Schneidezähne gleich gross, die Ohren klein, rhombisch, fast rechtwinkelig, der Tragus ziemlich gleichbreit, fast bis zur Ohrmitte reichend, das starke Patagium ist an der Unterseite längs des Oberarmes dicht behaart, längs der Ulna an den Queradern schütter büschelförmig behaart, an der Oberseite um die Handwurzel (am längsten und am breiten Dactylopatagium) schütter behaart, das Plagiopatagium ulnae vom Plagiopatagium brachii durch eine starke vom Ellbogen verlaufende Ader getrennt, der Schwanz länger als der Körper, ganz in der Periscelis eingeschlossen und durch Beugung der Spitze mit derselben eine Tasche bildend, mit 13 schief zulaufenden Gefässquerwülstchen, der Pelz der Rückenseite braungrau, der Bauchseite hellaschgrau, sehr dicht, die Behaarung erstreckt sich um den Körper an das Patagium, an der Rückenseite weniger weit, das 0,0068 Pariser Meter lange Haar mit 947 Spiralumgängen, von denen 409 charakteristisch und 72 an der Wurzel zickzackartig sind.

Ausmaass.

Körperlänge: 6,054

Schwanzlänge: 0,059

Flugweite: 0,306 Pariser Meter.

Aufenthalt: Im südlichen Europa bis 8000' Meereshöhe, in den Höhlen bei Golumbacz, in der Veteranen-Höhle bei Mehadia, im Banat, Siebenbürgen und Serbien, in Dalmatien, in den Höhlen des Mont Como, in den Höhlen des Kaukasus, in Asien bis Japan und Java, im nördlichen und südlichen Afrika. Die Afrikanischen sind wie alle südlichen Exemplare etwas kleiner.

Parasiten. Zellenschmarotzer: 1) Nematodeum Miniopteri. *Kolenati.*

2) Trichina Miniopteri. *Kolenati.*

Flughautschmarotzer: 3) Pteroptus psi. *Kolenati.*

Pelzschmarotzer: 4) Nycteribia Blasii. *Kolenati.*