

Lanius excubitor. **Lin.** Cast.: Pica griega cenicienta. And.: Alcan-dor real. — Lebt in den Ebenen und Baumanlagen der Provinz Sevilla. Erscheint im Frühling und geht im Sommer weg. Sehr gemein.

L. rufus. **Briss.** Cast.: Pica griega roja. — Hält sich in denselben Orten als die vorhergehende Art auf. Gemein im Frühjahr und Sommer.

L. meridionalis. **Tem.** Cast.: Pica griega meridional. And.: Alcan-don morisco. — Kommt in denselben Gegenden als die vorigen vor und erscheint um dieselbe Zeit. Sehr gemein.

L. minor. **L.** Cast.: Pica griega pequeña. — Wohnt in den Ebe-nen und Feldern der ganzen Provinz. Erscheint im Frühjahr und zieht Ende Sommer's fort. Gemein.

L. collurio. Cast.: Desollador. — Lebt in den Ebenen und Baum-anlagen der Provinzen Sevilla, Cadiz und Huelva. Erscheint im März und geht im Sommer wieder fort. Ziemlich selten.

Troglodytes parvulus. **Koch.** Cast.: Curruca troglodita. — Hält sich in den Feldern und Anlagen der ganzen Provinz und in den Gärten von Sevilla auf. Gemein und zieht im Winter durch.

Sylvia luscinia. **Lath.** Cast.: Ruiseñor. — Kommt in der ganzen Provinz vor, in den mit Sträuchern bewachsenen Feldern, welche in der Nähe von Bächen sich befinden. Sehr gemein an den Ufern des Gua-dalquivir. Einheimisch.

S. rubecula. **Lath.** Cast.: Gargantirojo. — Lebt in den Bauman-lagen und Gärten der ganzen Provinz. Ist sehr gemein im Winter und verschwindet im Frühjahr.

S. curruca. **Lath.** Cast.: Curruca. — Hält sich in den mit Sträu-chern bedeckten Feldern und in den Gärten und Baumanlagen der Pro-vinz Sevilla auf. Kommt im Winter und zieht im Frühjahr ab. Gemein.

S. cinerea. **Lath.** Cast.: Curruca cenicienta. — Lebt in denselben Orten als die vorigen. Einheimisch und häufig.

S. melanocephala. **Tem.** Cast.: Curruca melanocefala. — Findet sich in den nahe bei Sevilla gelegenen Gärten und Fruchtgärten vor. Einheimisch und gemein.

S. phoenicurus. **Lath.** Cast.: Ruiseñor de paredes. — Kommt in den Umgebungen von Sevilla, in den Gärten und Fruchtgärten vor. Dieser Vogel baut sein Nest auf die Mauern, welche die Landhäuser umgeben. Erscheint im September oder bei dem ersten Regen am Ende des Som-mers und verschwindet im Februar oder März. Ziemlich selten.

S. tithys. **Lath.** Cast.: Colirojo. — Hält sich auf den Ebenen und bebauten Feldern in der Nähe der Landhäuser und Meiereien auf. Es ist die Art, welche zuerst bei uns ankommt. Sie hält sich dieselbe Zeit als die vorige Art auf. Sehr gemein.