

## Zweite Ordnung: Sperlingsvögel. Passeres.

## Erste Zunft. Flieger. Volucres.

## I. Familie. Nachtschwalben. Caprimulginae.

## Erste Sippe. Ziegenmelker. Caprimulgus, Linné.

38. *C. europaeus*, Lin. Der gemeine Ziegenmelker.

Spanisch: Engañapastor (Hirtenbetrüger), Papavientos (Windvater), Chotacabras (Ziegenmelker), Zamaya und Zumaya. Galizianisch: Denoiteira.

Auf dem Zuge durch ganz Spanien (erscheint Ende Septembers und Mitte Aprils); im Norden, d. h. Catalonien, Galizien, Asturien, Leon, Navarra etc. wohl auch den ganzen Sommer; demnach: Brut- und Zugvogel. *Machado* behauptet, dass die Gesimse und Fensterbretter der Tabaksfabrik von Sevilla „voll von Nestern dieses Vogels wären“. Was ich davon denke, brauche ich deutschen Ornithologen nicht zu sagen; sie werden wohl alle meiner Ansicht sein. Nur so viel sei bemerkt, dass wir unsrerseits den gemeinen Ziegenmelker zur Sommerszeit niemals südlich von *Valencia* gesehen haben.

39. *C. ruficollis*, Temm. Der rothhälsige Ziegenmelker.

Spanisch: Wie der Vorige.

Von *Valencia* aus südlich nicht gerade selten, gewöhnlich aber in gebirgigen, schwer zugänglichen Orten; sonst auch in Olivenpflanzungen. In *Madrid* häufig im königlichen Lustgarten Buen-Retiro. — Brut- und Zugvogel.

## II. Familie. Tagschwalben. Hirundininae.

## Erste Sippe. Segler. Cypselus, Illiger.

40. *C. melba*, Illiger. Der Alpensegler.

Spanisch: Vencejo. Catalonisch: Falsia blanca.

Auf allen Hochgebirgen Spaniens in Schaaren oder Gesellschaften. Beobachtet sehr zahlreich am *Monserat*, einzeln bei *Enguera*, Provinz *Valencia*, und bei *Murcia*. — Brut- und Zugvogel.

41. *C. apus*, Lin. Der Mauersegler.

Spanisch: Vencejo. Catalonisch und Valencianisch: Falsia.

In Gesellschaften häufig durch ganz Spanien, hauptsächlich an Felsenwänden, wo er in ungemein zahlreichen Kolonien brütet. Er verlässt das Land mit gewohnter Pünktlichkeit in den ersten Tagen des August; allein trotzdem sahen wir ihn *noch Mitte Oktobers* häufig um die Thürme der Kathedrale *Malagas*, und am *18. November ihn, oder Cotyle rupestris* in einem starken Fluge um die Felsen des *Genilthales* in der *Sierra-Nevada* fliegen. Für die Richtigkeit dieser Beobachtungen büрге ich. — Brut- und Zugvogel.

## Zweite Sippe. Spiessschwalben. Cecropis, Boje.

41. *C. rustica*, Lin. Die Rauchschnalbe.

Spanisch: Golondrina. Valencianisch: Oroneta.

Etwas weniger häufig als bei uns; sonst aber in Allem analog dem in Deutschland zu Beobachtenden. Brut- und Standvogel.