

161. *H. Arigonis*, nobis, *) spec. nov. Arigo's Gartensänger oder Bastardnachtigall.

Valencianisch: Cherna.

Diagn. *Hypolais communis* magnitudine; in corpore superiori colore viridi-griseo, in inferiori albescenti; differt ab *H. olivetorum*, *elaieica* et *pallida* rostro multo latiori.

Diese Bastardnachtigall ist namentlich im Königreich Valencia häufig; in den Spaziergängen von *Játiva de San Felipe* sogar gemein. Sie brütet in Spanien, verlässt aber das Land. Wo sie auftritt, verdrängt sie die Vorhergehende fast gänzlich. Eine genaue Beschreibung ihrer Lebensweise wird folgen.

Anmerkung. Unsere *H. salicaria*, Bp. (Mot. *hippolais*, Lin.) ist von uns niemals in Spanien beobachtet worden.

Achte Sippe. Nachtigallschilfsänger. Luscinioptis, Bp.

162. *Lusc. Savii*, Bp. (*S. luscinioides*).

Ein bei Murcia erlegtes Exemplar befindet sich in *Guirao's* Sammlung. Ich kann mich aber in der Bestimmung vielleicht geirrt haben, da mir kein Exemplar zur Vergleichung vorlag.

Neunte Sippe. Heuschreckenschilfsänger. Locustella, Gould & Brm.

163. *L. Rayi*, Gould. Ray's Heuschreckenschilfsänger.

Ein einziges Exemplar dieses Vogels erlegte ich am 13. September bei Murcia. Ausserdem habe ich ihn nirgends gesehen. Auch die spanischen Ornithologen erwähnen seiner nicht.

Zehnte Sippe. Rohrsänger. Calamoherpe, Boje.

164. *C. turdoides*, Boje. Die Rohrdrossel.

Valencianisch: Cherna roquera und Cherna de las cañas.

Nicht selten in den Rohrbeständen, welche Flussufer und die Wasserleitungsgräben der Vega's einfassen. Beobachtet bei *Játiva* und *Murcia*. Nach *Graells* häufig in Castilien.

165. *C. major*, Brm. Die grosse Rohrdrossel.

Ich erlegte ein Exemplar dieses (von dem Vorhergehenden unserer Ansicht nach *spezifisch* verschiedenen) Vogels bei *Játiva*.

166. *C. arundenacea*, (*arbustorum*) Boje. Der gemeine Rohrsänger.

Beobachtet bei *Játiva* und *Murcia*; immer einzeln. Nach *Graells* häufig in Castilien; nach *Vidal* (in lit.) am *Albufera de Valencia*.

167. *C. ambigua*, nobis. Der zweifelhafte Rohrsänger.

Diagn. *Calamoherpe arundinacea minor*, colore corporis superioris inter eam et *Cal. palustrem* intercedens, rostro breviori.

Wurde von uns bei *Valencia* und *Murcia* beobachtet. (Wir halten ihn für eine besondere Art).

*) Academiae Valencianae Professori, viro doctissimo, amico humanissimo, comitique, omnes exhilaranti, haec avis hilaris dedicata est a patre filiisque *Brehm*.