

Beitrag zur Käfer-Fauna Sachsens.

Von

Friedrich Judeich und Clemens Müller.

III. Artikel.

Dytiscitae.

Halplus Latreille.

1. *elevatus* Panz. — Er. K. d. M. 183. — Redt. F. A. 84. — Bei Dresden sehr selten.
 - × 2. *lineatus* Aubé. — Er. K. d. M. 188. — Redt. F. A. 84. — Hoflössnitz bei Dresden.
 3. *fulvus* Fab. (*ferrugineus* Gyll.) — Er. K. d. M. 183. — Redt. F. A. 84. — Dresden, Leipzig, Meissner Hochland.
 4. *flavicollis* Sturm (*impressus* Fab.) — Er. K. d. M. 184. — Redt. F. A. 84. — Dresden und Leipzig häufig.
 5. *variegatus* Sturm. — Er. K. d. M. 184. — Redt. F. A. 84. — Dresden selten.
 6. *cinereus* Aubé. — Er. K. d. M. 185. — Redt. F. A. 84. — Leipzig.
 7. *ruficollis* Dej. (*impressus* Gyll. — *marginatus punctatus* Panz.) — Er. K. d. M. 186. — Redt. F. A. 84. — Dresden, Leipzig, Meissner Hochland, gemein.
 8. *fulvicollis* Er. — Er. K. d. M. 186. — Redt. F. A. 84. Bei Leipzig selten.
 9. *fluviatilis* Aubé. — Er. K. d. M. 185. — Redt. F. A. 84. — Dresden, Leipzig, häufig.
 10. *lineatocollis* Marsh. (*bistriolatus* Dft. — *trimaculatus* Drap.) — Er. K. d. M. 187. — Redt. F. A. 84. — Dresden, Leipzig, Oberlausitz.
- Cnemidotus Illiger.**
11. *caesus* Dft. (*impressus* Panz.) — Er. K. d. M. 189. — Redt. F. A. 85. — Leipzig nicht selten, Dresden.
- Pelobius Schönherr.**
12. *Hermanni* Fabr. — Er. K. d. M. 182. — Redt. F. A. 85. — Von Herrn Harzer einmal bei Dresden gefangen.
- Hyphydrus Illiger.**
13. *ferrugineus* Lin. (*ovatus* Lin. — *gibbus* Gyll.) — Er. K. d. M. 166. — Redt. F. A. 85. — Durch ganz Sachsen, häufig.
- Hydroponus Clairville.**
14. *inaequalis* Fab. (*parvulus* Fab.) — Er. K. d. M. 167. — Redt. F. A. 86. — Ueberall häufig.
 15. *reticulatus* Fab. — Er. K. d. M. 168. — Redt. F. A. 86. — Leipzig, Dresden häufig.