

schon grün ist, noch Nachtfroste, so kann man diese durch Schmauchfeuer unschädlich machen. Man besorgt bei Zeiten an mehreren Stellen des Weinbergs trocknes und grünes Reifig, Sägespäne und dergleichen, was viel Rauch verursacht, stellt einige Schüsseln, mit Wasser gefüllt, aus, und sobald dies anfängt zu frieren, werden die Feuer angezündet und bis nach Sonnenaufgang, wo es gewöhnlich am kältesten ist, unterhalten. Die Feuer müssen vor dem Winde angelegt werden, damit derselbe den Rauch durch die Weinstöcke treibt.

Von den bereits angeführten Sorten eignen sich folgende zum Anbau in Weinbergen: Nr. 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 und 23.

Verzeichniß vorzüglicher Obst-Sorten,

deren Anbau wegen ihrer Tragbarkeit und besondern Güte zu empfehlen ist.

Ich führe deren nur wenige an, im Verhältniß zu der Menge Obstsorten, die es giebt, aber die Benennungen derselben sind in den verschiedenen Ländern Deutschlands so sehr verschieden, daß man ein und dieselbe Obstart in einem andern Lande unter einem andern Namen findet, daher ich mich bloß auf Angabe solcher beschränke, die unter diesem Namen ziemlich allgemein bekannt sind. Verschreibt man neue Obstsorten aus weit entfernten Gegenden, so ist es besser, sich Pfropfreiser, als Bäumchen kommen zu lassen, letztere gedeihen oftmals nicht, indem die Veränderung der Lage und auch wohl des Klimas einen zu großen Einfluß darauf äußern und dann die Früchte den gehegten Erwartungen nicht entsprechen.

1. Äpfel für die Tafel. *)

Sommeräpfel.

Der gestreifte Zimmtapfel, hat fast die Form und Größe des Borsdorfers, hell citronengelb mit carmoisinrothen Streifen und Punkten, reif im August.

Weißer englischer Carolinapfel, Form länglich, mittelmäßig groß, blaßgelb, grünlich durchscheinend, mit wenigen schwachen Carmoisinstreifen, ein vortrefflicher Apfel, reif Anfang September.

Beilchenapfel, Form theils platt, theils länglich, mittelmäßig groß, mehrentheils dunkelroth mit blauem Dufte und gelblichen Punkten, reif Mitte August; er reift nach und nach auf dem Baume.

Rother Sommer-Rambour, Form plattrund, sehr groß, blutroth, reif im September, Dauer 6 Wochen.

Gestreifter Rosenapfel, auch Rosenstreifling. Form erhaben rund, mittelmäßig groß, schön carmoisinroth, dunkel gestreift, mit vielen Punkten,

*) Die Beschreibung der Früchte paßt nur für solche, welche der Sonne ausgesetzt sind, im Schatten sind die Farben theils matter, theils anders, auch zuweilen gar nicht gezeichnet.