

werden diese durch Agathaea, mit welcher die Blumen große Aehnlichkeit haben, besser ersetzt.

Agrimonia, Odermennig. XI. 2. Rosaceae.

A. odorata Mill. Wohlriechender Odermennig. \mathcal{L} . Italien. Blüht Juli und August, gelb. 2 bis 3' hoch. Vermehrung durch Samen oder Wurzeltheilung im Herbst oder Frühjahr. Er gedeiht im freien Lande in jeder Bodenart.

Agrostemma, Rhade. X. 5. Caryophylleae.

1) *A. Coeli rosa* L. Blattblättrige Rhade. Himmelsrösschen. \odot . Sicilien. Blüht Juli, August, schön rosenroth. 1' hoch. Eignet sich zur Einfassung.

2) *A. coronaria* L. Garten-Rhade, Sammet- oder Mexir-Nelke. \mathcal{L} . \mathcal{U} . Italien, Schweiz. Blüht Juni bis Oktober, dunkelroth oder violettroth, weiß oder weiß mit roth in der Mitte. 2 bis 3' hoch. Eine sehr schöne Varietät hiervon hat dunkelrothe, gefüllte Blumen, hält aber den Winter nicht immer im Freien aus und wird deshalb in Töpfen bei 1 bis 3^o Wärme durchwintert. Diese wird durch Stecklinge und Zertheilung der Pflanzen vermehrt.

3) *A. Flos Jovis* L. Doldentraubige Rhade, Jupiterblume. \mathcal{U} . Schweiz. Blüht Juni bis Oktober, rosenroth, 1 bis 2' hoch.

Diese Rhade-Arten gedeihen im freien Lande und nehmen mit jedem Gartenboden vorlieb. Sie werden gleich an den Ort, wo sie bleiben sollen, gesäet.

Agrostemma, andere von einigen zu dieser Gattung gezählten Arten: siehe Lychnis.

Aitonia, Aitonia. XVI. 4. Meliaceae.

A. capensis L. Kapische Aitonia, Schönblühender Nabelstrauch. \mathcal{L} . Cap. Blüht den größten Theil des Jahres. Die schön dunkelrothen oder weißen Blumen kommen einzeln aus den Blätterknospen hervor. Ein sehr schöner Strauch. Er gedeiht in sandiger Lauberde, Haide- oder Moorerde. Man begießt ihn im Winter mäßig, im Sommer reichlich. Er wird bei 5 bis 8^o Wärme durchwintert und erhält im Sommer einen der Sonne nicht zu sehr ausgesetzten Standort. Man erzieht ihn aus Samen, der in Töpfe gesäet wird, die in ein warmes Mistbeet gestellt werden und vermehrt ihn durch Stecklinge von jungem Holze im Juli, in weißem Sande unter einer Glocke. Sie wachsen schwer.

Aletris arborea und *fragrans*; s. *Dracaena*.

„ *uvaria*; s. *Tritomanthe*.

Allamanda, Allamanda. V. 1. Apocynaeae.

A. cathartica L. Purgirende Allamanda. \mathcal{L} . Guyana an Flüssen, Surinam, Cayenne am Meeresufer. Blüht Juni bis Oktober.