

sie einige Monate trocken gestanden haben, gewöhnlich im August in nahehafte Erde, die aus Dünger- und Lauberde mit etwas Sand gemischt ist, eingepflanzt und im Anfange mäßig, später mehr begossen. Die Töpfe werden im Winter an einen hellen Standort im Gewächshause oder in einem mäßig warmen Zimmer gestellt. Die Vermehrung geschieht durch Seitenzwiebeln.

1) *B. disticha* Ker. (*Gladiolus distichus* Schult.) Zweizeilige Babiane. ♀. Blüht Juni und Juli mit schönen blaßblauen Blumen auf 1' hohen Stielen.

2) *B. obtusifolia* Ker. (*Ixia villosa* Jacq., *Gladiolus latifolius* Lam.) Stumpfblättrige Babiane. ♀. Blüht im Mai mit schönen violetten Blumen.

3) *B. plicata* Ker. (*Gladiolus flagrans* Jacq.) Gefaltete Babiane. ♀. Blüht Mai und Juni, blaßblau, 1' hoch.

4) *B. purpurea* Ker. (*Ixia purpurea* Jacq., *Gladiolus purpurea* Vahl.) Purpurrothe Babiane. ♀. Blüht Mai und Juni purpurroth.

5) *B. ringens* Ker. (*Antholyza ringens* L.) Rachenförmige Babiane. ♀. Blüht Mai und Juni mit schönen purpurrothen Blumen.

6) *B. rubro-cyanea* Ker. (*Ixia* Jacq., *Gladiolus* Vahl.) Rothblaue Babiane. ♀. Blüht April bis Juni, mit herrlichen rothen, im Grunde dunkelblauen Blumen auf 1' hohen Stielen.

7) *B. sambucina* Ker. (*Gladiolus* Jacq.) Flieder-Babiane. ♀. Blüht Mai und Juni mit großen dunkelblauen Blumen.

8) *B. spathacea* Ker. (*Gladiolus* L., *Gl. paleaceus* Vahl.) Scheidentragende Babiane. ♀. Blüht Mai bis Juli mit blauen, weiß gezeichneten Blumen.

9) *B. stricta* Ker. (*Gladiolus* Ait.) Steife Babiane. ♀. Blüht Mai und Juni mit weißen, blau geaderten Blumen.

10) *B. sulphurea* Ker. (*Gladiolus* Jacq., *Gl. plicatus* Andr.) Schwefelgelbe Babiane. ♀. Blüht Mai und Juni.

11) *B. tubiflora* Ker. (*Gladiolus* Thunbg., *Gl. tubatus* Jacq., *Gl. longiflorus* Andr.) Röhrenblüthige Babiane. ♀. Blüht April und Mai mit weißen, im Grunde rothen Blumen. Es giebt hiervon Varietäten mit fleischfarbigen Blumen, mit violetter Röhre und fleischfarbigem Saume.

12) *B. villosa* Ker. (*Ixia* Ait., *I. punicea* Jacq.)zottige Babiane. ♀. Blüht im August mit carmoisinrothen oder violetten Blumen.

Balsamina, siehe Impatiens.

#### Banksia, Banksie. IV. 1. Proteaceae.

Diese Gattung, welche aus Neuholland stammt, empfiehlt sich theils durch schönes Laub, theils durch schöne Blumenähren, doch erfordern sie