

Spilanthus, Fleckblume. XIX. 3. Compositae.

S. oleraceus L. Kohlartige Fleckblume, Husarenknopf.
 ○ Ostindien. Blüht Juli und August. Die Blumen kopfförmig, langstielig, einzeln stehend; die Blümchen entwickeln sich von unten nach oben, sind erst roth und dann gelb; das Köpchen ist deshalb unten gelb, oben dunkelroth.

Der Samen wird im April ins Mistbeet gesät und die Pflanzen im Mai ins freie Land versetzt.

Spiraea, Spierstaude. XII. 4. Rosaceae.

1) *S. Aruncus* L. Geisbart-Spierstaude. ♀. Deutschland, Schweiz, Oestreich u. s. w., an Bergen. Blüht Juni und Juli. Der Stengel 2—3' hoch. Die Blätter groß, vielfach zusammengesetzt. Die Blumen schön, weiß, in großen winkel- und gipfelständigen Rispen. Eine Varietät trägt gefüllte Blumen.

2) *S. Bella* Sims. Schöne Spierstaude. ♀. Nepal. Blüht Mai bis September. Die Blätter eirund, spiz, gesägt. Die Blumen sehr schön, roth, in zusammengesetzten Enddoldentrauben. Eine Varietät trägt weißliche Blumen.

3) *S. erenata* L. Gekerbte Spierstaude. ♀. Sibirien, Ungarn. Blüht Mai und Juni. Der Stengel 3—5' hoch. Die Blätter verkehrt eirund, spiz, 3rippig, glatt. Die Blumen weiß, in dichten Doldentrauben.

4) *S. digitata* W. (*S. palmata* Pall.) Fingerblättrige Spierstaude. ♀. Sibirien, auf Alpen. Blüht im Mai. Die Blätter ungleich gesiedert, unten filzig; die Blättchen 5lappig, das Endblättchen größer, 7lappig. Die Blumen schön, weiß, in gedrängten Doldentrauben.

5) *S. filipendula* L. Knollige Spierstaude. ♀. Europa, auf bergigen Triften. Blüht Juni und Juli. Die Wurzel hat hängende Knollen. Die Wurzelblätter unterbrochen gesiedert. Der Stengel 1—2' hoch, mit einer reichen Enddoldentraube weißer Blumen, welche als Knospen roth sind. Eine sehr schöne, gefüllte Varietät cultivirt man in Gärten und sie ist eine Zierde der Blumenbeete.

6) *S. hypericifolia* L. Johanniskrautblättrige Spierstaude. ♀. Canada. Blüht Mai und Juni. Ein bekannter, schöner, 3—5' hoher Strauch mit braunen, ruthenförmig gebogenen Zweigen. Die Blätter klein, verkehrt eirund, glatt. Die zahlreichen, weißen Blumenbüschel erscheinen auf den Zweigen ihrer ganzen Länge nach und bilden natürliche Guirlanden.

7) *S. lobata* Jacq. (*S. palmata* L.) Gelappte Spierstaude, rothblühender Geisbart. ♀. Nord-Amerika. Blüht im Juni. Hat viel Aehnlichkeit mit *S. Ulmaria*. Die Blätter gelappt. Die Blumen sehr schön, roth, in dichtästigen Enddoldentrauben. Es ist eine der schönsten Arten.