

8) *S. opulifolia* L. Schneeballblättrige Spierstaude. *h.* Canada, Virginien. Blüht Juni und Juli. Ein 6—10' hoher, ästiger, sehr buschiger Strauch. Die Blätter gestielt, klappig, gesägt. Die Blumen weiß, vor dem Aufblühen blaßroth, zahlreich, in fast kugelrunden Doldentrauben.

Es giebt davon eine niedrige Zwerg-Varietät und eine andere mit goldgelben Blättern.

9) *S. salicifolia* L. Weidenblättrige Spierstaude, Theestrauch. *h.* Sibirien, Tartarei. Blüht Juni und Juli. Diese Art ist allgemein bekannt. Die Blumen blaßroth, in zusammengesetzten, länglichen Endtrauben. Es giebt davon folgende Varietäten:

*S. sal. alba*, mit weißen Blumen; *minor*, mit kleinen, weißen Blumen; *alpestris*, mit fleischrothen Blumen in sehr kurzen Endtrauben; *carpinifolia (latifolia)*, mit weißen Blumen in rispenförmigen Endtrauben; *paniculata*, mit weißen Blumen in rispenförmigen Endtrauben, unterscheidet sich von voriger durch die lanzettförmigen Blätter; *sol. varieg.*, mit bunten Blättern; *fl. roseo*, mit rosenrothen Blumen; *ruber vividus*, mit lebhaft rothen Blumen; *undulata*, mit wellenförmigen Blättern.

10) *S. sorbifolia* L. Ebereschblättrige Spierstaude. *h.* Westliches Sibirien. Blüht im Sommer. Der Stengel 2—4' hoch. Die Blätter ungepaart gefiedert. Die Blumen schön, gelblichweiß, in dichten Endrispen.

11) *S. tomentosa* L. Filzige Spierstaude. *h.* Nordamerika. Blüht im Sommer. Der Stengel 3—4' hoch. Die Blätter ei-lanzettförmig, ungleich gesägt, unten weißgrau- oder rostfarben-filzig. Die Blumen schön, rosenroth, in dichten, länglich zusammengesetzten Endtrauben.

12) *S. trifoliata* L. Dreiblättrige Spierstaude. *h.* Canada, Virginien. Blüht im Sommer. Der Stengel 2—3' hoch. Die Zweige röthlich. Die Blätter 3zählig. Die Blumen schön, groß, weiß, weitläufig rispenständig, mit langen, spitzen Kronblättern.

13) *S. triloba* L. Dreilappige Spierstaude. *h.* Sibirien, auf den Altai-Alpen. Blüht im Sommer. Die Blätter rundlich, klappig. Die Blumen weiß, zahlreich, in gestielten Enddolden.

14) *S. Ulmaria* L. Sumpfliebende Spierstaude, Johanniswedel. *h.* Deutschland, an Gräben, in Gebüsch und andern feuchten Orten. Blüht Juni und Juli. Der Stengel 2—4' hoch. Die Blätter unterbrochen gefiedert, unten weißgrau-filzig. Die Blumen weiß, in großen, sprossenden Enddoldentrauben. Es giebt davon sehr schöne Varietäten, welche in Gärten cultivirt werden, mit goldbunten und silberbunten Blättern und mit gefüllten Blumen.

15) *S. ulmifolia* Scop. (*S. chamaedrifolia* Jacq., *S. betulifolia* Pall.) Ulmenblättrige Spierstaude. *h.* Kärnthen, Sibirien. Blüht Juni und Juli. Der Stengel 3—5' hoch. Die Blätter ei-lanzettförmig, doppelt gesägt. Die Blumen weiß, zahlreich, in gestielten Doldentrauben.