

Trillium, Dreiblatt. VI. 3. Smilacineae.

T. grandiflorum *Salisb.* (*T. erithrocarpum* *Bot. Mag.*, *T. pictum* *Pursh.*) Großblumiges Dreiblatt. *U.* Carolina. Blüht April und Juni. Die Blätter 3fach am Ende des Stengels stehend. Die Blumen gestielt, sehr groß; die Kronblätter weiß, roth gezeichnet, länger als der Kelch.

Man pflanzt diese Art an einem etwas schattigen, geschützten Orte im Freien in eine Mischung von halb Torf-, halb Haideerde und bedeckt sie sorgfältig gegen den Frost oder durchwintert sie am frostfreien Orte. Die Vermehrung geschieht durch Samen und Wurzeltheilung. Andere Arten mit zierlichen Blumen, als: *T. erectum*, *cernuum*, *pendulum* und *sessile* sind weniger zärtlich, aber auch weniger zu empfehlen als erstere. Diese lieben fetten Boden und eine Bedeckung gegen eindringenden Frost.

Tritomanthe, Tritomanthe. VI. 1. Asphodoleae.

1) *T. media* *Lk.* (*Tritoma media* *Ker.*, *Veltheimia sarmentosa* *Andr.*) Mittlere Tritomanthe. *U.* Cap. Blüht im Herbst. Die Wurzel kriechend und sprossend. Die Blätter linien-lanzettförmig, schmal, rinnenförmig, schlaff, 1—2' lang. Der Schaft trägt an der Spitze eine schöne, dichte Aehre herabhängender Blumen, welche am Grunde schön roth, an der Spitze gelb sind.

2) *T. speciosa* *Bosse.* (*Veltheimia spec.* *Roth.*) Ansehnliche Tritomanthe. *U.* Cap. Blüht August bis Oktober. Aehnelt der folgenden Art, ist aber durch längere, am Rande und auf dem Riele fein gezähnelte, 4—5' lange Blätter, durch den höheren, grünen Schaft, durch eine größere, sehr dichte Aehre und durch zahlreiche, dicht dachziegelförmig gelagerte Blumen (welche indessen gleiche Farbe haben) verschieden.

3) *T. Uvaria* *Lk.* (*Tritomia Uvaria* *Ker.*, *Veltheimia Uvaria* *Gled.*, *Aletris Uvaria* *L.*) Traubenblüthige Tritomanthe. *U.* Cap. Blüht August und September. Die Blätter schmal, schwertförmig, rinnenförmig, glatt, 2—3' und länger. Der Schaft länger als die Blätter, mit einer dichten Traube sehr schöner, zahlreicher, herabhängender, erst scharlachrother, dann gelber Blumen.

Diese schönen Zierpflanzen überwintert man bei 3—5° W. und stellt sie im Sommer an einen schattigen Ort ins Freie. Man pflanzt sie in fette, sandige Mistbeeterde auf einer Scherbenunterlage, oder im Beete eines Winterhauses und vermehrt sie durch Sproßlinge. Ist zur Blüthezeit die Witterung kalt, so stellt man sie ins Zimmer oder Glashaus nahe an die Fenster, wo die Blumen zur bessern Vollkommenheit gelangen.

Tritonia, siehe *Ixia*.

Trollius, Trollblume, Klobblume, Dotterblume.

XIII. 6. Ranunculaceae.

1) *T. asiaticus* *L.* Asiatische Trollblume. *U.* Sibirien. Blüht Mai und Juni. Die Wurzelblätter 5theilig, langgestielt, die Thelle