

3) *V. Opulus L.* Gemeiner Schneeball, Wasserholder, Wasserflieder, Drosselbeere. *h.* Deutschland, in Gebüsch und Waldungen, an feuchten Orten. Blüht Mai und Juni. Ist ein sehr bekannter, wild wachsender, 10—15' hoher Strauch mit weißen Blumen, in großen, gestrahlten Asterdolden, welche schöne gelbe und rothe Beeren liefern, die ihm im Herbst ein schönes Ansehen geben. Eine sehr schöne Varietät ist der bekannte gefüllte Schneeball, *V. opulus roseum*, welcher jedem Garten zur Zierde gereicht. Von diesem giebt es eine Abart mit bunten Blättern.

4) *V. edule Pursh.* Eßbarer Schneeball. *h.* Nordamerika. Blüht Mai und Juni. Ist dem vorhergehenden in Blättern und Blumen ganz ähnlich und unterscheidet sich bloß durch seine glänzend grünen, viel zahlreicher und spitzer gesägten Blätter und durch die runden, jungen Zweige, welche bei jenem eckig sind. Die Früchte sind in Deutschland noch nicht zur Reife gekommen.

Es giebt noch mehrere Arten dieser Gattung, welche dazu dienen, um die Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit in den Strauchparthieen zu erhöhen. Vorstehende dienen zur Verschönerung der Strauchgruppen, dauern im Freien, nur No. 1 bedarf eines geschützten Standortes. Sie kommen in jedem nicht zu nassen Boden fort und werden durch Samen oder Ableger vermehrt.

5) *V. Tinus L.* Lorbeerartiger Schneeball, Laurus-Tinus, immergrüner Schlingbaum. *h.* Portugal, Spanien, Italien. Blüht April und Mai. Ist ein sehr bekannter, immergrüner Strauch mit glänzend dunkelgrünen Blättern und schönen, weißen Blumen in End-Asterdolden. Es giebt einige Varietäten hiervon, von denen eine mit gelbbunten Blättern die schönste ist.

Man pflanzt ihn in fette Mistbeeterde, durchwintert ihn bei 1—3° W. und vermehrt ihn durch Stecklinge, Ableger oder Samen. Er gedeihet recht gut in Zimmern.

Vicia, Wicke. XVII. 6. Leguminosae.

V. faba, fl. atropurpureo L. O. Puffbohne, Saubohne mit dunkelrothen Blumen. Blüht Juli und August. Diese Varietät von der gewöhnlichen Puffbohne kann wegen ihrer schönen, rothen Blumen schon einen Platz unter den Zierpflanzen einnehmen.

Man steckt die Bohnen im März oder April an bestimmter Stelle ins freie Land.

Vieusseuxia, siehe *Iris pavonia*.

Viminaria, Binsenstrauch. X. 1. Leguminosae.

V. denudata Smith. (*Daviesia denud. Vent.*, *Sophora juncea Schrad.*) Neuholländischer Binsenstrauch. *h.* Neuholland. Blüht im Frühling. Ist ein kleiner, schlanker, wenigästiger, 3—4' hoher Strauch. Die Blätter sind einfache, binsenförmige, stachel-