

unpaar-gefiederte Blätter. Er gedeiht in Haideerde mit etwas Lehm und Sand vermengt. In den Töpfen macht man eine Unterlage von Torfbrocken. Man begießt ihn erst, wenn der Wurzelballen ausgetrocknet ist. Er wird bei 3—6° W. überwintert und im Juni verpflanzt. Vermehrung wie No. 1. Stecklinge wachsen sehr schwer.

3) *V. lutea Michx.* Gelbe Virgilie. *h.* Nord-Amerika. Blüht Juni und Juli, mit gelben Blumen. Cultur wie No. 1.

Virgilia L'Heritier, siehe *Gailardia*.

Viscaria, siehe *Lychnis*.

Vitex, Keuschheitsbaum. XIV. 2. Viticeae.

1) *V. Agnus castus L.* (*V. latifolius Mill.*) Rechter Keuschheitsbaum. *h.* Sicilien, Neapel, an sumpfigen und feuchten Orten. Blüht Juli und August. Der Stamm 5—10' hoch, ästig. Die Blätter entgegengesetzt, 5—7zählig, gefingert. Die weißen, inwendig blaß-röthlichen Blumen stehen quirlförmig in fast rispenförmigen Endähren. Der Samen hat einen gewürzhaften Geruch und wird in den Apotheken gebraucht. Variirt mit weißen Blumen, mit breitem, schmälern und bunten Blättern.

2) *V. incisa Lam.* Schligblättriger Keuschheitsbaum. *h.* China. Blüht im Sommer. Aehnelt der ersten Art, ist aber in allen Theilen kleiner und durch halbgefiederte, langgespitzte, unten filzige Blättchen von ersterem unterschieden.

Beide dauern an geschützten Standorten im Freien, No. 1 bedeckt man bloß bei strenger Kälte, No. 2 ist zärtlicher und muß sorgfältiger bei eintretendem Froste bekleidet und bedeckt werden. Die Vermehrung geschieht durch Stecklinge, Sprößlinge und Samen.

Volkameria, siehe *Clerodendron*.

W.

Wachendorfia, Wachendorfie. III. 1. Xiphidieae.

Die Arten dieser Gattung sind zierliche Glashauspflanzen für große Sammlungen.

Wahlenbergia grandifl., siehe *Campanula grandifl.*

Watsonia, Watsonie. III. 1. Irideae.

1) *W. aletroides Ait.*, (*W. Jacquinii Pers.*, *Antholyza Merionella Curt.*, *A. aletroides Burm.*, *Gladiolus aletr. Vahl.*, *Gl. tubulosus Jacq.*) Runzelblumenartige Watsonie. *h.* Cap. Blüht Mai und Juni. Die Wurzelblätter 3seitig, gestreift, am Rande verdickt, 1½' lang, 1" breit. Der gegen 2' hohe Schaft trägt eine vielblumige, 6—8" lange Endähre sehr schöner, dunkelscharlachrother Blumen, welche 1½" lang und gekrümmt sind. Variirt mit rothen Blumen.

2) *W. iridifolia Ait.* (*Antholyza fulgens Andr.*, *Gladiolus irid. Jacq.*) Schwertelblättrige Watsonie. *h.* Cap. Blüht