

## PROBLEMA PRIMVM.

*Medium sive æqualem motum longitudinis Lunæ à Sole (hoc est, motum puncti C in H, &c.) ad quodvis datum tempus colligere. Cop. lib. 4. c. 4.*

Motus longitudinis Lunæ, ut & reliquorum 5 planetarum, primum deducitur à Sole. Deinde collatione facta cum motu Solis, facilè ejus locus, vel à prima stella Arietis, vel ab æquinoctio verno reperitur.

Est autem periodus cursus Lunæ à Sole dierum 29 scrupulorum 31. 50". 7". 52". 57".

Unde conficitur

Motus eius annuus 1°. 14'. 9". 37'. 22". 36". 25".

Motus diurnus . . . . . 12. 11. 26. 41. 31.

Motus horarius . . . . . 30. 28. 36. 44.

Et fuit tempore N. C. motus Lunæ à Sole 3°. 29'. 58".

Ex quibus ita sumtis, æqualem motum Lunæ ad tempus supra datum colligo hoc modo.

I I. Sex. an. Sex. anni.

1.-----1°. 14". 9'. 37". 22'. 36". 25".---26. 40.

24. 43. 12. 27. 32. 8. 20. 20. 20.

6. 10. 48. 6. 53. 2. 5. 5. 20.

49. 26. 24. 55. 4. 16. 1.

---

36. 42. 51. 6.

Pp 3

II. Sex.