





# B e r i c h t

über das

## Krankenhaus der Diakonissen-Anstalt

zu Dresden

auf das Jahr 1898.

### Inhalt.

- I. Bericht der Krankenhaus-Verwaltung.
- II. Bericht über die medizinische Abteilung von Dr. Schmalz.
- III. Bericht über die chirurgische Abteilung von Dr. Rupprecht.
- IV. Bericht über die chirurgische Poliklinik von Dr. Müller.
- V. Operationsbericht.
- VI. Bericht über die gynäkologische Abteilung von Dr. Münchmeyer.
- VII. Bericht über die Augenabteilung von Dr. Heymann.
- VIII. Bericht über die Poliklinik für Frauenkrankheiten von Dr. Münchmeyer.
- IX. Bericht über die allgem. Poliklinik.
- X. und XI. Aufnahmebedingungen für das Krankenhaus und das Siechenhaus Bethesda in Niederlöbnitz.

Der allgemeine Bericht über die Diakonissen-Anstalt und ihre Filiale ist von der Kanzlei zu beziehen.

Dresden.

Rammingsche Buchdruckerei,  
Schlegel-Gasse 4.



1899 \* 1846 D

## Ärzte am Krankenhaus der Diakonissen-Anstalt.

### Oberärzte:

- Hofrat Dr. Paul Rupprecht. Weintraubenstraße 13, I.  
(Stellvertreter Dr. Fr. Hänel. Bauzner Straße 11, I.)
- Medizinalrat Dr. Richard Schmalk. Feldgasse 14.  
(Stellvertreter Dr. Budj. Prager Straße 29.)
- Oberstabsarzt Dr. Johannes Heymann. Bauzner Straße 3, part.  
(Stellvertreter Dr. Enzmann. Marschallstraße 13, I.)
- Dr. Friedrich Mündmeyer. Christianstraße 31.  
(Stellvertreter Dr. Korn. Weiße Gasse 1.)
- Dr. Rudolf Pause. Holzhofgasse 3 (seit 10. März 1899).

### Hilfsärzte:

- Dr. Müller, 1. Hilfsarzt der chirurgischen Abteilung.  
Oberarzt im 2. Rgl. Sächs Grenadierregiment Nr. 101 Kaiser Wilhelm,  
König von Preußen, Dr. Reinhard. 2. Hilfsarzt der  
chirurgischen Abteilung.
- Dr. Römer, 1. Hilfsarzt der medizinischen und zugleich der gynäkolo-  
gischen und oculistischen Abteilung.
- Dr. Henrici, 2. Hilfsarzt der medizinischen Abteilung.

### Krankenhaus-Verwaltung.

- P. Dr. Molwik, Rektor der Diakonissen-Anstalt.  
Diakonissin Julie Gräfin Vikthum von Eckstädt, Oberin der  
Diakonissen-Anstalt.

### Oberschwester des Krankenhauses.

- Diakonissin Caroline Lüttke.

## I. Bericht der Krankenhaus-Verwaltung.

Am 1. Mai verließ der Oberarzt der Abteilung für Frauenkrankheiten an unserem Krankenhause, Hofrat Dr. Osterloh, seine Stellung, um den an ihn ergangenen Ruf zur Übernahme der neuerrichteten Abteilung für Frauenkrankheiten am Stadtkrankenhause zu Dresden als Oberarzt zu übernehmen. Unter ihm hat sich die genannte Abteilung an unserm Krankenhause gebildet und von kleinen Anfängen immer mehr erweitert und ausgedehnt. Nachdem er schon vor dem Jahre 1890 in freundlicher Weise in Fällen, die die Heranziehung eines Frauenarztes nötig machten, in unserm Krankenhause thätig gewesen war, ernannte ihn der Vorstand der Diakonissen-Anstalt in jenem Jahre zum Oberarzt. Im Jahre 1893 erfolgte dann unter seinem Beirat die Einrichtung der Abteilung für Frauenkrankheiten und des zu ihr gehörigen Operationszimmers im neuen Krankenhause. Wir sprechen Herrn Hofrat Dr. Osterloh auch an dieser Stelle unsern herzlichsten Dank für die Freudigkeit, Hingebung und Treue aus, mit der er seine immer wachsende Arbeit gethan, und für die freundliche Teilnahme, die er den Bestrebungen der Diakonissen-Anstalt allezeit erwiesen hat. An seiner Stelle wählte der Vorstand der Diakonissen-Anstalt Dr. med. Münchmeyer\*) zum Oberarzt der Abteilung für Frauenkrankheiten

\*) Dr. Friedrich Adelbert Münchmeyer wurde am 5. Oktober 1860 zu Valparaiso, Republik Chile, als Sohn des Kaufmanns Robert Münchmeyer geboren. Seine Gymnasialbildung erhielt er auf dem kgl. Gymnasium in Essen a. d. Ruhr. Nach Beendigung derselben widmete er sich dem Studium der Medizin auf den Universitäten Freiburg, Leipzig, Straßburg, Würzburg. Im Jahre 1883 promovierte er in Würzburg zum Doktor der Medizin. Dort absolvierte er auch die Staatsprüfung im Jahre 1885. Bis März 1886 war er 2. Assistent am pathologischen Institut der Universität Würzburg, darauf 2 Jahre hindurch Assistent der kgl. chirurgischen Klinik in Breslau, vom 1. April 1888 an externer Hilfsarzt und vom 14. Mai 1888 an 1. Assistenzarzt der kgl. Frauenklinik in Dresden. Im Jahre 1890 verließ er diese Stellung, um sich in Dresden als Spezialarzt für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe niederzulassen. Unserer Anstalt war Dr. Münchmeyer dadurch nahe getreten, daß er die Stellvertretung für Hofrat Dr. Osterloh übernommen hatte.

an unserem Krankenhause. Am 2. Mai wurde derselbe in Gegenwart der Ärzte, der vorstehenden Schwester des Krankenhauses, derjenigen der gynäkologischen Station und der Direktion der Diakonissen-Anstalt durch den Vorsitzenden des Vorstandes, Kammerherrn v. d. Decken, in sein Amt eingeführt. Möge der Segen Gottes seine Arbeit begleiten, wie er auf der seines Vorgängers geruht hat.

Dem Oberarzt der medizinischen Abteilung unsers Krankenhauses, Hofrat Dr. R. Schmalz, ist von Sr. Maj. dem König unter gleichzeitiger Berufung in das Landes-Medizinalkollegium der Titel eines Medizinalrats verliehen worden.

Die im vorigen Jahresbericht genannten 4 Hilfsärzte haben im Laufe des Jahres sämtlich ihre Stellung in unserm Krankenhause zum Teil nach längerer und in allen Fällen nach treuer und gewissenhafter Arbeit verlassen, sodaß auf allen 4 Stellen eine Neubesezung stattfinden mußte. Am 1. April schied Dr. Weber. Er erhielt in Dr. P. Müller einen Nachfolger. Am 1. Oktober verließ uns Dr. Freitag, nachdem er von der chirurgischen Abteilung noch für kurze Zeit zur medizinischen Station übergegangen war. An seine Stelle trat Dr. Römer. Am 31. Dezember ging Dr. Rüdiger ab, dessen Stelle von Dr. Henrici übernommen wurde. Da auch Dr. Raumann am 1. Oktober unser Krankenhaus verließ, so mußte auch die zweite Hilfsarztstelle der chirurgischen Abteilung neu besetzt werden. Zu ihrer Übernahme wurde vom königlichen Kriegsministerium Dr. Reinhard, Oberarzt im 2. Rgl. Sächs. Grenadierregiment Nr. 101 Kaiser Wilhelm, König von Preußen, kommandiert. Es geschah das nach einem mit der Rgl. Sanitätsdirektion der Armee getroffenen Abkommen, nach welchem von jetzt an die eine Hilfsarztstelle auf unserer chirurgischen Abteilung einem Militärarzt übertragen werden soll, welchen das Rgl. Kriegsministerium unserm Krankenhause für die genannte Abteilung überweist.

Die Arbeit der beiden Hilfsärzte der medizinischen Abteilung ist in der Weise eingeteilt worden, daß der erste Hilfsarzt den größeren Teil der medizinischen Abteilung, der zweite die medizinische Kinderabteilung im Hauptgebäude und die gynäkologische und ophthalmologische Station unter den betreffenden Oberärzten zu versorgen hat.

Die auf der Männerstation nötigen Hilfeleistungen durch männliche Pfleger liegen in den Händen von Diakonen der Gorbizer Anstalt.

Im Jahre 1898 haben im ganzen 8 Johanniterschwestern in unserem Krankenhause gelernt, 5 haben ihren halbjährigen Kursus beendet, 3 stehen noch in der Lernzeit. Eine Pflegerin der städtischen Arbeitsanstalt erlernte während des Sommers in unserm Krankenhause die Krankenpflege. Nach ihrem Abgang wurden wir um Ausbildung einer zweiten Pflegerin gebeten, die gegenwärtig noch in unserm Krankenhause verweilt. Wir haben diese beiden Pflegerinnen auf Grund einer früher gegebenen Zusage

zur Ausbildung zugelassen. Im übrigen müssen wir uns auf die Ausbildung der Johanniterschwestern beschränken.

Die heilige Taufe empfingen 2 Kinder, das heilige Abendmahl wurde in 44 Kommunionen an 303 Kranke ausgeteilt.

Die Zahl unserer Freibetten hat sich im Jahre 1898 zu unserer Freude dadurch um eins vermehrt, daß Frau Luise verm. Finanzvermessungsdirektor Preßler geb. Dittrich, die am 5. Juli 1898 in Dresden verstorben ist, in ihrem Testament der Diakonissen-Anstalt in Dresden die Summe von 12 000 Mark mit der Bestimmung vermacht hat, daß davon im Krankenhause der Diakonissen-Anstalt ein Freibett unter dem Namen: „Luise Preßlerbett“ unterhalten werde. Das bisher zu den Freibetten Bethesdas gehörige „Eliae Himmelbett“ ist nach dem Wunsche des Stifters unter die zum Krankenhause der Diakonissen-Anstalt gehörigen Freibetten aufgenommen, bezw. auf das Krankenhaus übertragen worden.

Vom 1. Januar bis 31. Dezember 1898 sind 1513 Kranke,

nämlich: 524 medizinische,  
602 chirurgische,  
173 gynäkologische,  
214 ophthalmische,

mit 41 877 Pflage-  
tagen, nämlich: 14 765 medizinische,  
18 171 chirurgische,  
3 208 gynäkologische,  
5 733 ophthalmische

verpflegt worden.

Nach Geschlecht und Alter teilen sich diese Kranken ein in 493 Männer, 639 Frauen und 381 Kinder. Der Heimatsangehörigkeit nach kommen auf die Kreishauptmannschaft Dresden 1328 (darunter 536 auf die Stadt Dresden, Zwickau 57, Leipzig 45, Bautzen 47, auf nichtsächsische Länder 36. Nach den Konfessionen teilen sich die Kranken ein in 1379 Evangelisch-Lutherische resp. Evangelisch-Unierte, 4 Reformierte, 126 Römisch-Katholische, 1 Griechisch-Katholischer, 1 Baptist und 2 jüdischer Religion. Gestorben sind 145 Kranke: 47 Männer, 57 Frauen und 41 Kinder. Der Krankenbestand am 31. Dezember war 109 Kranke.

Auf den Freibetten des Krankenhauses sind vom 1. Januar bis 31. Dezember verpflegt worden 238 Kranke mit 4059 Pflage-  
tagen; auf den Staatsfreibetten 123 Kranke mit 4364 Pflage-  
tagen, zu deren Verpflegung von den Gemeinden pro Tag 50 Pf. zugeschoffen werden; auf den Freistellen des alterbländischen Meißner Kreises 18 Kranke mit 708 Pflage-  
tagen. Auf Kosten des Armenamtes in Dresden wurden 32 Kranke mit 1157 Tagen, auf Kosten des Augenkrankenheilvereins 91 Kranke mit 2998 Tagen verpflegt. Auf Kosten des Mutterhauses erhielten Verpflegung 52 Schwestern

und 4 Dienstmädchen in 1224 Tagen. Die übrigen Kranken wurden auf ihre eigene Rechnung, auf Kosten von Krankenkassen oder Privatpersonen verpflegt. Von Privatzimmern machten 219 Personen mit 4734 Pflagetagen Gebrauch; und zwar

Privatfranke I. Klasse:

auf der medizinischen Station	18 Herren	mit 214 Pflagetagen,
" " " " " " " "	7 Damen	" 157 "
" " chirurgischen	44 Herren	" 854 "
" " " " " " " "	16 Damen	" 457 "
" " " " " " " "	12 Kinder	" 100 "
" " gynäkologischen	22 Damen	" 343 "
" " okulistischen	2 Herren	" 11 "

Privatfranke II. Klasse:

auf der medizinischen Station	2 Herren	mit 58 Pflagetagen,
" " " " " " " "	5 Damen	" 82 "
" " chirurgischen	30 Herren	" 631 "
" " " " " " " "	26 Damen	" 1312 "
" " " " " " " "	7 Kinder	" 85 "
" " gynäkologischen	23 Damen	" 370 "
" " okulistischen	2 Herren	" 21 "
" " " " " " " "	3 Damen	" 39 "

Summa: 219 Kranke mit 4734 Pflagetagen.

In der chirurgischen Poliklinik sind 2034 Kranke, in der Poliklinik für Augenranke 430 und in der inneren Poliklinik 546 Kranke behandelt worden.

Gynäkologische Poliklinik: 520 Frauen.

Erste Hilfe wurde 267 Verletzten geleistet.

### Tabellarische Übersicht

der auf Freistellen und auf Kosten von Vereinen und Behörden verpflegten Kranken 1898.

	Sa.	Männer	Frauen	Kinder	Tage
Auf den 12 Staatsfreistellen . . . . .	123	12	62	49	4364
Auf den 3 Meißner Freibetten . . . . .	18	5	6	7	708
Messerschmidt'sches Freibett . . . . .	15	5	10	—	87
Hoyer'sches Freibett . . . . .	8	2	6	—	70
Mieth'sches Freibett . . . . .	7	1	6	—	87
Luisen-Bett . . . . .	12	2	10	—	225
Eduard-Stiftung . . . . .	9	3	6	—	157
Emma-Stiftung . . . . .	5	—	5	—	71
v. Reichmeisters Freibett . . . . .	6	2	4	—	105
Seite:	203	32	115	56	5874



	Sa.	Männer	Frauen	Kinder	Tage
Übertrag	203	32	115	56	5874
Graner-Stiftung . . . . .	10	3	7	—	195
Kaiser-Wilhelm-Jubiläums-Freib. v. Seydlitz'sches Freibett . . . . .	4	—	1	3	88
v. Kommerstädt'sches Freibett . . . . .	15	7	8	—	236
Stübel-Bett . . . . .	10	5	5	—	271
Stübel-Bett . . . . .	8	3	5	—	262
Gräfl. v. Königsfels'sche Stiftung	16	3	12	—	392
Eliä Himmelbett . . . . .	4	2	2	—	103
v. Brandt'sches Freibett . . . . .	24	2	9	13	203
Johanna-Stiftung . . . . .	16	—	—	16	210
Carolinen-Stiftung . . . . .	10	—	—	10	190
Johannes-Bett . . . . .	8	—	—	8	116
August-Stiftung . . . . .	19	—	—	19	203
v. Gerßdorf'sches Freibett . . . . .	5	—	—	5	110
Lazarus-Bett . . . . .	4	—	—	4	111
10. November-Freibett . . . . .	5	—	—	5	95
Freibett zum guten Hirten . . . . .	7	—	—	7	117
Pia-Stiftung . . . . .	7	—	—	7	210
Goldnes Jubiläums-Freibett . . . . .	4	—	—	4	135
Summa:	379	57	164	157	9121*)
Auf Kosten des Armenamtes zu Dresden . . . . .	32	2	10	20	1157
Auf Kosten des Augenfranken= heilvereins . . . . .	91	9	34	48	2998
Auf Kosten des Mutterhauses (Schwestern)**) . . . . .	56	—	56	—	1224
Summa:	179	11	100	68	5379

\*, Außer diesen Pflagetagen erhielten 5 Männer, 18 Frauen und 36 Kinder Beihilfen zu den Pflegegeldern.

\*\*\*) 4 Dienstmädchen, 52 Schwestern.

~~~~~

## II. Medizinische Abteilung.

Von Medizinalrat Dr. Schmalz.

Auf der medizinischen Abteilung des Krankenhauses befanden sich am 1. Januar 1898 41 Kranke, 559 Kranke wurden im Laufe des Jahres neu aufgenommen, und in der neuen medizinischen Poliklinik wurden 546 Personen behandelt, sodaß im ganzen über 1146 Erkrankungsfälle zu berichten ist.

Der Rückgang in der Zahl der in das Krankenhaus aufgenommenen Patienten ist wesentlich dadurch bedingt, daß im Berichtsjahre nur 116 Diphtheriekranken Aufnahme fanden, 90 weniger als im Vorjahre.

Es möge uns gestattet sein, nachdem nun vier Jahre seit der Einführung des Behring'schen Heilserums verflossen sind, über die unter seiner Anwendung beobachteten Heilerfolge in Kürze zu berichten.

In der Zeit vom 1. Januar 1895 bis 31. December 1898 wurden im ganzen 699 Fälle von Diphtherie bis zu Ende beobachtet. Von diesen Kranken starben 112 = 16,02 %, während in den Jahren 1891 bis 1894 von 660 Kranken 270 = 40,91 % gestorben waren.

Von den 699 Kranken zeigten 331 deutliche Erscheinungen von croupöser Kehlkopfstenose, bei 133 gingen die Stenose-Beschwerden nach der Injektion des Serums und unter der Anwendung von Wasserdampf zurück, also 40,18 % aller Stenosen heilten ohne Tracheotomie, gewiß ein günstiges Verhältnis.

Bei 218 Kranken wurde die Tracheotomie ausgeführt; hiervon starben 71 = 32,57 %, während in den Jahren 1891 bis 1894 von 384 Tracheotomierten 218 = 55,77 % gestorben waren.

Das Heilserum wurde in den letzten Jahren nur in der Dosis von 1500 Immunisierungseinheiten auf einmal angewendet, und in vielen Fällen wurde diese Dosis wiederholt injiziert. Dennoch ist niemals eine wirklich schwere Schädigung als Folge dieser Behandlung beobachtet worden. Ziemlich häufig kamen Serum-Erytheme vor, die sich, wie schon früher erwähnt wurde, durch ihren polymorphen Charakter auszeichneten, bald als scharlachartiges, bald als Maserneranthem, bald unter dem Bilde fleckiger Erytheme oder der Urticaria auftraten; oft veränderten sie in demselben Falle während einer etwa 2—5 tägigen Dauer wiederholt ihr Aussehen.

Viel seltener wurden, neben den Exanthemen oder ohne diese, Gelenkschwellungen und Hautödeme beobachtet.

Die subjektiven Beschwerden der befallenen Kranken (fast ausschließlich Kinder) waren in allen diesen Fällen unbedeutend und gingen rasch vorüber.

Relativ hoch ist die Zahl der im vergangenen Jahr aufgenommenen Fälle von Unterleibstypbus, und zwar wurde uns die Mehrzahl davon aus den Orten Lockwitz, Kreischa und Lungwitz zugeführt.

Wie in anderen Krankenhäusern, war auch bei uns zu bemerken, daß in letzter Zeit der Typhus auffallend häufig unter Recidivbildung verlief. Von 50, seit dem 1. Januar 1895 beobachteten Fällen, kamen bei 16 Recidive, bei 3 sogenannte Nachschübe (Recrudescenzen) und bei 2 sogar 2 Recidive vor.

5 von den 50 Typhuskranken starben.

11 Fälle betrafen Kinder unter 15 Jahren, und zwar waren dies theilweise Erkrankungen der allerschwersten Art.

Unter den beobachteten Komplikationen des Typhus ist ein Fall besonders hervorzuheben, in dem die Erkrankung während der ganzen Fieberperiode mit intensiver Gelbsucht und einer sehr starken Vergrößerung der abnorm harten Leber einherging. Gelbsucht und Leberschwellung verloren sich gleichzeitig mit dem Abfall der Temperatur. Obgleich in diesem Falle schon vor der Aufnahme in die Anstalt durch den kgl. Bezirksarzt, Herrn Medizinalrat Dr. Hesse, die Vidal'sche Probe mit positivem Resultat angestellt worden war, nahmen wir, wegen der großen Seltenheit der Gelbsucht als Begleiterscheinung des Typhus, im Anfang doch Anstand, diese Krankheit zu diagnostizieren; der weitere Verlauf hat aber unsere Zweifel mit Sicherheit beseitigt.

In 2 Fällen, bei weiblichen Kranken von 23 und 42 Jahren, wurden geistige Störungen in der Form von hallucinatorischer Verwirrtheit beobachtet; beide Kranke genasen vollständig.

Darmblutungen traten bei 7 Kranken auf, 2 davon starben.

Bei einem 19jährigen Mädchen mußte ein im Anschluß an Pneumonie entstandenes Empyem der Pleura operativ behandelt werden; die Kranke genas.

Ziemlich häufig, in 12 Fällen, machten sich in der Reconvalescenz Erscheinungen von Herzschwäche geltend. Der Puls, der sich bis dahin normal verhalten hatte, stieg — meistens in der zweiten Woche nach der Entfieberung, manchmal erst nach dem ersten Verlassen des Bettes — plötzlich an und zeigte namentlich abnorm große Tages-Schwankungen in seiner Frequenz, z. B. 60—116, 54—108 u. s. w. In wenigen Fällen wurden dabei systolische Geräusche am Herzen beobachtet.

In einem Falle, bei einem 17jährigen Manne, machte die typhöse Myocarditis, deren Symptome erst drei Wochen nach der Entfieberung in die Erscheinung traten, die aber dann mit einer nachweisbaren Herzdilatation einherging, noch eine Verlängerung des Hospitalaufenthaltes um drei Monate erforderlich.

In verhältnismäßig vielen (11) und teilweise auch recht schweren Fällen fehlten die für Typhus charakteristischen Diarrhöen, ja es bestand sogar vielfach eine andauernde Neigung zur Obstipation, die durch Wasser- oder Oleinläufe, seltener durch milde Abführmittel bekämpft wurde. Wenn wir noch hinzufügen, daß häufig auch der sichere Nachweis eines Milztumors nicht gelang (7 Fälle) und keine Roseolen auftraten (8 Fälle, darunter 3 schwere und 1 tödlicher\*), so illustriert dies deutlich die Schwierigkeiten, die sich der Diagnose unter Umständen entgegenstellen. In letzter Zeit haben auch wir in dem positiven Ausfall der Vidal'schen Serumreaktion in manchen Fällen ein wertvolles Hilfsmittel für die Diagnosenstellung gewonnen.

Bei der Behandlung der Typhuskranken haben wir uns, wie dies ja jetzt in den meisten Krankenhäusern geübt wird, der Anwendung von Fiebermitteln fast völlig enthalten. Bäder wurden in milder Form (26—22° R.) dann angewendet, wenn andauerndes hohes Fieber oder oberflächliche Respiration oder Benommenheit des Sensoriums u. s. w. die Anwendung dieses vorzüglichen Anregungsmittels wünschenswert machten; wo dies nicht der Fall war, oder wo die Bäderbehandlung aus besonderen Gründen nicht zulässig erschien, wurde durch tägliche Waschungen des ganzen Körpers für die dringend erforderliche Hautpflege gesorgt. Die Diät war während der ersten Wochen der Krankheit eine flüssige, auf Milch und Wassersuppen beschränkt, in der letzten Krankheitsperiode, zur Zeit des Fieberabfalls, haben wir uns, in Übereinstimmung mit den von Herrn Geh. Rat Dr. Fiedler im Stadtkrankenhaus zu Dresden geübten Grundsätzen, nicht gescheut, kräftigere Nahrungsmittel in breiiger Form, wie Leube-Rosenthal's Fleischlösung, Malzextrakt, Kraft-Chokolade, Eier in Bouillon, aufgeweichte Zwiebäcke u. dergl. zu reichen und nie nachteilige Folgen davon gesehen. Es ist dies die Zeit, in der bei den Kranken der meist völlig geschwundene Appetit wieder rege wird und wo gewöhnlich eine starke Abmagerung hervortritt. —

Nächst der Diphtherie, zeigt auch in unserem Krankenhaus die Lungentuberkulose die größte Krankenzahl: von 2621 auf der medizinischen Abteilung in den letzten 4 Jahren behandelten Kranken litten 132 an tuberkulöser Schwindsucht, und 69 fielen derselben zum Opfer.

\*) Gurschmann gelangt in seiner Monographie über den Typhus auf Grund eines sehr großen Materials zu ähnlichen Zahlen.

Unter den Komplikationen dieser Krankheit möchten wir als recht quälendes Leiden die nicht ganz selten beobachteten schmerzhaften Gelenkschwellungen hervorheben, die, ganz ähnlich wie bei dem akuten Gelenkrheumatismus, gleichzeitig oder rasch nach einander mehrere Gelenke befallen, ohne zu bleibenden Veränderungen oder zur Eiterbildung zu führen, und die man wohl als Rheumatoïd der Phtisiker bezeichnen kann.

Von anderen Krankheiten, die durch eine größere Zahl von Erkrankungsfällen vertreten waren, seien ferner noch das Scharlachfieber (105 Fälle), der akute Gelenkrheumatismus (88 Fälle), die akute Lungenentzündung (84 Fälle), die Rippenfellentzündung (59 Fälle), die chronische Bright'sche Krankheit (57 Fälle), die Herzklappenfehler (43 Fälle), die Blinddarmentzündung = Appendicitis und Periappendicitis (35 Fälle) und der Magenkrebs (49 Fälle) erwähnt.

Wie in früheren Jahren hat Herr Dr. Rudolf Panje die Güte gehabt, uns in zahlreichen Fällen von Erkrankung der Ohren seine Hilfe zu gewähren; wir sprechen ihm auch an dieser Stelle unseren herzlichsten Dank aus.

Besonderer Dank gebührt ferner Herrn Medizinalrat Dr. Schmorl, der uns nicht nur die Hilfskräfte seiner Anstalt seit Jahren in der bereitwilligsten Weise zur Verfügung gestellt, sondern uns auch durch eingehende Untersuchung zahlreicher Präparate seine höchst wertvolle Hilfe und Belehrung gewährt hat.

### 1. Übersicht über die im Krankenhaus behandelten Krankheitsfälle.

| Krankheitsname.                           | Bestand am<br>1. Jan. 1898. | Zugang. | Summa | Entlassen. |                 |                 | Gestorben. | Bestand am<br>31. Dez. 1898. | Bemerkungen.                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------------------------|-------------------------------|
|                                           |                             |         |       | Geheilt.   | Ge-<br>bessert. | Un-<br>geheilt. |            |                              |                               |
| Altersschwäche . . . . .                  | —                           | 3       | 3     | —          | —               | —               | 3          | —                            |                               |
| Scharlach . . . . .                       | —                           | 22      | 22    | 13         | —               | —               | 4          | 5                            |                               |
| Masern . . . . .                          | —                           | 5       | 5     | 3          | —               | —               | 2          | —                            |                               |
| Diphtherie . . . . .                      | 11                          | 116     | 127   | 89         | 2               | 2               | 23         | 11                           |                               |
| Unterleibstypbus . . . . .                | 2                           | 19      | 21    | 6          | —               | —               | 1          | 14                           |                               |
| Influenza . . . . .                       | —                           | 1       | 1     | 1          | —               | —               | —          | —                            |                               |
| Gesichtsrose . . . . .                    | —                           | 5       | 5     | 5          | —               | —               | —          | —                            |                               |
| Sepsis und Pyämie . . . . .               | —                           | 2       | 2     | —          | —               | —               | 2          | —                            |                               |
| Syphilis . . . . .                        | —                           | 8       | 8     | 5          | 2               | 1               | —          | —                            |                               |
| Miliartuberkulose . . . . .               | —                           | 1       | 1     | —          | —               | —               | 1          | —                            |                               |
| Akute Vergiftungen . . . . .              | —                           | 5       | 5     | 4          | —               | —               | 1          | —                            |                               |
| Bandwurm . . . . .                        | —                           | 1       | 1     | 1          | —               | —               | —          | —                            |                               |
| Ohrenentzündung . . . . .                 | —                           | 1       | 1     | —          | —               | 1               | —          | —                            | Auf die Dir.<br>Abt. verlegt. |
| Akuter Bronchialkatarrh . . . . .         | —                           | 8       | 8     | 7          | 1               | —               | —          | —                            |                               |
| Chronischer<br>Lungenentzündung . . . . . | 1                           | 1       | 1     | —          | —               | 1               | —          | —                            |                               |
| Lungenabzess . . . . .                    | 1                           | 20      | 21    | 14         | 2               | —               | 3          | 2                            |                               |
| Lungenabzess . . . . .                    | —                           | 1       | 1     | —          | —               | —               | 1          | —                            |                               |

| Krankheitsname.                                     | Bestand am<br>1. Jan. 1898. | Zugang. | Summa. | Entlassen. |                 |                 | Gestorben. | Bestand am<br>31. Dec. 1898. | Bemerkungen.                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------------------------|----------------------------------|
|                                                     |                             |         |        | Gebellt.   | Ge-<br>bessert. | Un-<br>gebellt. |            |                              |                                  |
| Lungenschwindsucht . . . . .                        | 6                           | 33      | 39     | —          | 13              | 3               | 19         | 4                            |                                  |
| Rippensfellentzündung . . . . .                     | 2                           | 10      | 12     | 5          | 2               | 3               | 1          | 1                            | 2 auf die chir.<br>Abt. verlegt. |
| Sarkom des Mittelfelles                             | —                           | 2       | 2      | —          | —               | —               | 2          | —                            |                                  |
| Acute Endocarditis (als<br>selbständige Krankheit). | 1                           | 2       | 3      | —          | 2               | —               | —          | 1                            |                                  |
| Herzklappenfehler . . . . .                         | —                           | 11      | 11     | —          | 7               | —               | 2          | 1                            |                                  |
| Acute Herzmuskelfentzün-<br>dung . . . . .          | —                           | 1       | 1      | —          | —               | —               | 1          | —                            |                                  |
| Chronische Herzmuskelfent-<br>zündung . . . . .     | —                           | 3       | 3      | —          | 1               | —               | 1          | 1                            |                                  |
| Schlagadergeschwulst . . . . .                      | —                           | 1       | 1      | —          | —               | —               | 1          | —                            |                                  |
| Halssentzündung (Angina)                            | —                           | 11      | 11     | 11         | —               | —               | —          | —                            |                                  |
| Magenkatarth . . . . .                              | 1                           | 7       | 8      | 2          | 4               | 2               | —          | —                            |                                  |
| Magenneurose . . . . .                              | —                           | 4       | 4      | 2          | 2               | —               | —          | —                            |                                  |
| Magengeschwür . . . . .                             | 1                           | 9       | 10     | 7          | 1               | 1               | —          | 1                            |                                  |
| Magenkrebs . . . . .                                | 1                           | 18      | 19     | —          | —               | 12              | 7          | —                            | 2 auf die chir.<br>Abt. verlegt. |
| Darmkatarth . . . . .                               | —                           | 7       | 7      | 4          | 2               | —               | —          | 1                            |                                  |
| Darmkrebs . . . . .                                 | —                           | 2       | 2      | —          | —               | 2               | —          | —                            | Auf die chir.<br>Abt. verlegt.   |
| Hämorrhoiden . . . . .                              | 1                           | 1       | 1      | —          | —               | 1               | —          | —                            | Auf die chir.<br>Abt. verlegt.   |
| Bauchfellentzündung . . . . .                       | —                           | 2       | 2      | 1          | —               | —               | 1          | —                            |                                  |
| Appendicitis u. Periappen-<br>dicitis . . . . .     | —                           | 8       | 8      | 3          | 1               | 3               | 1          | —                            | 3 auf die chir.<br>Abt. verlegt. |
| Bauchfellkrebs . . . . .                            | —                           | 1       | 1      | —          | —               | 1               | —          | —                            | Auf die chir.<br>Abt. verlegt.   |
| Bauchfelltuberculose . . . . .                      | —                           | 1       | 1      | —          | —               | 1               | —          | —                            | Auf die chir.<br>Abt. verlegt.   |
| Schrumpfleber . . . . .                             | 1                           | 3       | 4      | —          | —               | 2               | 2          | —                            |                                  |
| Leberkrebs . . . . .                                | —                           | 1       | 1      | —          | —               | —               | —          | 1                            |                                  |
| Leberabszess . . . . .                              | —                           | 1       | 1      | —          | —               | —               | 1          | —                            |                                  |
| Gallensteine . . . . .                              | —                           | 4       | 4      | —          | 3               | 1               | —          | —                            | 1 auf die chir.<br>Abt. verlegt. |
| Bauchspeicheldrüsenkrebs . . . . .                  | —                           | 1       | 1      | —          | —               | 1               | —          | —                            | Auf die chir.<br>Abt. verlegt.   |
| Acute Nierenentzündung                              | —                           | 2       | 2      | 1          | 1               | —               | —          | —                            |                                  |
| Chronische                                          | —                           | 7       | 7      | —          | 2               | 1               | 3          | 1                            |                                  |
| Acuter Gelenkrheumatis-<br>mus . . . . .            | 5                           | 20      | 25     | 24         | —               | —               | —          | 1                            |                                  |
| Chronischer Gelenkrheu-<br>matismus . . . . .       | —                           | 3       | 3      | —          | 3               | —               | —          | —                            |                                  |
| Muskelerheumatismus . . . . .                       | —                           | 3       | 3      | 2          | —               | —               | —          | 1                            |                                  |
| Tripperheumatismus . . . . .                        | —                           | 1       | 1      | —          | —               | —               | —          | 1                            |                                  |
| Blutarmut . . . . .                                 | —                           | 1       | 1      | 1          | —               | —               | —          | —                            |                                  |
| Bleichsucht . . . . .                               | 1                           | 1       | 2      | 1          | 1               | —               | —          | —                            |                                  |
| Berniciöse Anämie . . . . .                         | —                           | 2       | 2      | —          | —               | 1               | 1          | —                            |                                  |
| Pseudoleukämie . . . . .                            | —                           | 3       | 3      | —          | —               | 3               | —          | —                            |                                  |
| Neuralgien . . . . .                                | 1                           | 7       | 8      | 3          | 5               | —               | —          | —                            |                                  |
| Gehirnhautentzündung . . . . .                      | —                           | 3       | 3      | —          | —               | —               | 3          | —                            |                                  |
| Gehirnschlag . . . . .                              | —                           | 5       | 5      | —          | —               | 1               | 4          | —                            |                                  |
| Gehirnsyphilis . . . . .                            | —                           | 3       | 3      | —          | 1               | —               | 2          | —                            |                                  |

| Krankheitsname.                                   | Bestand am<br>1. Jan. 1898. | Zugang. | Summa. | Entlassen. |                 |                 | Gestorben. | Bestand am<br>31. Dez. 1898. | Bemerkungen.                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                   |                             |         |        | Geheilt.   | Ge-<br>bessert. | Un-<br>geheilt. |            |                              |                                           |
| Gehirngeschwulst . . . . .                        | —                           | 1       | 1      | —          | —               | —               | 1          | —                            |                                           |
| Anderer Gehirnkrankheiten . . . . .               | —                           | 7       | 7      | 1          | —               | 5               | 1          | —                            |                                           |
| Chorea . . . . .                                  | —                           | 1       | 1      | —          | —               | 1               | —          | —                            |                                           |
| Geistesstörung . . . . .                          | —                           | 3       | 3      | 1          | —               | 1               | —          | 1                            |                                           |
| Delirium Tremens . . . . .                        | —                           | 3       | 3      | 2          | —               | —               | 1          | —                            |                                           |
| Hysterie . . . . .                                | 2                           | 9       | 11     | 1          | 9               | —               | —          | 1                            |                                           |
| Migräne . . . . .                                 | —                           | 1       | 1      | —          | —               | 1               | —          | —                            |                                           |
| Epilepsie . . . . .                               | —                           | 1       | 1      | —          | —               | 1               | —          | —                            |                                           |
| Rückenmarkskrankheiten . . . . .                  | 2                           | 4       | 6      | —          | 2               | 1               | 3          | —                            |                                           |
| Kräpfe . . . . .                                  | —                           | 5       | 5      | 5          | —               | —               | —          | —                            |                                           |
| Anderer Hautkrankheiten . . . . .                 | —                           | 1       | 1      | —          | —               | —               | —          | 1                            |                                           |
| Erkrankung der weiblichen<br>Genitalien . . . . . | —                           | 7       | 7      | 1          | 2               | 3               | 1          | —                            | 3 auf die gyn.<br>näköl. Abt.<br>verlegt. |
| Tripper . . . . .                                 | —                           | 1       | 1      | —          | —               | 1               | —          | —                            |                                           |
| Beingeschwür . . . . .                            | —                           | 1       | 1      | —          | 1               | —               | —          | —                            |                                           |
| Zur Begutachtung . . . . .                        | 1                           | 33      | 34     | —          | —               | —               | —          | —                            |                                           |

## 2. Übersicht über die in der Poliklinik behandelten Krankheitsfälle. Von Dr. Henrici.

Die mit \* bezeichneten Fälle wurden in anderweitige ärztliche Behandlung verwiesen.

|                                       |    |                                      |    |
|---------------------------------------|----|--------------------------------------|----|
| Augenlidentzündung . . . . .          | 2* | Lungenerweiterung . . . . .          | 1  |
| Lidödem . . . . .                     | 1* | Lungenentzündung . . . . .           | 9  |
| Bindehautentzündung . . . . .         | 3* | Lungenschwindsucht . . . . .         | 24 |
| Bindehautblutung . . . . .            | 1  | Rippenfellentzündung . . . . .       | 1  |
| Fremdkörper im Ohr . . . . .          | 1* | Fistulöse Rippenarise . . . . .      | 1* |
| Trommelfellentzündung . . . . .       | 1* | Brustentzündung (Mastitis) . . . . . | 2* |
| Mittelohrkatarrh . . . . .            | 2* | Chronische Herzfleischentzündung     | 2  |
| Taubheit . . . . .                    | 1* | Herzfehler . . . . .                 | 8  |
| Anderer Ohrenleiden . . . . .         | 2* | Postdiphtherische Herzaffektionen    | 8  |
| Nasenbluten . . . . .                 | 1  | Arteriosklerose . . . . .            | 2  |
| Adenoide Vegetationen . . . . .       | 4* | Magenkatarrh . . . . .               | 5  |
| Rhinitis . . . . .                    | 1* | Magenkrebs . . . . .                 | 4  |
| Schnupfen . . . . .                   | 2  | Magenhyperacidität . . . . .         | 1  |
| Anderer Nasenkrankheiten . . . . .    | 1* | Dyspepsie . . . . .                  | 28 |
| Zahnfleischentzündung . . . . .       | 3  | Dünndarmkatarrh . . . . .            | 14 |
| Zahnwurzelhautentzündung . . . . .    | 1  | Katarrhalische Gelbsucht . . . . .   | 1  |
| Zahnfistel . . . . .                  | 1  | Dickdarmkatarrh . . . . .            | 7  |
| Mundschleimhautkatarrh . . . . .      | 7  | Verstopfung . . . . .                | 11 |
| Defubitalgeschwür der Zunge . . . . . | 1  | Blinddarmentzündung . . . . .        | 2  |
| Mandelentzündung . . . . .            | 14 | Unterleibsgeschwulst . . . . .       | 1  |
| Kehlkopfkatarrh . . . . .             | 15 | Gallensteine . . . . .               | 3  |
| Kehlkopf- oder Luftröhrenstenose      | 1* | Darmparasiten . . . . .              | 5  |
| Luftröhrenkatarrh . . . . .           | 31 | Hernien . . . . .                    | 4* |
| Asthma . . . . .                      | 1  | Nabelhernie . . . . .                | 2  |

|                                          |    |                                          |    |
|------------------------------------------|----|------------------------------------------|----|
| Skoliose . . . . .                       | 2* | Pseudoleukämie . . . . .                 | 1  |
| Lumbago . . . . .                        | 2  | Diabetes insipidus . . . . .             | 1  |
| Nierenentzündung . . . . .               | 2  | Fettsucht . . . . .                      | 1  |
| Schrumpfniere . . . . .                  | 1  | Pädatrophie . . . . .                    | 1  |
| Lipom . . . . .                          | 1* | Spitzpocken . . . . .                    | 2  |
| Scheidenentzündung . . . . .             | 2* | Masern . . . . .                         | 3  |
| Metrorrhagie . . . . .                   | 2* | Keuchhusten . . . . .                    | 7  |
| Retoflexio uteri fixata . . . . .        | 1  | Lupus . . . . .                          | 1  |
| Schwangerschaft . . . . .                | 2  | Strophulose . . . . .                    | 2  |
| Erosionen der Vorhaut . . . . .          | 1  | Neurasthenie . . . . .                   | 8  |
| Trippler . . . . .                       | 1* | Neuralgie . . . . .                      | 4  |
| Syphilis . . . . .                       | 16 | Facialisparese . . . . .                 | 2  |
| Phimose . . . . .                        | 8* | Nervöser Haarschwund . . . . .           | 1  |
| Wasserbruch . . . . .                    | 1  | Beitstanz . . . . .                      | 1  |
| Rhachitis . . . . .                      | 15 | Wasserkopf . . . . .                     | 1  |
| Pes varus . . . . .                      | 1* | Spinale Kinderlähmung . . . . .          | 1  |
| Pes valgus . . . . .                     | 1  | Pseudohypertrophie der Muskeln . . . . . | 1  |
| Knochenmarkentzündung . . . . .          | 1  | Jugendliche Muskelatrophie . . . . .     | 1  |
| Hüftgelenkentzündung . . . . .           | 1  | Epilepsie . . . . .                      | 2  |
| Multiple Exostosen . . . . .             | 1  | Idiotismus . . . . .                     | 1  |
| Fraktur des Oberschenkels . . . . .      | 1* | Nächtliches Bettpiessen . . . . .        | 1  |
| Krampfadern . . . . .                    | 1  | Hysterie . . . . .                       | 2  |
| Sehnenscheidenentzündung . . . . .       | 1  | Migräne . . . . .                        | 2  |
| Kontusion des Ellenbogens . . . . .      | 1  | Ekzem . . . . .                          | 28 |
| Kontusion der Schulter . . . . .         | 1  | Artikaria . . . . .                      | 3  |
| Ankylose des Schultergelenks . . . . .   | 1  | Miliaria . . . . .                       | 2  |
| Bienenstich . . . . .                    | 1  | Herpes zoster . . . . .                  | 1  |
| Rheumatische Schmerzen . . . . .         | 10 | Erythem . . . . .                        | 1  |
| Kniegelenkentzündung . . . . .           | 2  | Psoriasis der Zunge . . . . .            | 1  |
| Chronischer Gelenkrheumatismus . . . . . | 4  | Warzen . . . . .                         | 2  |
| Scharlachgelenkentzündung . . . . .      | 1  | Pemphigus . . . . .                      | 1  |
| Drüsenentzündung . . . . .               | 5  | Krähe . . . . .                          | 7  |
| Drüsenabszesse . . . . .                 | 4* | Sylois parasitaria . . . . .             | 1  |
| Kropf . . . . .                          | 4* | Impetigo contagiosa . . . . .            | 1  |
| Blutarmut . . . . .                      | 10 | Consultationen . . . . .                 | 93 |
| Bleichsucht . . . . .                    | 5  |                                          |    |



### III. Chirurgische Abteilung.

Von Hofrat Dr. Rupprecht.

#### 1. Krankenbestand am 1. Januar 1898.

|                                                                                                            | Zusammen. | Geheilt. | Ungeheilt. | Gestorben. | Bemerkungen.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|---------------|
| Brustkrebs . . . . .                                                                                       | 2         | 2        | —          | —          |               |
| Zungentrebs . . . . .                                                                                      | 1         | 1        | —          | —          |               |
| Mastdarmkrebs (nicht operierbar) . .                                                                       | 1         | —        | 1          | —          |               |
| Bauchfellkrebs ( " " " " " ) . . . .                                                                       | 1         | —        | 1          | —          |               |
| Krebsige Schilddrüsenmetastase im<br>Scheitelbein . . . . .                                                | 1         | 1        | —          | —          |               |
| Basedow-Kropf (1/2seitig reseziert) . .                                                                    | 1         | 1        | —          | —          |               |
| Leontiasis faciei durch weiches Fibram<br>(Keilexcisionen) . . . . .                                       | 1         | 1        | —          | —          |               |
| Angiocavernom der Vorderarmmuskeln<br>(Galvanopunktur) . . . . .                                           | 1         | —        | 1*         | —          | *) gebessert. |
| Nierenzerreißung (cons. beh.) . . . .                                                                      | 1         | 1        | —          | —          |               |
| Blasenstein (Kind, sectio alta) . . . .                                                                    | 1         | 1        | —          | —          |               |
| Blasenkatarrh (Spülungen) . . . . .                                                                        | 1         | —        | 1*         | —          | *) gebessert. |
| Magengeschwürbeschwerden . . . . .                                                                         | 1         | —        | 1          | —          |               |
| Blinddarmentzündung (rückfällige,<br>operiert) . . . . .                                                   | 1         | 1        | —          | —          |               |
| Leistenbruch (radikal operiert) . . . .                                                                    | 1         | 1        | —          | —          |               |
| Widernatürl. After (Murphyknopf-<br>anastomose u. Plastik) . . . . .                                       | 1         | 1        | —          | —          |               |
| Brustfellvereiterung (nach Pneumonie)<br>incidiert . . . . .                                               | 2         | 2        | —          | —          |               |
| Kniegelenksvereiterung mit 40<br>Schüttelfrösten (quere Eröffnung u. Tam-<br>ponade des Gelenks) . . . . . | 1         | 1        | —          | —          |               |
| Knie- u. Handgelenksvereiterung<br>(alter Mann, Spaltung u. Drainage) . .                                  | 1         | 1        | —          | —          |               |
| Knochenmarkvereiterung und deren<br>Folgen:                                                                |           |          |            |            |               |
| Schenkelhals (Resectio coxae) . . . . .                                                                    | 3         | 3        | —          | —          |               |
| Oberschenkel . . . . .                                                                                     | 2         | 2        | —          | —          |               |
| Schienbein . . . . .                                                                                       | 3         | 3        | —          | —          |               |

|                                                                                                                | Zusammen  | Geheilt.  | Ungeheilt. | Gestorben. | Bemerkungen.                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|
| <b>Tuberkulose:</b>                                                                                            |           |           |            |            |                                               |
| Brustbein (Erw., reseziert) . . . . .                                                                          | 2         | 2         | —          | —          |                                               |
| Darmbein (Erw., reseziert) . . . . .                                                                           | 1         | 1         | —          | —          |                                               |
| Harnröhre und Damm . . . . .                                                                                   | 1         | —         | —          | 1*         | *) Miliartub.                                 |
| Mehrfache Knochen- und Gelenk-Tub.<br>(Kinder) . . . . .                                                       | 2         | —         | 1          | 1*         | *) Diphtherie.                                |
| Knie, Hüfte (Kinder; cons. noch in Beh.)                                                                       | 2         | —         | 2          | —          |                                               |
| Ferse, Weichteile des Unterschenkels (op.)                                                                     | 2         | 2         | —          | —          |                                               |
| Fußwurzel, Weichteile des Vorderarmes<br>(Erw.) . . . . .                                                      | 2         | —         | 2*         | —          | *) 1 später ampu-<br>tiert, 1 ungeb.<br>entl. |
| Verbrennung . . . . .                                                                                          | 1         | 1         | —          | —          |                                               |
| Wunde des Augenlids . . . . .                                                                                  | 1         | 1         | —          | —          |                                               |
| Unterschenkelbrüche (im Gessverband<br>beh.) . . . . .                                                         | 2         | 2         | —          | —          |                                               |
| Unterschenkelbrüche (offene) . . . . .                                                                         | 3         | 3         | —          | —          |                                               |
| Nadeln verschluckt (Hysterie) . . . . .                                                                        | 1         | —         | 1          | —          |                                               |
| Neuralgia mandibularis (Excision<br>des Nerven nach Aufmeißelung des<br>Unterkiefers in seiner ganzen Länge) . | 1         | 1         | —          | —          |                                               |
| Eczema universale . . . . .                                                                                    | 1         | —         | 1*         | —          | *) gebessert.                                 |
| <b>Zusammen</b>                                                                                                | <b>50</b> | <b>36</b> | <b>12</b>  | <b>2</b>   |                                               |

## 2. Neu aufgenommen wurden im Jahre 1898:

|                                                                                                  | Zusammen | Geheilt. | Ungeheilt. | Gestorben. | Bemerkungen.                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|-------------------------------------------|
| <b>I. Verletzungen.</b>                                                                          |          |          |            |            |                                           |
| Schnittwunden, größere, an Fuß,<br>Wade, Hand . . . . .                                          | 4        | 4*       | —          | —          | *) Sebnennabt.<br>Radialisunter-<br>bind. |
| Zerfleisungen der Hand durch Maschinen                                                           | 4        | 2        | —          | 2*         | *) Tetanus.                               |
| Stichwunde der Hohlhand (Blutung aus<br>arcus vol. prof.) Tamponade u. Sus-<br>pension . . . . . | 1        | 1        | —          | —          |                                           |
| Stichwunde des Oberschenkels (Unterbin-<br>dung einer Art. perforans) . . . . .                  | 1        | 1        | —          | —          |                                           |
| Schnittwunde des Kehlkopfs (Suicid.)<br>Tracheotomie . . . . .                                   | 1        | 1        | —          | —          |                                           |
| Schusswunden, frische (Schädeldecken,<br>Gehirn), cons. beh. . . . .                             | 2        | 2        | —          | —          |                                           |
| Schusswunde, vereiterte (Hohlhand), Spal-<br>tung u. Geschoßentf. . . . .                        | 1        | 1        | —          | —          |                                           |
| Quetschwunden an Kopf, Gesicht, Fuß                                                              | 5        | 5        | —          | —          |                                           |

|                                                                               | Zusammen. | Geheilt. | Ungeheilt. | Gestorben. | Bemerkungen.                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|------------------------------------|
| Eröffnung des Kniegelenks d. Quetschwunde (Incision, Drainage) . . .          | 1         | 1        | —          | —          |                                    |
| Große Lappenwunden am Kopf (lockere Naht) . . . . .                           | 2         | 2        | —          | —          |                                    |
| Bereiterte Kopfwunden, gespalten                                              | 3         | 3        | —          | —          |                                    |
| Stahlspitter a. d. Arm entfernt . . . . .                                     | 1         | 1        | —          | —          |                                    |
| Verbrennungen, ausgedehnte . . . . .                                          | 4         | 3        | —          | 1          |                                    |
| Offene Schädelbrüche, umschriebene, frisch eingebracht, trepaniert . . . . .  | 2         | 2        | —          | —          |                                    |
| Offener Schädelbruch, am 12. Tage eingebracht . . . . .                       | 1         | —        | —          | 1*         | *) Meningitis.                     |
| Offener Bruch des Fochbeins (Abtragung der prolabierten Iris) . . . . .       | 1         | 1        | —          | —          |                                    |
| Offene Unterkieferbrüche (Drahtnaht)                                          | 2         | 2        | —          | —          |                                    |
| Offener Oberkieferbruch (Hufschlag)                                           | 1         | 1        | —          | —          |                                    |
| Offene Brüche der Röhrenknochen (Vorderarm, Oberarm, Unterschenkel) . . . . . | 3         | 3        | —          | —          |                                    |
| Geschlossene Brüche des Unterschenkels, der Knöchel (Gips-Geverbande)         | 6         | 6        | —          | —          |                                    |
| Geschlossene Schenkelhalsbrüche (Extensionsvbd.) . . . . .                    | 3         | 1        | —          | 2*         | *) 80 u. 82 Jahre alt.             |
| Geschlossener Bruch des Oberarmhalses (Massage, Mitella) . . . . .            | 1         | 1        | —          | —          |                                    |
| Oberschenkelbruch, Extension . . . . .                                        | 1         | 1        | —          | —          |                                    |
| Spontaner Oberarmbruch (Gues) Hessingschiene, Schmierkur . . . . .            | 1         | 1        | —          | —          |                                    |
| Radiusbruch                                                                   | 1         | 1        | —          | —          |                                    |
| Bruch der Mittelfußknochen II u. III, Massage . . . . .                       | 1         | 1        | —          | —          |                                    |
| Rippenbrüche                                                                  | 3         | 2        | 1*         | —          | *) wegen Pneumonie verlegt †.      |
| Distorsion des Fußes, Massage . . . . .                                       | 2         | 2        | —          | —          |                                    |
| Seitenbandzerreißung am Knie (Gipsvbd.) . . . . .                             | 1         | 1        | —          | —          |                                    |
| Verrenkung des Daumens (blutig reponiert)                                     | 1         | 1        | —          | —          |                                    |
| Verrenkung der Schulter nach hinten, veraltet, reseziert . . . . .            | 1         | 1        | —          | —          |                                    |
| Verrenkung der Schulter nach innen, frisch, reponiert . . . . .               | 2         | 2        | —          | —          |                                    |
| Commotion des Gehirns (Pulsverlangsamung, Erbrechen u.) . . . . .             | 2         | 2        | —          | —          |                                    |
| Contusion des Gehirns                                                         | 3         | 1        | 1*         | 1          | *) Geistesstörung.                 |
| Zertrümmerung des Brustkorbes                                                 | 1         | —        | —          | 1          |                                    |
| Contusion des Bauches, Hufschlag, cons. beh. . . . .                          | 2         | 1        | —          | 1*         | *) erst nach 48 Std. eingeliefert. |
| Contusion des Rückens, der Hüfte, der Oberschenkel                            | 4         | 4        | —          | —          |                                    |
| Kniegelenksbruch (Condylen des Oberschenkels); 2 Wochen lang Gipsverband      |           |          |            |            |                                    |

|                                                                                                                                                                         | Zusammen. | Geheilt. | Ungeheilt. | Gestorben. | Bemerkungen.                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|------------------------------|
| mit Gewichtserstension, dann Gessinghülse mit Gummizug abwechselnd vorn u. hinten; medicomech. Behandlung; geheilt mit Festigkeit u. Beweglichkeit bis zu 1 R. . . . .  | 1         | 1        | —          | —          |                              |
| Nierenzerreißung (conj. beh.) . . . .                                                                                                                                   | 1         | 1        | —          | —          |                              |
| Zusammen                                                                                                                                                                | 77        | 67       | 2          | 8          |                              |
| <b>II. Mißbildungen und Verkrümmungen.</b>                                                                                                                              |           |          |            |            |                              |
| Hasenscharten (2 operiert, 2 wegen Katarth b. a. Weit. entlassen) . . . .                                                                                               | 4         | 2        | 2          | —          |                              |
| Angeborene Gaumenspalten, operiert                                                                                                                                      | 3         | 3        | —          | —          |                              |
| Lueth. Gaumendefekt, operiert . . . .                                                                                                                                   | 1         | 1        | —          | —          |                              |
| Angeborener Afterverschluß, operiert .                                                                                                                                  | 1         | 1*       | —          | —          | *) nach 5 Monaten †.         |
| Verwachsene Finger, Plastik . . . . .                                                                                                                                   | 1         | 1        | —          | —          |                              |
| Mißbildung der weibl. Genitalien (nichts gethan) . . . . .                                                                                                              | 1         | —        | 1          | —          |                              |
| Geringe Hypospadie (nichts gethan) .                                                                                                                                    | 1         | —        | 1          | —          |                              |
| Phimose, Spaltg. u. . . . .                                                                                                                                             | 1         | 1        | —          | —          |                              |
| Angeborene Verrenkung des Hüftgelenks (23 Mal an 16 Kindern, 9 einseitig u. 7 doppelseitig erkrankten) . .                                                              | 16        | 14       | 2*         | —          | *) 1 noch in B. 1 ungeheilt. |
| Angeborener Schiefhals (offene Muskel-trennung)                                                                                                                         | 1         | 1        | —          | —          |                              |
| Angeborene Klumpfüße (Tenot.; Redressment; Gips)                                                                                                                        | 2         | 2        | —          | —          |                              |
| Klumpfüße nach Typhus (1 redressiert, 1 Excisio Tali; Erwachsener)                                                                                                      | 1         | 1        | —          | —          |                              |
| Spitzfuß, paralyt.; Tenotomie, Schiene                                                                                                                                  | 1         | 1        | —          | —          |                              |
| Spitzfüße (durch Dystrophia musculor. neuritica) Tenotomie . . . . .                                                                                                    | 2         | 2*       | —          | —          | *) gebessert.                |
| Klumpfüße paralytische; 1 Tenot., 1 Sehnen-transplantation . . . . .                                                                                                    | 2         | 2*       | —          | —          | *) gebessert.                |
| Plattfüße, paralytische; 2 Tenot und Schiene, 1 Sehnen-transplantation . . .                                                                                            | 3         | 3*       | —          | —          | *) gebessert.                |
| Abduktionsstellung der Hüfte durch Schrumpfung der äußeren Weichteile nach Reposition der cong. lux. Hüfte; Myotomie, Lorenz'scher Redresseur, Massage, Bäder . . . . . | 3         | 3        | —          | —          |                              |
| Abduktionsstellung der Hüfte nach Gel.=Rheumat.; Redresseur, 4 Wochen Gips- vbd., Massage, Bäder . . . . .                                                              | 1         | 1        | —          | —          |                              |
| Spontanluxation des Oberschenkels nach Osteomyelitis d. Schenkelhalses; 1 auf Darmbein, 1 auf foramen ob-turatorium; beide reseziert (Kinder) .                         | 2         | 2        | —          | —          |                              |

|                                                                                                                                                | Zusammen. | Geheilt. | Ungeheilt. | Gestorben. | Bemerkungen.    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|-----------------|
| Ausheilende Coxitis (Hessing's Hülsen-<br>schiene)                                                                                             | 1         | 1        | —          | —          |                 |
| Schiefgeheilte Knochenbrüche (1<br>Oberschenkel Osteotomie, 2 Unterschenkel<br>Osteoklase)                                                     | 3         | 3        | —          | —          |                 |
| Bugstellung des Kniegelenks nach<br>chron. Rheumat.; nach geheimer Tubercu-<br>lose; 1 Keilosteotomiert, 3 in Narke<br>gestreckt u. eingegipst | 4         | 4        | —          | —          |                 |
| Hochgradige rhachit. Verkümmung der<br>Unterschenkel bei Zwergwuchs; Teno-<br>tomie, Osteoklase, Gips                                          | 1         | 1        | —          | —          |                 |
| Hochsitzende Kypnose, Turymast-Corset                                                                                                          | 1         | —        | 1          | —          |                 |
| Hallux valgus, Amputation                                                                                                                      | 1         | 1        | —          | —          |                 |
| Zusammen                                                                                                                                       | 59        | 52       | 7          | —          |                 |
| <b>III. Krankheiten der Knochen und Gelenke.</b>                                                                                               |           |          |            |            |                 |
| Osteomalacie in der unteren Schien-<br>beinhälfte (Aufmeißelung; Hessing'sche<br>Schienenhülse)                                                | 1         | —        | 1          | —          |                 |
| Knochenneuralgie des Schienbeins<br>durch entzündl. Osteosklerose (Aufmeißel-<br>ung)                                                          | 1         | 1        | —          | —          |                 |
| Knochenabzehr, geschlossener, im Schien-<br>beinkopfe; Aufmeißelung, Lappenplastik                                                             | 1         | 1        | —          | —          |                 |
| Ostitis-Chronica des Joch- u. Stirn-<br>beins mit Hydrops der Stirnhöhle;<br>Resektion der vorderen Stirnhöhlenwand                            | 1         | 1        | —          | —          |                 |
| Poser Semilunarknorpel im Knie<br>(wegen bestehender Gonorrhö nicht<br>operiert)                                                               | 1         | —        | 1          | —          |                 |
| Traumat. Rippenknorpelnekrose,<br>Extraktion                                                                                                   | 1         | 1        | —          | —          |                 |
| Acute Ostitis d. Oberschenkels, spon-<br>tan geheilt                                                                                           | 1         | 1        | —          | —          |                 |
| Acute eiterige Osteomyelitis des Schen-<br>kelhalses (Hüftresektion)                                                                           | 1         | 1        | —          | —          |                 |
| Acute eiterige Osteomyelitis des Darm-<br>beins, des Trochanters, des Mittelfußes;<br>incidiert u. nach 3 Monaten nekrotomiert                 | 3         | 3        | —          | —          |                 |
| Nekrosen (1 Unterkiefer, 2 Oberarm,<br>4 Oberschenkel, 6 Schienbein); nekrotom.                                                                | 13        | 10       | 3*         | —          | *) noch in Beh. |
| Seröse Synovitis des Kniegelenks;<br>Punktion u. Carbolpflügelung 3%                                                                           | 4         | 4        | —          | —          |                 |
| Leichte Synovitis des Kniegelenks<br>(früher Nekrose im Oberschenkel); Verband                                                                 | 1         | 1        | —          | —          |                 |
| Traumat. Haemarthros genu; Kom-<br>pression, Massage                                                                                           | 1         | 1        | —          | —          |                 |

|                                                                                                                                                            | Zusammen. | Geheilt. | Ungeheilt. | Gestorben. | Bemerkungen.                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|--------------------------------------------|
| Chron. polyartikulär. Gelenkrheumat.;<br>Schwitzkur                                                                                                        | 1         | —        | 1          | —          |                                            |
| Chron. Arthritis der Hüfte, des Knie's,<br>des Fußes, beider Ellbogen; Hefing-<br>schiene: Redressement u. Gips; später<br>Teplitz . . . . .               | 4         | 1        | 3          | —          |                                            |
| Zusammen                                                                                                                                                   | 35        | 26       | 9          | —          |                                            |
| <b>IV. Krankheiten der Eingeweide.</b>                                                                                                                     |           |          |            |            |                                            |
| Gallensteine (1 Cystektomie, 1 Cystico-<br>tomie, 2 Choledochotomien) . . . . .                                                                            | 4         | 4        | —          | —          |                                            |
| 1 Gallensteinfranker wünschte keine Ope-<br>ration                                                                                                         | 1         | —        | 1          | —          |                                            |
| Leber-Echinococcus (nach v. Volkmann<br>operiert) . . . . .                                                                                                | 1         | 1*       | —          | —          | *) später † an<br>Pungenechino-<br>coccos? |
| Leber-Cirrhose (Talmia's Operation<br>zur Entlastung des Pfortaderkreislaufes)                                                                             | 1         | —        | 1          | —          |                                            |
| Gehirnhautbruch (Hydromeningocele)<br>am Hinterhaupt; excidiert . . . . .                                                                                  | 1         | 1        | —          | —          |                                            |
| Magengeschwüre, alte, mit hochgradiger<br>Magenerweiterung, Abmagerung,<br>Schmerzen; Gastro-Eutero-stomia retro-<br>colica posterior durch Naht . . . . . | 3         | 3        | —          | —          |                                            |
| Nierenstein (nußgroßer Oxalatstein);<br>Nierenbeckenschnitt durch die Niere . . . . .                                                                      | 1         | 1        | —          | —          |                                            |
| Nierentuberkulose; Nephrektomie . . . . .                                                                                                                  | 1         | 1        | —          | —          |                                            |
| Wanderniere; Nephrorrhaphie . . . . .                                                                                                                      | 4         | 4        | —          | —          |                                            |
| Blasenstein (Lithotripsie) . . . . .                                                                                                                       | 1         | 1        | —          | —          |                                            |
| Harnröhrenstein, eingekl.; Urethro-<br>tomie . . . . .                                                                                                     | 1         | 1        | —          | —          |                                            |
| Blinddarmentzündung; 1 Anfall<br>mit Exsudat. conj. beh. . . . .                                                                                           | 4         | 4        | —          | —          |                                            |
| Blinddarmentzündung; perforativ-<br>eiterige mit Rothstein; incidiert . . . . .                                                                            | 1         | 1        | —          | —          |                                            |
| Blinddarmentzündung, rückfällig;<br>mit Resect. des Wurmfortsatzes operiert                                                                                | 11        | 11       | —          | —          |                                            |
| Hämorrhoidalknotten; Zerstörung<br>durch Paquelin . . . . .                                                                                                | 8         | 8        | —          | —          |                                            |
| Mastdarmfisteln, operiert . . . . .                                                                                                                        | 10        | 10       | —          | —          |                                            |
| Mastdarmscheidenfistel, operiert . . . . .                                                                                                                 | 1         | 1*       | —          | —          | *) rückfällig.                             |
| Mastdarmharnröhrenfistel, spontan<br>geheilt . . . . .                                                                                                     | 1         | 1        | —          | —          |                                            |
| Blasenscheidenfistel, kleine; nach gynäk. Abt.<br>verlegt . . . . .                                                                                        | 1         | —        | 1          | —          |                                            |
| Blasenscheidenfistel, große, hoch u.<br>unbeweglich sitzende; vernäht nach Sectio<br>alta (2 Sitzungen) . . . . .                                          | 1         | 1*       | —          | —          | *) mit Haarfistel.                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zusammen. | Geheilt. | Ungeheilt. | Gestorben. | Bemerkungen.                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|--------------------------------------------------|
| Fissura ani, gedehnt . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3         | 3        | —          | —          |                                                  |
| Chronische, stricturierende Mastdarm-<br>verengung . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         | —        | 1          | —          |                                                  |
| Dickdarmkatarrh, mit Colica mucosa<br>unter Verdacht auf Perityphlitis eingeleit.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3         | —        | 3          | —          |                                                  |
| Fleus durch Koprostase (Einläufe) . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1         | 1        | —          | —          |                                                  |
| durch ausgebreitete adhäsive Peritonitis<br>durch Torzion der Flexura coli, laparoto-<br>miert . . .                                                                                                                                                                                                                                                          | 2         | —        | —          | 2*         | *) 1 Fall mit Tu-<br>teroanästomose<br>operiert. |
| durch Carcinom der Flexus (?) . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | —        | —          | 1          |                                                  |
| Brüche, nicht eingeklemmte, radical ope-<br>riert (7 Leistenbrüche, nach Bassini,<br>dabei 1 Cystocele angeschnitten, drainiert<br>und geheilt. 3 Schenkelbrüche, 2 Bauch-<br>brüche nach Laparotomie, 1 Nabelbruch*,<br>1 properitonealer Leistenbruch . . .                                                                                                 | 14        | 13       | —          | 1*         | *) Sträfling an<br>sept. Stomatitis.             |
| Brüche, nicht eingeklemmte, mit Bandage<br>versehen (1 alter 82jähr. Mann mit<br>Leistenbruch, 1 große Lumbalhernie nach<br>Sarkomexstirpation) . . .                                                                                                                                                                                                         | 2         | —        | 2          | —          |                                                  |
| Brüche, eingeklemmte; herniotomiert mit<br>Reposition und Bruchpfortennaht (1<br>Leistenbruch, 3 Schenkelbrüche) . . .                                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 4        | —          | —          |                                                  |
| Schenkelbruch, eingeklemmter, unblutig re-<br>poniert . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | 1        | —          | —          |                                                  |
| Schenkelbruch, Entzündung im Bruchsack;<br>Spaltung, Abtragung . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         | 1        | —          | —          |                                                  |
| Brüche, eingeklemmt u. brandig (3 Schen-<br>kelbrüche, 2 Leistenbrüche, 1 Nabelbruch,<br>1 des foramen Obturatorium); 1 Mal<br>Darmresektion u. Murphyknopf †; 5 Mal<br>Bildung eines anus praeternaturalis,<br>4 †, 1 noch in B., 1 Mal wegen ein-<br>getretener eiteriger Peritonitis Hernio-<br>laparotomie u. Tamponade des tl. Beckens,<br>geheilt . . . | 7         | 1        | 1          | 5          |                                                  |
| Wasserbrüche (op. mit Excision der<br>Wand) . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3         | 3        | —          | —          |                                                  |
| Gangränöse Orchitis u. Cystitis gonorrhoeica;<br>Incisionen, Spülungen . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1         | 1        | —          | —          |                                                  |
| Schrumpfbhase durch Urogenitaltuberkulose<br>Narbige Präputialverwachsung, Strikturen,<br>Blasenkatarrh; Posthioplastik nach Dief-<br>senbach, Sondentur, Spülungen . . .                                                                                                                                                                                     | 1         | 1        | —          | —          |                                                  |
| Phimose u. Paraphimose (Spaltungen 2c.)<br>Harnretention d. Prostatahypertrophie (3.<br>T. mit falschen Wegen); dicker Mercier-<br>katheter . . .                                                                                                                                                                                                             | 3         | 3        | —          | —          |                                                  |
| Blasenkatarrh (Spülungen) . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5         | 5        | —          | —          |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         | 1        | —          | —          |                                                  |

2\*

|                                                                                                                                                                             | Zusammen. | Gebett. | Ungebett. | Gestorben. | Bemerkungen.           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------|------------------------|
| Blasen- u. Nierenbeckenfatarrh . . . . .                                                                                                                                    | 2         | —       | 2         | —          |                        |
| Nierenblutungen (entzieht sich d. Behandlung) . . . . .                                                                                                                     | 1         | —       | 1         | —          |                        |
| Nierensand . . . . .                                                                                                                                                        | 1         | —       | 1         | —          |                        |
| Nierenentzündung (verlegt) . . . . .                                                                                                                                        | 1         | —       | 1         | —          |                        |
| Amyloid in Folge doppelseit. chron. Nierenbeckeneiterung trotz doppelseit. Nephrotomie u. Drainage vor 2 Jahren . . .                                                       | 1         | —       | —         | 1          |                        |
| Zusammen                                                                                                                                                                    | 119       | 92      | 16        | 11         |                        |
| <b>V. Geschwülste.</b>                                                                                                                                                      |           |         |           |            |                        |
| Krebs der Schläfe (Abmeißelung, Transplantation) . . . . .                                                                                                                  | 1         | 1       | —         | —          |                        |
| Krebs der äußeren Nase (Exc.; Transpl.; Plastik) . . . . .                                                                                                                  | 3         | 3       | —         | —          |                        |
| Krebs der inneren Nase (Ausräumung unter temporärer Aufklappung der Nase)                                                                                                   | 1         | 1       | —         | —          |                        |
| Krebs der äußeren Wange, inop. . . . .                                                                                                                                      | 1         | —       | 1         | —          |                        |
| Krebs der inneren Wange, exc. . . . .                                                                                                                                       | 1         | 1       | —         | —          |                        |
| Krebs der Lider und des Auges; Ausräumung der Orbita und Plastik . . .                                                                                                      | 1         | 1       | —         | —          |                        |
| Krebs der Unterlippe; Exc.; Plastik; Halsdrüsenausräumung . . . . .                                                                                                         | 3         | 3       | —         | —          |                        |
| Oberkieferkrebs, inop. . . . .                                                                                                                                              | 1         | —       | 1         | —          |                        |
| Unterkieferkrebs; 1/2seit. Res. mit Entfernung eines Stückes der Zunge und Ausr. d. Halslymphdrüsen nach vorheriger Tracheotomie . . . . .                                  | 1         | 1       | —         | —          |                        |
| Halsdrüsenkrebs, nach Nasenkrebs, Ausräumung . . . . .                                                                                                                      | 1         | 1       | —         | —          |                        |
| Halsdrüsenkrebs, nach Zungenkrebs, inop.                                                                                                                                    | 1         | —       | 1         | —          |                        |
| Kehlkopfkrebs, inop.; Tracheotomie . . .                                                                                                                                    | 1         | —       | 1         | —          |                        |
| Achseldrüsenkrebs bei Magenkrebs (nach Probeexcision mikroskopisch nachgewiesen)                                                                                            | 1         | —       | 1         | —          |                        |
| Speiseröhrenkrebs (1 Gastrostomie) . . .                                                                                                                                    | 3         | —       | 3         | —          |                        |
| Brustkrebs bei Frauen (1 wegen hohen Alters u. Herzdegeneration nicht op.; 12 Mal Amputatio Mammae samt Muskulatur und Achselfett*; 3 Operationen wegen Rückfall) . . . . . | 16        | 13      | 3         | —          | *) 1 Mal doppelseitig. |
| Krebs der Vulva (1 inop.; 1 mit Ausr. d. Leiste excid.) . . . . .                                                                                                           | 2         | 1       | 1         | —          |                        |
| Krebs d. Penis (1 inop.; 1 mit Ausr. d. Leiste excid.) . . . . .                                                                                                            | 2         | 1       | 1         | —          |                        |
| Krebs ad anum (excid.) . . . . .                                                                                                                                            | 1         | 1       | —         | —          |                        |
| Magenkrebs (3 ohne Stenose u. inop.; 3 mit Stenose mittelst Morphylknopf gastroenterostomiert . . . . .                                                                     | 6         | —       | 5         | 1*         | *) Spornbildung.       |



|                                                                                                     | Zusammen. | Geheilt. | Ungeheilt. | Gestorben. | Bemerkungen.                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|------------------------------|
| Bauchfellkrebs (probelaparotomiert) . . .                                                           | 2         | —        | 2          | —          |                              |
| Pankreaskrebs . . . . .                                                                             | 1         | —        | —          | 1          |                              |
| Dickdarmkrebs (2 inop; 2 reseziert u.<br>genäht) . . . . .                                          | 4         | 1        | 2          | 1          |                              |
| Mastdarmkrebs (2 mit Amputatio recti<br>geheilt, 8 inoperabele colostomiert . . .                   | 9         | 2        | 3          | 4          |                              |
| Sarkome am Hals (1 op., 2 inop.) . . .                                                              | 3         | —        | 3          | —          |                              |
| Maligne Lymphome (Arjen) . . . . .                                                                  | 2         | —        | 2          | —          |                              |
| Tumor im mediastinum antic . . . . .                                                                | 1         | —        | 1          | —          |                              |
| Periostsarkom d. großen Zehe, Exarti-<br>culation . . . . .                                         | 1         | 1        | —          | —          |                              |
| Chondromyxom der Fußwurzel (1 Pirogoff,<br>1 Op. verweigert) . . . . .                              | 2         | 1        | 1          | —          |                              |
| Fibrome am Unterkiefer, Hohlhand, excid.                                                            | 2         | 2        | —          | —          |                              |
| Lipome am Hals, Schulter, excid. . . . .                                                            | 3         | 3        | —          | —          |                              |
| Hygrome am Zungenbein, Knie Scheibe, excid.                                                         | 2         | 2        | —          | —          |                              |
| Exostosis burjata am Condyl. ext. fem.,<br>abgemeißelt . . . . .                                    | 1         | 1        | —          | —          |                              |
| Neurom d. Medianus am Vorderarm=<br>amputationsstumpf; Abtragung von<br>20 cm. des Nerven . . . . . | 1         | 1*       | —          | —          | *) Neuralgie be-<br>seitigt. |
| Angiome am Ohr läppchen, Augenlid; Ex-<br>cision u. Plastik . . . . .                               | 2         | 2        | —          | —          |                              |
| Lymphangiom an Schulter und Oberarm,<br>excidiert . . . . .                                         | 1         | 1        | —          | —          |                              |
| Lymphangiomatöse Leontiasis des halben<br>Gesichts (Keilexcisionen) . . . . .                       | 1         | 1        | —          | —          |                              |
| Nasenpolyp, exstipiert . . . . .                                                                    | 1         | 1        | —          | —          |                              |
| Cysten am Hals, labium majus, excidiert                                                             | 3         | 3        | —          | —          |                              |
| Kröpfe (4 knotig-parenchymatöse 1/2 seit.<br>reseziert, 7 Adenome u. Cysten enucleiert)             | 11        | 11       | —          | —          |                              |
| Polythytoma mammarum (1 amputat.<br>mamm.) . . . . .                                                | 1         | 1        | —          | —          |                              |
| Adenofibroma Mammae (enucleiert), da-<br>runter 1 Mann . . . . .                                    | 3         | 3        | —          | —          |                              |
| Mastdarmpolyp, Abtragung . . . . .                                                                  | 1         | 1        | —          | —          |                              |
| Papillom der Blase (Abtragung nach<br>Sectio alta . . . . .                                         | 1         | 1        | —          | —          |                              |
| Zusammen                                                                                            | 106       | 67       | 32         | 7          |                              |
| <b>VI. Tuberkulose.</b>                                                                             |           |          |            |            |                              |
| Multiple Weichteiltuberkulose, geschabt u.                                                          | 3         | 2        | 1          | —          |                              |
| Lupus im Gesicht, Excision u. Trans-<br>plantation . . . . .                                        | 1         | 1        | —          | —          |                              |
| Weiche Hauttub. an Gesicht u Hals, ge-<br>schabt . . . . .                                          | 2         | 1        | 1          | —          |                              |
| Tuberkulose<br>der inneren Nase, geschabt . . . . .                                                 | 1         | —        | 1          | —          |                              |

|                                                                                                                                                                   | Zusammen. | Geheilt. | Ungeheilt.      | Gestorben. | Bemerkungen.                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|--------------------------------|
| der Halswirbel, Extension (1 mit Absceßincision) . . . . .                                                                                                        | 3         | 3        | —               | —          |                                |
| der Halslymphdrüsen, Excision . . . . .                                                                                                                           | 23        | 23       | —               | —          |                                |
| der Achsellymphdrüsen, Excision . . . . .                                                                                                                         | 3         | 3        | —               | —          |                                |
| der Rückenwirbel, Gipskorsett . . . . .                                                                                                                           | 3         | 1        | 2               | —          |                                |
| der Rückenwirbel, m. Absceß, Jodoforminj.                                                                                                                         | 1         | 1        | —               | —          |                                |
| der Rückenwirbel, mit spast. Lähmung<br>der Beine, Gypsbett . . . . .                                                                                             | 3         | 1        | 2               | —          |                                |
| der Rippen, des Brustbeins (partielle<br>Resektion) . . . . .                                                                                                     | 2         | 2        | —               | —          |                                |
| der Hüftkreuzbeinfuge, Gipschose . . . . .                                                                                                                        | 1         | 1        | —               | —          |                                |
| des Darmbeins, Erw., partielle Resektion                                                                                                                          | 1         | 1        | —               | —          |                                |
| des Bauchfelles, Kinder, Laparotomie                                                                                                                              | 2         | —        | 2*              | —          | *) gebessert.                  |
| des Blinddarms mit Stenose, Resektion,<br>Darmnaht . . . . .                                                                                                      | 1         | —        | —               | 1*         | *) Organverfettg.              |
| des Nebenhodens, Oblatio testis . . . . .                                                                                                                         | 1         | 1        | —               | —          |                                |
| der Ulna, Schabung . . . . .                                                                                                                                      | 1         | 1        | —               | —          |                                |
| des Handgelenks, Erwachsene (1 mit<br>Fisteln total reseziert, 2 ohne Fisteln<br>conj. mit Jodoforminjekt. beh.) . . . . .                                        | 3         | 3        | —               | —          |                                |
| der Handsehnencheiden (2 Streck-, 2<br>Beuges.), Erw., gespalten u. excidirt                                                                                      | 4         | 4*       | —               | —          | *) mit sehr guter<br>Funktion. |
| der Fingerringen (Kinder), geschabt . . . . .                                                                                                                     | 2         | 2        | —               | —          |                                |
| des Hüftgelenks (2 Erw., 16 Kinder),<br>ohne Fisteln, conj. beh. in Heilung=<br>apparaten und Gipsgehverbänden, die<br>Abscesse mit Jodoforminjektionen . . . . . | 18        | 3        | 14 <sup>o</sup> | 1*         | *) an Halsdiphth.              |
| des Hüftgelenks, mit Fisteln, Kinder,<br>2 geschabt, 1 reseziert (geheilt) . . . . .                                                                              | 3         | 1        | 2 <sup>o</sup>  | —          | <sup>o</sup> ) noch in Beh.    |
| des Kniegelenks, Reiskörperhydrops,<br>Erw., Punktion, Carbolwaschung, Jo=<br>doforminjektion . . . . .                                                           | 1         | 1        | —               | —          |                                |
| des Kniegelenks, Erw., 2 resez., 2 amput.*                                                                                                                        | 4         | 3        | —               | 1*         | *) allgem. Tub.                |
| des Kniegelenks, Kinder, 1 mit Fistel,<br>geschabt u. eingegipst, geheilt; 9 ohne<br>Fisteln mit Jodoforminjektionen und<br>Gipsverbänden conj. beh. . . . .      | 10        | 3        | 7 <sup>o</sup>  | —          | <sup>o</sup> ) noch in Beh.    |
| des äußeren Knöchels, Erw., partielle<br>Resektion des Fußgel. . . . .                                                                                            | 1         | 1        | —               | —          |                                |
| des Calcaneus, partiell reseziert . . . . .                                                                                                                       | 1         | 1        | —               | —          |                                |
| des I Mittelfußknochens (1 Erw., Ab=<br>tragung der großen Zehe, 1 Kind,<br>Schabung) . . . . .                                                                   | 2         | 2        | —               | —          |                                |
| der Fußwurzel Erwachsene, Tarsectomia<br>anterior mit seitl. Längsschnitten oder<br>dorsalem Lappenschnitt . . . . .                                              | 6         | 5        | 1*              | —          | *) lebte Op. ab.               |
| des Fußes bei best. Lungenphthise, Pirogoff                                                                                                                       | 3         | 3        | —               | —          |                                |
| Zusammen                                                                                                                                                          | 110       | 74       | 33              | 3          |                                |

|                                                                                                                                                  | Zusammen. | Geheilt. | Ungeheilt. | Verstorben. | Bemerkungen.               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-------------|----------------------------|
| <b>VII. Akute Eiterungen und Entzündungen.</b>                                                                                                   |           |          |            |             |                            |
| Vereiterung der Stirnhöhle (Abtragung der vorderen Wand und Ausschabung der Schleimhaut)                                                         | 1         | 1        | —          | —           |                            |
| Vereiterung der Obertieferhöhle (breite Aufmeißelung am Alveolarrand)                                                                            | 4         | 4        | —          | —           |                            |
| Vereiterung der Brusthöhle nach Pneumonie (eröffnet mit Rippenresektion, z. T. Berthes'sche Saugpumpe)                                           | 9         | 8        | —          | 1*          | *) Lungenabscesse.         |
| Vereiterung der Lunge, verlegt                                                                                                                   | 1         | —        | 1          | —           |                            |
| Vereiterung der Schädelhöhle (epiduraler otitischer Absceß, aufgemeißelt durch Herrn Dr. Panje)                                                  | 1         | 1        | —          | —           |                            |
| Vereiterung des Kniegelenks (Incision, Drain.)                                                                                                   | 2         | 2        | —          | —           |                            |
| Lymphdrüsen- und Zellgewebsvereiterung am Halse und in der Leiste                                                                                | 6         | 6        | —          | —           |                            |
| Vereiterung des Hämatom an Brust u. Rücken; Incision                                                                                             | 2         | 2        | —          | —           |                            |
| Sehnenscheidenvereiterung an Hand und Vorderarm                                                                                                  | 2         | 2        | —          | —           |                            |
| Schwere Zellgewebsvereiterungen an Hand, Arm, Fuß u. Oberschenkel, Incisionen                                                                    | 8         | 7        | —          | 1o          | *) Greis an Nephritis.     |
| Zellgewebsvereiterung in Sepsis, Schüttelfrösten u. Delirium tremens (1 im Schultergelenk exarticuliert u. geheilt, 1 im Oberschenkel amputiert) | 2         | 1        | —          | 1           |                            |
| Zellgewebsvereiterung in d. Darmbeinrinne und in d. Umgebung d. Niere; Incisionen                                                                | 3         | 3*       | —          | —           | *) 1 mit Fistel.           |
| Weichteilvereiterung in der Tiefe der Wange, Incisionen                                                                                          | 2         | 2        | —          | —           |                            |
| Furunkulosis an Gesicht, Nacken, Achselhöhle, Unterschenkel, Incisionen                                                                          | 5         | 5        | —          | —           |                            |
| Fisteln nach Empyem, nach Nephrektomie etc., Thorakoplastik, Fadenausichabung etc.                                                               | 3         | 1        | 2          | —           |                            |
| Narbengeschwür am Unterschenkel, Excision, Plastik                                                                                               | 1         | 1        | —          | —           |                            |
| Ulcera cruris, Transplantationen                                                                                                                 | 2         | 2        | —          | —           |                            |
| Leichte Entzündung u. Eiterungen an den Füßen (Ruhe, Priehniß, Incisionen)                                                                       | 4         | 3        | 1*         | —           | *) wegen Psochose verlegt. |
| Zusammen                                                                                                                                         | 58        | 51       | 4          | 3           |                            |
| <b>VIII. Verschiedenes.</b>                                                                                                                      |           |          |            |             |                            |
| Kleines Hämatom der Unterlippe (excidiert)                                                                                                       | 1         | 1        | —          | —           |                            |
| Blutung nach Cauterisation der Tonsillen (Hämophilie)                                                                                            | 1         | 1        | —          | —           |                            |
| Blutung aus geplatzten Krampfadern                                                                                                               | 2         | 2        | —          | —           |                            |

|                                                                                                                                 | Zusammen. | Geheilt. | Ungeheilt. | Gestorben. | Bemerkungen.               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|----------------------------|
| Varicen am Unterschenkel (Excision mit Resektion der Saphena) . . . . .                                                         | 4         | 4        | —          | —          |                            |
| Thrombose der Schenkelvene . . . . .                                                                                            | 1         | 1        | —          | —          |                            |
| Narben-Neuralgie nach Trauma am N. supraorbitalis, in Laparotomienarbe (Excision) . . . . .                                     | 2         | 1        | 1*         | —          | *) Ergebnis unbekannt.     |
| Hautgummata (Jodkali) . . . . .                                                                                                 | 1         | —        | 1*         | —          |                            |
| Muskelgumma am Oberschenkel (Excision) . . . . .                                                                                | 1         | 1        | —          | —          |                            |
| Quet. Narbe in der Speiseröhre (ösophagoscopisch festgestellt*) . . . . .                                                       | 1         | —        | 1          | —          | *) Dr. Kelling.            |
| Struma asphyxie (Tracheotomie) . . . . .                                                                                        | 1         | 1        | —          | —          |                            |
| Zur Beobachtung (auf andere Stat. verlegt)                                                                                      | 6         | —        | 6          | —          |                            |
| Berniciöse Anaemie mit Hämatomen (verlegt) . . . . .                                                                            | 1         | —        | 1          | —          |                            |
| Pustula maligna am Vorderarm (indiff. beh.) . . . . .                                                                           | 4         | 3        | —          | 1*         | *) intestinaler Milzbrand. |
| Milzbrandähnlicher Schorf mit Bläschenfranz u. Ödem am Vorderarm . . . . .                                                      | 1         | 1        | —          | —          |                            |
| Ödem der Hand nach Trauma (Massage, Suspension) . . . . .                                                                       | 1         | 1        | —          | —          |                            |
| Chron. Eczema . . . . .                                                                                                         | 1         | —        | 1          | —          |                            |
| Tendovaginitis crepitans am Vorderarm . . . . .                                                                                 | 1         | 1        | —          | —          |                            |
| Kinderslähmung des Armes . . . . .                                                                                              | 1         | —        | 1          | —          |                            |
| Gangrän d. gr. Zehe (wegen Psychose entl.) . . . . .                                                                            | 1         | —        | 1          | —          |                            |
| Akroparaesthesie der Zehen mit Malum perforans podis. . . . .                                                                   | 1         | —        | 1          | —          |                            |
| Conischer Amputationsstumpf (Resektion fibulae) . . . . .                                                                       | 1         | 1        | —          | —          |                            |
| Zur Entfernung einer Drahtnaht a. d. Unterkiefer . . . . .                                                                      | 1         | 1        | —          | —          |                            |
| Probeexcision u. mikrosk. Untersuchung einer Supraclaviculardrüse nach Mammaphantomatose vor 2 Jahren (kein Carcinom) . . . . . | 1         | 1        | —          | —          |                            |
| Zum Verbandwechsel . . . . .                                                                                                    | 4         | —        | —          | —          |                            |
| Zusammen                                                                                                                        | 40        | 21       | 14         | 1          |                            |
| Demnach wurden im 1898 behandelt:                                                                                               |           |          |            |            |                            |
| Bestand am 1. Januar . . . . .                                                                                                  | 50        | 36       | 12         | 2          |                            |
| Verletzungen . . . . .                                                                                                          | 77        | 67       | 2          | 8          |                            |
| Mißbildungen u. Verkrümmungen . . . . .                                                                                         | 59        | 52       | 7          | —          |                            |
| Krankheiten der Knochen und Gelenke . . . . .                                                                                   | 35        | 26       | 9          | —          |                            |
| Krankheiten der Eingeweide . . . . .                                                                                            | 119       | 92       | 16         | 11         |                            |
| Geschwülste . . . . .                                                                                                           | 106       | 67       | 32         | 7          |                            |
| Tuberculose . . . . .                                                                                                           | 110       | 74       | 33         | 3          |                            |
| Akute Eiterungen und Entzündungen . . . . .                                                                                     | 58        | 51       | 4          | 3          |                            |
| Verschiedenes . . . . .                                                                                                         | 40        | 21       | 14         | 1          |                            |
| Zusammen                                                                                                                        | 654       | 486      | 129        | 35         |                            |

## IV. Chirurgische Poliklinik.

Bearbeitet von Dr. Müller.

### I. Angeborene Mißbildungen:

Nasenscharten 3; Wolfsrachen 1; Gaumenspalten 2 (2 Schwestern); Meningoencephalocele 1; Atresia ani 1 (sämmtlich zur Operation aufgenommen); Atresia hymenialis 1 (Perforation); Atresia meatus auditorii externi 1 (nihil); Syndactylie 3 (2 geringgradig, 1 zur Operation aufgenommen). Angeblich zu kurze Zungenbändchen 5; Hypospadië 3 (geringgradig, nihil); Habituelles congenit. Opiostomus 1; Überzähliger Nagel 1 (Extraction); Defekt beider Radii u. Daumen 1; Congenitale Contracturen u. Spasmen 2 (z. T. Tenotomie); Klumpfuß 17; Spitzfuß 3 (beide tenotomiert u. mit Gipsverbänden in 3—4 Monaten geheilt); Plattfuß 2; Congenitale Hüftgelenksluxationen 16. (Mit Ausnahme von 2 Kindern, das eine einseitig, 8 Jahre alt, schlechter Schenkelkopf, kurzer Hals, das zweite doppelseitig, 3 Jahre alt, ebenfalls mit schlechtem Schenkelkopf u. -hals, gelang es sämtliche unblutig nach Lorenz einzurichten. Zusammen 64.

### II. Erworbene Verkrümmungen, Versteifungen, Entstellungen:

Schießhals 1 (Operation verschoben); Skoliose 35 (rhachitische 31, habituelle 4, z. T. Myopischer Geradhalter, bei merkbarer Zunahme Filz-, Celluloid- oder Gipskorset); Platter Rücken 2 (Gymnastik); Versteifte Gelenke nach Traumen 7 (Massage); Schiefgeheilte Frakturen 4 (1 zur Operation aufgenommen); Bäckerbeine 6 (z. T. steife Außenschienel); Rhachitische Unterschenkel 6 (2 mal Osteoklaste, in übrigen Fällen expectativ); Plattfüße 6 (Sohleneinlagen); Coxa vara 1; Spitz- u. Klumpfüße an gelähmten Gliedern 9; desgl. Contracturen 3 (1 Erwachsener zur Operation aufgenommen, Kinder tenotomiert u. z. T. mit Heßingsandale an Schenkel-schienel mit gehemmtem Fußcharnier versehen). Zusammen 80.

### III. Verletzungen:

Wunden der verschiedensten Art incl. 4 größerer Arterienunterbindungen 307; Fremdkörper 36; Knochenbrüche 51 (Nase 2, Schlüsselbein 2, Oberarm 4, Ellenbogen 1, Condyl. humeri int. 4, Vorderarm 10, Radius 19, Oberschenkel bei Kindern 3, Rippen 3, Metacarpalknochen 1. Muskelzerreißung 2; Verrenkungen 12 (Schulter 8, Ellenbogen 4); Verstauchungen 23; Quetschungen 36; Verbrennungen 15. Zusammen 480.

### IV. Eiterungen und deren Folgen:

des Zellgewebes 23, der Finger und Zehen 57, der Sehnen-scheiden und Schleimbeutel 5, des Knochenmarks 3, der Lymphdrüsen 4, der Brustdrüse 1, der Brusthöhle 4 (Aufnahme), der Oberkieferhöhle 8, der Stirnhöhle 3, des Mittelohrs 3, der Tonsillen 2, der Zunge 1, Zahneiterung und Fisteln 7, vereiterte Hämatome 2, Furunkel 30. Zusammen 153.

- V. Geschwülste:**  
 Carcinome 39 (Unterlippe 2, Wange 2, Zunge 1, Stirn 1, Oesophagus 4, Magen 8, Mastdarm 8, Larynx 1, Mamma 8, Vulva 2). Sarkome 14; Fibrome 3; Cyst- u. Fibroadenomata mammae 4; Myome 3; Amputationsneurom 1; Lipome 6; Atherome u. Dermoidcysten 13; Angiome 15; Warzen u. Mäler 9; Nasenpolypen 5; Papillome 2; Granulome 2; Strumen 15; hypertrophische Tonsillen und Rachenmandeln 19; unbestimmt 5.  
 Zusammen 155.
- VI. Tuberkulose:**  
 Haut 6; Weichteile 3; Sehnnenscheiden 4; Lymphdrüsen 20 (fast alle zur Exstirpation aufgenommen); Gelenke 59 — Schulter 1; Ellenbogen 4; Hand 5; Hüfte 22; Knie 18; Fuß 8; Symphyse sacroiliaca 1 (z. T. zur Operation aufgenommen, z. T. mit fixierenden Verbänden mit oder ohne Jodoformglycerininjektion beh.) — Knochen 59 — Sternum 2; Rippen 5; Zehen 1; Finger 6; Unterarm 2; Nase 1 (reseziert oder geschabt); Wirbel 42; (Gipsbette oder Gipskorsette, z. T. mit Juremast, bei Abscessen Punktion u. Jodoformglycerininjektion). Tuberkulöse Abscesse 3. Zusammen 154.
- VII. Syphilis:**  
 Geschwüre 4; Defekt im harten Gaumen 1 (Uranoplastik); Narben im Rectum 1; Gummata 5.  
 Zusammen 11.
- VIII. Krankheiten der Eingeweide:**  
 Unterleibsbrüche 30 (bei kleinen Bruchbänder, sonst Aufnahme zur Radicaloperation); Phimose 17; Paraphimose 3 (teils blutig, teils unblutig erweitert, bezüg. reponiert); Hydrocelen 13 (bei kleinen Kindern expectativ, bei größeren Punktion u. Jodinjektion); Cystitis 6 (Blasenpülungen); Retentio urinae infolge Prostatahypertrophie 3 (Katheterismus); Blasensteine 2 (Aufnahme); Rectovaginalfistel 1; Strikturen 1; Speichelfistel 1. Leiden weiblicher Sexualorgane 8 (der gynäkologischen Poliklinik überwiesen); Fistula ani 8, Fissura ani 1; Hämorrhoiden 2; Appendicitis 7 (Aufnahme).  
 Zusammen 105.
- IX. Hautkrankheiten:**  
 Eczem 41; Pemphigus 1; Multiformes Exanthem 1; Intertrigo 1; Herpes tonsurans 1; Herpes zoster 2; Neurotische Hautatrophie 1; Ulcera curis 19; Unguis incarnatus 15; Onychogryphosis 1; Hautparasiten 3.  
 Zusammen 86.
- X. Verschiedene Knochen- und Gelenkrankheiten:**  
 Osteomyelitis 17 (alle aufgenommen); Erythrasmen 4; lockerer Semilunarknorpel 1; Ganglien 5; Sehnnenscheidenhygrome 6; chronischer Hydarthros 7; chronischer Gelenkrheumatismus 18, postgonorrhöische Gelenkaffektionen 3; Malum coxae senile 1; Schlottergelenk 1; Hallux valgus 2; Arthropathie tabetique 1; Dupuytren'sche Contractur 1; Periostitiden 7.  
 Zusammen 74.
- XI. Verschiedenes:**  
 Entzündungen der Lymphgefäße, Schleimbeutel, Sehnnenscheiden und des Zellgewebes ohne Eiterung 40; Narbenbeschwerden 5; Fremdkörper in Nase, Ohr, Rachen und Speiseröhre (1 mal Oesophagotomie) 15; Rhachitis 4; Zahnleiden inkl. Zahnextraktionen 208; Varicen 7 (1 geplakete); Nasenbluten 3; nicht spezifische Krankheiten des Mundes und der Zunge 5; Pustulae malignae 4 (Aufnahme); Vergiftungen 1; Nerven- u. Geistes-

krankheiten 10; zur Vorstellung 25; zur Nachbehandlung 48; zur Begutachtung 14; zur Untersuchung 6; ohne Befund 18; diverse innre Krankheiten 53 (innren Station bezügl. Poliklinik überwiesen); diverse gynäkologische Fälle 11 (gynäkol. Abteilung überwiesen); diverse Ohren-, Nasen- und Kehlkopffälle 6 (Dr. Panje überwiesen).

Zusammen 483.

Summa Summarum 1805.

## V. Operationsbericht.

Bearbeitet von Dr. Reinhard.

|                                                                                                                                                                        | Zusammen. | Gebett. | Ungebett. | Gestorben. | Bemerkungen.                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------------------------------|
| <b>I. Operationen wegen Verletzung.</b>                                                                                                                                |           |         |           |            |                                   |
| Sehennahrt durchschnittener Finger- und Hohlhandsehnen . . . . .                                                                                                       | 5         | 5       | —         | —          |                                   |
| Unterbindung der Arteria radialis . . . . .                                                                                                                            | 3         | 3       | —         | —          |                                   |
| Nervennahrt (n. medianus) . . . . .                                                                                                                                    | 1         | 1       | —         | —          |                                   |
| Entfernung von Fremdkörpern aus: Nase (Beere), Ohr (Maiskorn), Fuß, Hand, Unterarm . . . . .                                                                           | 24        | 24*     | —         | —          | *) 1 nach Röntgen Durchleuchtung. |
| Versorgung von Rißquettschwunden: Zehen 1, Kopf 1, Unterschenkel . . . . .                                                                                             | 3         | 3       | —         | —          |                                   |
| Komplizierte Impressionsfraktur des l. Schläfenbeins: Ausmeißeln d. Splitter . . . . .                                                                                 | 1         | 1       | —         | —          |                                   |
| Injizierte Lochfraktur des r. Scheitelbeins: Entfernen d. Bruchstücke . . . . .                                                                                        | 1         | —       | —         | 1          | Tod an Leptomeningitis.           |
| Komplizierte Comminutivfraktur des l. Stirn- und Scheitelbeins: Entfernung der losen Knochenstücke und eines epiduralen Haematoms, Glätten des Knochenrandes . . . . . | 1         | 1       | —         | —          |                                   |
| Ober- und Unterkieferfraktur, Naht des Unterkiefers . . . . .                                                                                                          | 1         | 1       | —         | —          |                                   |
| Komplizierte Vorderarmfraktur mit schwerer Weichteilverletzung, Wundversorgung . . . . .                                                                               | 1         | —       | —         | 1          | Tod an Tetanus Injekt. v. Serum.  |
| Schußverletzung: Schädelchuß * . . . . .                                                                                                                               | 1         | 1       | —         | —          | *) sec. Splittersentfernung.      |
| Entfernen von Geschossen: Aus Hand 1, aus der Stirn 1 . . . . .                                                                                                        | 2         | 2       | —         | —          |                                   |
| Weichteilwunden an der Stirn, Revision primärer Naht . . . . .                                                                                                         | 1         | 1       | —         | —          |                                   |
| Zusammen                                                                                                                                                               | 45        | 43      | —         | 2          |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                         | Zusammen. | Geheilt. | Ungeheilt. | Gestorben. | Bemerkungen.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|--------------------|
| <b>II. Amputationen.</b>                                                                                                                                                                                                |           |          |            |            |                    |
| a) Wegen Verletzung:                                                                                                                                                                                                    |           |          |            |            |                    |
| Zehne wegen Quetschung . . . . .                                                                                                                                                                                        | 1         | 1        | —          | —          |                    |
| b) Wegen Krankheit:                                                                                                                                                                                                     |           |          |            |            |                    |
| Zehen: 1 wegen Sarkom, 1 wegen Tuberkulose . . . . .                                                                                                                                                                    | 2         | 2        | —          | —          |                    |
| Pirogoff wegen Tuberkulose d. Mittelfußes nach Syme wegen Tuberkulose . . . . .                                                                                                                                         | 3         | 3        | —          | —          |                    |
| Oberschenkel wegen Tuberkulose des Kniegelenks . . . . .                                                                                                                                                                | 1         | 1        | —          | —          |                    |
| Oberarm* wegen ausgedehnter Phlegmone . . . . .                                                                                                                                                                         | 4         | 3        | —          | 1*         | *) allg. Tuberkul. |
|                                                                                                                                                                                                                         | 1         | 1        | —          | —          | *) exartikuliert.  |
| Zusammen                                                                                                                                                                                                                | 12        | 11       | —          | 1          |                    |
| <b>III. Plastische Operationen.</b>                                                                                                                                                                                     |           |          |            |            |                    |
| Gesichtschonoperationen . . . . .                                                                                                                                                                                       | 2         | 2        | —          | —          |                    |
| Lippenplastik nach Exstirpation von Cancroiden 1, nach Tuberkulose 1 . . . . .                                                                                                                                          | 3         | 3        | —          | —          |                    |
| Lidplastik nach Excision von Cancroiden 2, naevus vasculos. 1 . . . . .                                                                                                                                                 | 3         | 3        | —          | —          |                    |
| Gaumendefekt (luetisch) . . . . .                                                                                                                                                                                       | 1         | 1        | —          | —          |                    |
| Gaumenpaltooperationen . . . . .                                                                                                                                                                                        | 3         | 3        | —          | —          |                    |
| Syndactylie: Trennung des Daumens und der Finger, Lappenbildung . . . . .                                                                                                                                               | 1         | 1        | —          | —          |                    |
| Nasenplastik nach Excision eines Cancroids . . . . .                                                                                                                                                                    | 1         | 1        | —          | —          |                    |
| Beschluß der Knochenhöhle nach Necrotomie durch Hautmuskelperiostlappen . . . . .                                                                                                                                       | 2         | 2        | —          | —          |                    |
| Beschluß eines Defektes am Schädeldach nach Fraktur durch Hautperiostknochenlappen . . . . .                                                                                                                            | 1         | 1        | —          | —          |                    |
| Hautverpflanzung nach Thiersch zum Beschluß großer Hautlücken: nach Entfernung von Geschwülsten an der Brust 5, nach Verbrennungen 1, nach Entfernung von Geschwülsten Stirn, Kopf 2, nach Phlegmone am Arm 1 . . . . . | 9         | 9        | —          | —          |                    |
| Thorakoplastik nach Empyem u. Rippenresektion . . . . .                                                                                                                                                                 | 2         | 2        | —          | —          |                    |
| Zusammen                                                                                                                                                                                                                | 28        | 28       | —          | —          |                    |
| <b>IV. Orthopädische Operationen.</b>                                                                                                                                                                                   |           |          |            |            |                    |
| Schiefhals, offene Durchschneidung des Kopfnickers . . . . .                                                                                                                                                            | 1         | 1        | —          | —          |                    |
| Osteoklaste, rhachit. Unterschenkel 2, Oberschenkel nach schlecht geheilter Fractur 1, desgleichen Unterschenkel 2 . . . . .                                                                                            | 5         | 5        | —          | —          |                    |



|                                                                                                                                                                                                                | Zusammen. | Geheilt. | Ungeheilt.     | Gestorben. | Bemerkungen.                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|------------|---------------------------------|
| Osteotomie wegen schief geheilter Ober-<br>schentelfraktur 1, wegen winkliger Ankylose<br>des Knie 1 . . . . .                                                                                                 | 2         | 2        | —              | —          |                                 |
| Tenotomie der Achillessehne wegen neu-<br>rotischer Muskelatrophie 2 beiderseitig,<br>wegen spastischen Spitzfuß 1, wegen<br>Klumpfuß 3, wegen paralyt. Klumpfuß<br>6 (beiderf.), wegen selt. adductus 1 . . . | 13        | 13       | —              | —          |                                 |
| Subcutane Spaltung der fascia lata<br>wegen Abductionscontractur nach Ein-<br>richtung einer congenitalen Hüfte . . .                                                                                          | 1         | 1        | —              | —          |                                 |
| Talus exstirpation wegen paralytischen<br>Klumpfußes (Erwachsener) . . . . .                                                                                                                                   | 1         | 1        | —              | —          |                                 |
| Einrenkung angeborener Hüftluxation<br>unblutig nach Lorenz (4 Fälle doppelseitig)                                                                                                                             | 22        | 17*      | 5 <sup>o</sup> | —          | *) 4 n. vorn trans-<br>poniert. |
| Korrektur einer Abductionscontractur<br>nach Rheumatismus im Lorenz'schen<br>Redresseur . . . . .                                                                                                              | 1         | 1        | —              | —          | o) noch in Beh.                 |
| Sehnentransplant. n. Vulpini wegen<br>pes varo equinus (w. paralyt. Klumpfuß)                                                                                                                                  | 2         | 1        | 1*             | —          | *) geheilt.                     |
| Zusammen                                                                                                                                                                                                       | 48        | 42       | 6              | —          |                                 |

#### V. Gelenkoperationen.

|                                                                                                                                                         |    |     |    |   |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|---|----------------------------------|
| Einrichtung von Luxationen: Daumen<br>1, Schultergelenk (2 subcoracoideal, 2<br>infraglenoidales) 4 . . . . .                                           | 5  | 5   | —  | — |                                  |
| Exarticulationen: Finger 4 (1 über-<br>zähliger, 3 wegen Quetschung), Zehe 1<br>(wegen hallux valgus) humeri 1 (wegen<br>brandiger Phlegmone) . . . . . | 6  | 6   | —  | — |                                  |
| Incision und Drainage des Kniegelenks<br>bei eitriger Entzündung . . . . .                                                                              | 2  | 2   | —  | — |                                  |
| Punktion und Auswaschen (3% Carb-<br>lösung) des Kniegelenks wegen serösen<br>9, wegen eitrigem Ergusses 2 . . . . .                                    | 11 | 11  | —  | — |                                  |
| Iodoforminjektion in tuberculöse Ge-<br>lenke: Handgelenk 15, Knie (Kinder) 6,<br>Hüftgelenk 5, Ellbogengelenk 3, Finger-<br>gelenke 5 . . . . .        | 34 | 34* | —  | — | *) zum Teil noch<br>in Behandlg. |
| Gelenkrejektionen:                                                                                                                                      |    |     |    |   |                                  |
| Schultergelenk 1 (wegen fractura colli) . .                                                                                                             | 1  | 1   | —  | — |                                  |
| Ellenbogen (wegen Tuberkulose) . . . .                                                                                                                  | 1  | —   | 1* | — | *) in Behandlg.                  |
| Handgelenk (wegen Tuberkulose) . . . .                                                                                                                  | 2  | 2   | —  | — |                                  |
| Hüftgelenk (wegen Osteomyelitis 4, Tu-<br>berkulose 1) . . . . .                                                                                        | 5  | 3   | 2* | — | *) in Behandlg.                  |
| Kniegelenk (wegen Tuberkulose) . . . .                                                                                                                  | 3  | 2   | 1* | — | *) in Behandlg.                  |
| Fußgelenke (partiell 3, Tarsectomia ant.<br>3, wegen Tuberkulose) . . . . .                                                                             | 6  | 6   | —  | — |                                  |

|                                                                                                                                                                    | Zusammen. | Gebett. | Ungeheilt. | Gestorben.     | Bemerkungen.                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Wiederholte Schabungen:<br>Kniegelenk 3, Hüftgelenk 4, Fußgelenk<br>2, Ellbogen 1 . . . . .                                                                        | 10        | 8       | 1*         | 1 <sup>o</sup> | *) in Behandlg.<br><sup>o</sup> Tod an sept.<br>Diphtherie. |
| Entfernung eines abgesprengt. Knochen-<br>stückes am Os cranium . . . . .                                                                                          | 1         | 1       | —          | —              |                                                             |
| Zusammen                                                                                                                                                           | 87        | 81      | 5          | 1              |                                                             |
| <b>VI. Knochenoperationen.</b>                                                                                                                                     |           |         |            |                |                                                             |
| Eröffnung der Stirnhöhle* wegen Empyem                                                                                                                             | 2         | 2       | —          | —              | *) Rejektion der<br>vorder. Wand.                           |
| Eröffnung der Oberkieferhöhle wegen Em-<br>pyem . . . . .                                                                                                          | 5         | 5       | —          | —              |                                                             |
| Eröffnen der Mittelohrräume vom Warzen-<br>fortsatz her wegen Mittelohreiterung 1,<br>wegen extraduralen Abscesses 1 . . . . .                                     | 2         | 2*      | —          | —              | *) Dr. Banse.                                               |
| Zahnoperationen in Narchose . . . . .                                                                                                                              | 6         | 6       | —          | —              |                                                             |
| Rippenresektionen:<br>a) wegen Empyems . . . . .                                                                                                                   | 8         | 7       | —          | 1*             | *) mult. Lungen-<br>abscesse.                               |
| b) wegen Tuberculose . . . . .                                                                                                                                     | 2         | 2       | —          | —              |                                                             |
| Aufmeißelung und Schabung tuberculöser<br>Knochen, Becken 3, Schläfenbein 1,<br>Unterkiefer 1, Rippen 6, Brustbein 1,<br>Mittelfuß 3, Finger und Zehen 6 . . . . . | 21        | 18      | 3*         | —              | *) in Behandlg.                                             |
| Nekrotomie: Unterkiefer 1, Ellbogen 1,<br>Schlüsselbein 1, Rippe 1, Hinterhaupt-<br>schuppe 1, Oberarm 2, Oberschenkel 3,<br>Unterschenkel 17 . . . . .            | 27        | 26      | 1*         | —              | *) in Behandlg.                                             |
| Schabung osteomyelitischer Knochenfisteln:<br>Femur 4, Finger 2 . . . . .                                                                                          | 6         | 5       | 1*         | —              | *) in Behandlg.                                             |
| Abtragen freiliegender Knochen:<br>Finger (Amputationsstumpf) 1, Fibula<br>Ende (im Amputat. Stumpf) 1 . . . . .                                                   | 2         | 2       | —          | —              |                                                             |
| Abmeißelungen: ankylos. Patella 1,<br>Exostose femur 1, Zehen 2, Ober-<br>kiefer 1, Calcaneus 1 . . . . .                                                          | 6         | 6       | —          | —              |                                                             |
| Aufmeißeln der tibia wegen ostitis defor-<br>mans 1, wegen Sclerose . . . . .                                                                                      | 2         | 2       | —          | —              |                                                             |
| Aufmeißeln und Ausräumen des canal.<br>mandibular. wegen trigeminus neuralgie                                                                                      | 1         | 1       | —          | —              |                                                             |
| Halbseitige Unterkieferresektion wegen<br>Carcinom der Kieferschleimhaut . . . . .                                                                                 | 1         | 1       | —          | —              |                                                             |
| Zusammen:                                                                                                                                                          | 91        | 85      | 5          | 1              |                                                             |
| <b>VII. Operationen wegen Eiterung.</b>                                                                                                                            |           |         |            |                |                                                             |
| Lymphdrüseneiterung: Hals 6, Achselhöhle<br>5, Leistengegend 2 . . . . .                                                                                           | 13        | 13      | —          | —              |                                                             |
| Brustdrüseneiterung . . . . .                                                                                                                                      | 2         | 2       | —          | —              |                                                             |

|                                                                                                                                       | Zusammen. | Geheilt. | Ungeheilt. | Gestorben. | Bemerkungen.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|---------------|
| Phlegmone, lange Incisionen: Unterarm 2, Brust 1, Unterschenkel 2, Hand 3 .                                                           | 8         | 7        | —          | 1*         | *) Pneumonie. |
| Abscesse: Spaltung, Incision:                                                                                                         |           |          |            |            |               |
| a) posterysipelatische: Knöchel 1, Hals 1                                                                                             | 2         | 2        | —          | —          |               |
| b) osteomyelitische: femur 2, Hüfte 2                                                                                                 | 4         | 4        | —          | —          |               |
| c) multiple Furunkel . . . . .                                                                                                        | 3         | 3        | —          | —          |               |
| d) vereitertes Haematom . . . . .                                                                                                     | 2         | 2        | —          | —          |               |
| e) Schleimbeutelentzündung (Knie) . . . . .                                                                                           | 2         | 2        | —          | —          |               |
| f) Sonstige Abscesse . . . . .                                                                                                        | 28        | 28       | —          | —          |               |
| Scrotalabszess nach Gonorrhoe . . . . .                                                                                               | 1         | 1        | —          | —          |               |
| Abscesspunktion und Jodoforminjektion wegen Tuberculose: Rücken 15, Psoasabszess 2, Lendengegend 6, femur und fascia lata 1 . . . . . | 24        | 24       | —          | —          |               |
| Entfernung von Nähten und Ligaturen aus Wunden . . . . .                                                                              | 3         | 3        | —          | —          |               |
| Eröffnung eines perinephritischen Abszesses (Drainage) . . . . .                                                                      | 1         | 1        | —          | —          |               |
| Panaritium: subcutan 6, tendinos. 3 . . . . .                                                                                         | 9         | 9        | —          | —          |               |
| Chronische seröse Sehnencheidenentzündung Incision, Jodoforminjektion . . . . .                                                       | 1         | 1        | —          | —          |               |
| Bereitete Calcaneusfraktur, lange Incisionen . . . . .                                                                                | 1         | —        | —          | 1*         | *) Lepsis.    |
| Nagelbetteiterung: Incision u. Excision des Nagelbettes . . . . .                                                                     | 14        | 14       | —          | —          |               |
| Zusammen                                                                                                                              | 118       | 116      | —          | 2          |               |

### VIII. Geschwulstoperationen.

#### Carcinom:

Exstirpation: Wange 1, Präputium mit Ausräumung der Leistenröhren 1, Lippe mit Halsdrüsen-ausräumung 1, Mamma, Recidiv 2, 1 mit Resektion d. ven. jugularia, Kopfhaut 1, Vulvae 1

Excision von Cancroiden: Alfus rodens Wange mit Halsdrüsen-ausräumung 1, Nase 2 . . . . .

Carcinom der Schläfengegend: Excision Ausmeißelung der tabula externa, Transplantation . . . . .

Carcinom des Oberkiefers, Resektion . . . . .

Exenteratio orbitae und Plastik wegen Cancroid der Lider . . . . .

Excision eines wegen periurethraler Infektion inoperablen Carcinoma vulvae . . . . .

Amputatio mammae:

typisch mit Achseldrüsen-ausräumung, . . . . .

7

7

—

—

3

3

—

—

1

1

—

—

1

—

1

—

1

1

—

—

1

—

1

—

12

12

—

—

|                                                                                                                          | Zusammen. | Geheilt. | Ungeheilt. | Gestorben. | Bemerkungen. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|--------------|
| mit temp. Durchsägung des Schlüsselbeins . . . . .                                                                       | 1         | 1        | —          | —          |              |
| Amputatio mammae wegen Cystadenom                                                                                        | 2         | 2        | —          | —          |              |
| Adenoma mammae Ausschälen . . . . .                                                                                      | 2         | 2        | —          | —          |              |
| Angiome: Schläfe 2, Schulter 1, Stirn 1, Wange 1, Nase 1, labii maj. vulvae 1, Recidive 2, (8 extirpiert, 1 cauterisirt) | 9         | 9        | —          | —          |              |
| Lymphangiom: Schulter, Excision . . . . .                                                                                | 1         | 1        | —          | —          |              |
| Lipome: Schulter, Arm, Nacken je 1 multiple 2 . . . . .                                                                  | 5         | 5        | —          | —          |              |
| Angiosarkom: Vorderarm, Excirpation                                                                                      | 1         | 1        | —          | —          |              |
| Sarkom: Oberkiefer (Eputis) 3, Unterkiefer und Masseter, Recidiv 1 Operat. 93 1 . . . . .                                | 4         | 4        | —          | —          |              |
| Cysten: Oberkiefer 1, Excision; lab. min. vulvae 1, Dermoidcysten: Kopf 1, Orbitalrand 1, Excirpation . . . . .          | 4         | 4        | —          | —          |              |
| Atherome: Excirpation: Wange 6, Hals 2, Nacken 1, Mittelfinger 1, Multiple 1                                             | 11        | 11       | —          | —          |              |
| Granulationsgeschwülste; Unterlippe 1, Hals 1, Nabel 1, Hohlhand 1, Excirpation . . . . .                                | 4         | 4        | —          | —          |              |
| Struma:                                                                                                                  |           |          |            |            |              |
| Ausschälen von Adenomen u. Cysten halbseitige Resektion. . . . .                                                         | 8         | 8        | —          | —          |              |
| Amputat. mammae weg. chron. Mastit. 6 6 . . . . .                                                                        | 6         | 6        | —          | —          |              |
| Chron. mastitis, Excirpation . . . . .                                                                                   | 2         | 2        | —          | —          |              |
| Naevi: Excision . . . . .                                                                                                | 1         | 1        | —          | —          |              |
|                                                                                                                          | 6         | 6        | —          | —          |              |
| Zusammen                                                                                                                 | 92        | 90       | 2          | —          |              |
| <b>IX. Operationen an den Eingeweiden.</b>                                                                               |           |          |            |            |              |
| Tonsillotomie . . . . .                                                                                                  | 8         | 8        | —          | —          |              |
| Schabung adenoider Vegetationen im Nasenrachenraum (Gottstein) . . . . .                                                 | 6         | 6        | —          | —          |              |
| Rhinofissur wegen Schleimpolypen 1, wegen Carcinom . . . . .                                                             | 2         | 2        | —          | —          |              |
| Tracheotomie: nach tentamen suicid. 1, wegen Trachealstenose 2 (1 Struma, 1 laryngcar.) . . . . .                        | 3         | 3        | —          | —          |              |
| Ausräumung tuberculöser Halsdrüsen                                                                                       | 25        | 25       | —          | —          |              |
| Ausräumung tuberculöser supraclavicul. Drüsen . . . . .                                                                  | 2         | 2        | —          | —          |              |
| Ausräumung tuberculöser Achseldrüsen . . . . .                                                                           | 5         | 5        | —          | —          |              |
| Drüsen ausräumung wegen Carcinom: Leistendrüsen 2, Schlüsselbeingrube 1, Achsel 1, Unterkiefer und Hals 3 . . . . .      | 7         | 7        | —          | —          |              |
| Drüsenexcirpation wegen chron. Entzündung: Nacken 1, Achseldrüsen 1 . . . . .                                            | 2         | 2        | —          | —          |              |

|                                                                                                                                                                                                                                 | Zusammen. | Geheilt. | Ungeheilt. | Gestorben. | Bemerkungen.                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eröffnung der Leibeshöhle:</b>                                                                                                                                                                                               |           |          |            |            |                                                                              |
| Zu Operationen wegen Gallensteinen<br>Choledochotomie 2; Cysticotomie 1;<br>Cholecystectomy 1 . . . . .                                                                                                                         | 4         | 4        | —          | —          |                                                                              |
| Zur Entfernung des Wurmfortsatzes . . . . .                                                                                                                                                                                     | 12        | 12       | —          | —          |                                                                              |
| Zur Anlegung einer Magensistel nach<br>Marwedel bei hochsig. Speiseröhren-<br>krebs . . . . .                                                                                                                                   | 1         | 1        | —          | —          |                                                                              |
| Zur Gastroenterostomie wegen Pylorus-<br>krebs . . . . .                                                                                                                                                                        | 4         | 2        | —          | 2*         | *) 1 Tod an Lun-<br>genabscessen.<br>1 Tod an In-<br>anition.                |
| wegen chron. ulcus ventriculi . . . . .                                                                                                                                                                                         | 3         | 3        | —          | —          |                                                                              |
| Zur Bildung einer Enteroanastomose<br>mit Murphyknopf wegen Ileus 2;<br>nach Anlegen eines anus praeternat.<br>bei gangr. Hernie 3 . . . . .                                                                                    | 6         | 1        | 1**        | 4*         | *) 2 Peritonitis +<br>1 Thrombose beid.<br>art. femoral. +<br>**) in Behdlg. |
| Zur Vorlagerung des perforierten Darms<br>bei gangr. hernia obturat. perforat. 1,<br>bei gangr. Nabelhernie 1, Leisten-<br>hernie 1 . . . . .                                                                                   | 3         | 1        | —          | 2*         | *) Tod Peritonit.                                                            |
| Zur Resektion des Colon 1 und Resektion<br>tuberculös. Coecum 1, danach seitliche<br>Apposition nach v. Frey . . . . .                                                                                                          | 2         | 1        | —          | 1*         | *) Peritonitis.                                                              |
| Zur Anlegung eines künstlichen Afters<br>wegen Ileus durch Colocarcin. 1,<br>bei incarcer. Schenkelhernie 1 . . . . .                                                                                                           | 2         | 2        | —          | —          |                                                                              |
| Zur Resektion eines Colocarcinoms und<br>Anlegung circulärer Darmnaht . . . . .                                                                                                                                                 | 1         | 1        | —          | —          |                                                                              |
| Wegen Perforationsperitonitis in einen<br>rechtsseit. inguinalen Bruchsad, Spalten<br>der Bruchpforte, Amputation des per-<br>forierten Wurmfortsatzes; Tamponade<br>der Bauchhöhle . . . . .                                   | 1         | 1        | —          | —          |                                                                              |
| Zur Colotomie wegen Ileus 2, wegen<br>Rectumcarcinom 5 . . . . .                                                                                                                                                                | 7         | 3        | —          | 4*         | *) 2w. Cachexie<br>2 „ Peritonitis                                           |
| Zur Operation nach Talma (Einnähen<br>von Netz und Milz in die Bauchhaut)<br>bei Lebercirrhose . . . . .                                                                                                                        | 1         | 1*       | —          | —          | *) Später Tod auf<br>der inn. Abt.                                           |
| Zu Probelaparotomien bei Bauchfell-<br>tuberculose 1, diffus. Bauchfelldcarinose<br>2, wegen Carcinom des Pankreas-<br>kopfes 1, zur Probeexcision bei Gallert-<br>carcinom und Ablassen von Ascitis 1,<br>Hysterie 1 . . . . . | 6         | 5        | —          | 1*         | *) Krebscachexie.                                                            |
| <b>Bruchoperationen:</b>                                                                                                                                                                                                        |           |          |            |            |                                                                              |
| Radikaloperation von Leistenbrüchen nach<br>Bassini . . . . .                                                                                                                                                                   | 11        | 11*      | —          | —          | *) 1 Fall v. vesico-<br>cele urinaria.                                       |
| nach Woelfler . . . . .                                                                                                                                                                                                         | 1         | 1        | —          | —          |                                                                              |
| Radikaloperation von Schenkelbrüchen . . . . .                                                                                                                                                                                  | 6         | 5        | 1*         | —          | *) in Behdlg.                                                                |
| Radikaloperation von Nabelhernien . . . . .                                                                                                                                                                                     | 2         | 2        | —          | —          |                                                                              |

|                                                                                                               | Zusammen. | Geheilt. | Ungeheilt. | Gestorben. | Bemerkungen.                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|------------------------------------|
| <b>Bruchoperationen:</b>                                                                                      |           |          |            |            |                                    |
| der linea Alba, Radikaloperation . . .                                                                        | 1         | 1        | —          | —          |                                    |
| Eröffnung entzündeter leerer Schenkel-<br>bruchsäcke, Radikaloperation . . .                                  | 2         | 2        | —          | —          |                                    |
| Bauchneßbruch, Radikaloperation . . .                                                                         | 1         | —        | —          | 1*         | *) Tod an Sepsis<br>u. Stomatitis. |
| Eröffnung des wegen Rektumkrebs<br>herausgelagerten Darms . . . . .                                           | 1         | 1        | —          | —          |                                    |
| Abtragen des vorgelagerten Kolons<br>(wegen Rektumkrebs) . . . . .                                            | 1         | 1        | —          | —          |                                    |
| Anlegen der Darmscheere . . . . .                                                                             | 2         | 2        | —          | —          |                                    |
| Schluß eines anus praeternat. durch Naht                                                                      | 1         | 1        | —          | —          |                                    |
| Amputation des Mastdarms wegen<br>Carcinom . . . . .                                                          | 3         | 3        | —          | —          |                                    |
| Mastdarmfisteloperation . . . . .                                                                             | 11        | 11       | —          | —          |                                    |
| Retrovaginale Fisteloperation . . .                                                                           | 1         | —        | 1          | —          |                                    |
| Dehnung b. fissura ani . . . . .                                                                              | 2         | 2        | —          | —          |                                    |
| Atresia ani: Eröffnung des Rektum,<br>Besäumen der Schleimhaut . . . . .                                      | 1         | —        | 1          | —          |                                    |
| Haemorrhoidalknoten, Abbrennen<br>auf Flügelzange . . . . .                                                   | 10        | 10       | —          | —          |                                    |
| Sectio alta wegen Blasenpapillom,<br>Blasennaht . . . . .                                                     | 1         | 1        | —          | —          |                                    |
| Sectio alta zum Verschließen einer großen<br>Blasenscheidenfistel nach Trendelenburg                          | 2         | —        | 2*         | —          | *) in Heilung.                     |
| Echinococcus, Einnähen der Cyste in<br>die Bauchdecken 1, Spalten der Cyste 1,<br>2. Cyste eröffnet . . . . . | 3         | 3        | —          | —          |                                    |
| Nierenexstirpation wegen Tuberkulose                                                                          | 1         | 1        | —          | —          |                                    |
| Nierenschnitt wegen Steinen . . . . .                                                                         | 1         | 1        | —          | —          |                                    |
| Nephrorrhaphie wegen Wanderniere                                                                              | 4         | 4        | —          | —          |                                    |
| Ablatio testis wegen Tuberkulose . . .                                                                        | 1         | 1        | —          | —          |                                    |
| Phimose: stumpfe Dehnung 5, Spaltung 3                                                                        | 8         | 8        | —          | —          |                                    |
| Wasserbruch, punktiert 6, Radikal-<br>operation nach v. Bergmann 2, nach<br>Volkman 1 . . . . .               | 9         | 9        | —          | —          |                                    |
| Zusammen                                                                                                      | 200       | 179      | 6          | 15         |                                    |
| <b>X. Operationen an den Blutgefäßen.</b>                                                                     |           |          |            |            |                                    |
| Krampfadern: Exstirpation und Ex-<br>stirpation der vena saphena . . . . .                                    | 3         | 3        | —          | —          |                                    |
| Zusammen                                                                                                      | 3         | 3        | —          | —          |                                    |
| <b>XI. Verschiedene Operationen.</b>                                                                          |           |          |            |            |                                    |
| Ganglionexstirpation: Hand . . . . .                                                                          | 4         | 4        | —          | —          |                                    |
| Sehnenscheidentuberkulose: Hand,<br>Excision . . . . .                                                        | 4         | 4        | —          | —          |                                    |

|                                                                                                   | Zusammen. | Geheilt. | Ungeheilt. | Gestorben. | Bemerkungen.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|----------------|
| Syngromexstirpation: Hand 1, Zungenbein 1, im präpatellar. Schleimbeutel 1                        | 3         | 3        | —          | —          |                |
| Amputationsneurom am Unterarm, Resektion von 15 cm d. nerv. median.                               | 1         | 1        | —          | —          |                |
| Neuralgie d. nerv. supraorbital, Injekt. von Uberosmiumsäure 1 . . . . .                          | 1         | 1        | —          | —          |                |
| Druckempfindliche Narbe am Daumen excidiert . . . . .                                             | 1         | 1        | —          | —          |                |
| Fistelverschluß: Mundhöhlenfistel durch Naht, Parotidfistel durch Kauterisation                   | 2         | 2        | —          | —          |                |
| Weichteiltuberkulose: Schabung, Abtragung: Fuß 5, Arm 2, Hals 2, Kniekehle 1, Gesicht 5 . . . . . | 15        | 13       | 2*         | —          | *) in Behandl. |
| Epigastrischer Fettbruch, excirpiert                                                              | 1         | 1        | —          | —          |                |
| Ulceracruisluetica und Fußwurzel-eiterung, Incision . . . . .                                     | 1         | 1        | —          | —          |                |
| Meningocele der Hinterhauptshuppe*                                                                | 1         | 1        | —          | —          | *) Abtragung.  |
| Lithotripsie: 5 Sitzungen . . . . .                                                               | 1         | 1        | —          | —          |                |
| Cystoscopie b. Nierenblutung . . . . .                                                            | 1         | 1        | —          | —          |                |
| Injektion von Tetanusserum . . . . .                                                              | 1         | —        | —          | 1          |                |
| Hühnerauge excirpiert . . . . .                                                                   | 1         | 1        | —          | —          |                |
| Nagelextraktionen . . . . .                                                                       | 4         | 4        | —          | —          |                |
| Zusammen                                                                                          | 42        | 39       | 2          | 1          |                |
| Es wurden demnach ausgeführt:                                                                     |           |          |            |            |                |
| Operationen wegen Verletzung . . . . .                                                            | 45        | 43       | —          | 2          |                |
| Amputationen . . . . .                                                                            | 12        | 11       | —          | 1          |                |
| Plastische Operationen . . . . .                                                                  | 28        | 28       | —          | —          |                |
| Orthopädische Operationen . . . . .                                                               | 48        | 42       | 6          | —          |                |
| Gelenkoperationen . . . . .                                                                       | 87        | 81       | 5          | 1          |                |
| Knochenoperationen . . . . .                                                                      | 91        | 85       | 5          | 1          |                |
| Operationen wegen Eiterung . . . . .                                                              | 118       | 116      | —          | 2          |                |
| Geschwulstoperationen . . . . .                                                                   | 92        | 90       | 2          | —          |                |
| Operationen an den Eingeweiden . . . . .                                                          | 200       | 179      | 6          | 15         |                |
| Operationen an den Blutgefäßen . . . . .                                                          | 3         | 3        | —          | —          |                |
| Verschiedene Operationen . . . . .                                                                | 42        | 39       | 1          | 1          |                |
| Zusammen                                                                                          | 766       | 717      | 26         | 23         |                |

## VI. Gynäkologische Abteilung.

Von Dr. Münchmeyer.

Am 1. Januar 1898 waren 5 Kranke auf der Abteilung; aufgenommen wurden im Laufe des Jahres 179, sodaß die Gesamtzahl der Kranken sich auf 184 belief. Von diesen wurden 149 geheilt, 10 gebessert und 3 ungeheilt entlassen, 6 auf andere Stationen verlegt, 12 starben und 4 blieben am Ende des Jahres auf der Abteilung zurück.

Die Abteilung stand bis zum 1. Mai unter Leitung von Hofrat Dr. Osterloh, dann übernahm dieselbe Dr. Münchmeyer. In der Zeit vom 1. Januar bis 1. Mai wurden von größeren Operationen ausgeführt 5 Ovariotomien, 3 Myomotomien, 1 Exstirpation eines extrauterinen Fruchtsackes und 2 Kolporrhaphien. 3 Kranke starben, 2 an Peritonitis nach Myomotomie, 1 an dem der Aufnahme folgenden Tage an allgemeiner Peritonitis infolge eines incarcerirten graviden Uterus.

Vom 1. Mai bis 31. Dezember starben 9 Kranke. Eine wurde, wegen Scheidenvorfall der Anstalt überwiesen, sterbend auf die Station gebracht, eine starb infolge allgemeiner Peritonitis, hervorgerufen durch den Durchbruch eines mit dem Rectum kommunizierenden von einem Ovarialcarcinom ausgehenden jauchigen Abscesses, eine an Embolie der Pulmonalarterie nach Probelaaparotomie wegen Carcinoma ovarii, eine an kroupöser Pneumonie nach Myomotomie, eine an incompletem Slez nach doppelseitiger Tubektomie (bei der Sektion fand sich keine Peritonitis), die 4 übrigen an Peritonitis nach Lapparotomie. Bei der einen war bei der Ovariotomie eine Darmschlinge verletzt und genäht worden, nach 3 tägigem guten Verlauf verließ die Kranke in einem unbewachten Moment das Bett und starb nach wenigen Stunden unter dem Bilde ganz akuter Peritonitis; bei der Sektion fand sich an der Stelle der Darmnaht ein eitriger Belag und beginnende allgemeine Peritonitis. Der zweite Fall betraf eine Frau mit Phosalping, welche bei der Operation platzte; die Bauchhöhle wurde drainiert, doch trat eine septische Peritonitis ein. Die beiden letzten Todesfälle ereigneten sich nach Myomotomie, von denen die eine schnell und gut verlaufen war, die andre durch eine tief im Douglas verwachsene Phosalping kompliziert wurde. Dieselbe platzte bei der Operation, es wurde allseitig mit Jodoformgaze drainiert und der Stumpf extraperitoneal versorgt; bei der Sektion fand sich an zwei Stellen des Darmes beginnende Gangrän, dort, wo die Gazetamponade ge-



legen hatte, und an einer an oder unter dem Schlauch gelegenen Schlinge.


Über die Erkrankungen der 179 Neuaufgenommenen, sowie über die bei denselben ausgeführten operativen Eingriffe geben die beiden folgenden Tabellen Auskunft.

### Erkrankungen:

|                                                                 | Zahl der Fälle. | Geheilt.   | Gehebert. | Ungeheilt.     | Gestorben.     | Bemerkungen.                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Angebor. Atresia vaginae . . . . .                              | 1               | 1          | —         | —              | —              |                                                    |
| Hymen imperforat. . . . .                                       | 1               | 1          | —         | —              | —              |                                                    |
| Vaginismus . . . . .                                            | 1               | 1          | —         | —              | —              |                                                    |
| Bartholinitis . . . . .                                         | 2               | 2          | —         | —              | —              |                                                    |
| Ruptura perinaei completa . . . . .                             | 1               | 1          | —         | —              | —              |                                                    |
| Cystitis . . . . .                                              | 1*              | —          | —         | —              | —              | *) noch in Behdlg.                                 |
| Fistula vesico-vaginalis . . . . .                              | 2               | 1          | —         | 1*             | —              | *) auf die chirurg. Station.                       |
| Fistula recto-vaginalis . . . . .                               | 1               | 1          | —         | —              | —              |                                                    |
| Einklebung eines Pessars in die Vagina                          | 1               | 1          | —         | —              | —              |                                                    |
| Descensus et prolapsus uteri et vaginae                         | 17              | 16         | —         | —              | 1*             | *) sterb. eingebr.                                 |
| Bulnus vaginae . . . . .                                        | 1               | 1          | —         | —              | —              |                                                    |
| Carcinoma vaginae (Recidiv nach<br>Totalerstirpation) . . . . . | 1               | 1          | —         | —              | —              |                                                    |
| Stenosis canalis cervicalis . . . . .                           | 3               | 3          | —         | —              | —              |                                                    |
| Ectropium . . . . .                                             | 1               | 1          | —         | —              | —              |                                                    |
| Metritis u. Endometritis . . . . .                              | 37*             | 36         | —         | —              | —              | *) noch in Beh.                                    |
| Endometritis tubercul. . . . .                                  | 1*              | —          | —         | —              | —              | *) noch in Beh.                                    |
| Anteflexio Dysmenorrhoe . . . . .                               | 1               | 1          | —         | —              | —              |                                                    |
| Retroslexio . . . . .                                           | 16*             | 14         | —         | 1 <sup>o</sup> | —              | *) noch in Beh.<br>*) auf d. inn. Stat.            |
| Myoma uteri . . . . .                                           | 13              | 8          | —         | —              | 5*             | *) 1 an Pneumon.,<br>4 an Peritonit.               |
| Carcinoma uteri . . . . .                                       | 9               | 1          | 8         | —              | —              |                                                    |
| Störungen d. Gravidität . . . . .                               | 3               | 3          | —         | —              | —              |                                                    |
| Abort u. Abortreste . . . . .                                   | 15              | 14         | —         | 1*             | —              | *) i. d. K. Frauen-<br>klinik.                     |
| Incarceratio uteri gravidi . . . . .                            | 1               | —          | —         | —              | 1*             | *) an Peritonitis.                                 |
| Graviditas tubaria . . . . .                                    | 7               | 7          | —         | —              | —              |                                                    |
| Salpingitis. Pyosalpinx . . . . .                               | 8               | 6          | —         | —              | 2*             | *) 1 an Pleus, 1<br>an Peritonitis.                |
| Dophoritis . . . . .                                            | 3               | 3          | —         | —              | —              |                                                    |
| Kystoma ovarii . . . . .                                        | 7               | 6          | —         | —              | 1*             | *) an Peritonitis.                                 |
| Dermoid d. ovarium . . . . .                                    | 1               | 1          | —         | —              | —              |                                                    |
| Carcinoma ovarii . . . . .                                      | 3               | 1          | —         | 1              | 1*             | *) a. Lungenembol.<br>*) auf Wunsch.               |
| Entzündung des Beckenbindegewebes                               | 10              | 8          | —         | 1*             | 1 <sup>o</sup> | *) Durchbruch n. d.<br>Bauchhöhle.<br>Peritonitis. |
| Carcinosis universalis peritonaei . . . . .                     | 1               | —          | —         | 1              | —              | *) auf die innere<br>Station.                      |
| Pancreaschste . . . . .                                         | 1               | 1          | —         | —              | —              |                                                    |
| Carcinoma ventriculi . . . . .                                  | 2               | —          | —         | 2*             | —              | *) auf die chirurg.<br>Station.                    |
| Hernia ventralis . . . . .                                      | 2               | 1          | —         | 1*             | —              | *) auf die chirurg.<br>Station.                    |
| Sepsis puerperalis . . . . .                                    | 1               | 1          | —         | —              | —              |                                                    |
| Abscess auf d. Darmbeinschaufel . . . . .                       | 1               | 1          | —         | —              | —              |                                                    |
| Hysterie . . . . .                                              | 2               | 2          | —         | —              | —              |                                                    |
| <b>Zusammen</b>                                                 | <b>179</b>      | <b>146</b> | <b>8</b>  | <b>9</b>       | <b>12</b>      | *) 4 noch in Beh.                                  |

## Operationen.

|                                                         | Zahl der Fälle. | Gebellt.   | Gebessert. | Ungeheilt. | Gestorben. | Bemerkungen.                        |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| Incisio hymenis . . . . .                               | 2               | 2          | —          | —          | —          |                                     |
| Excisio hymenis . . . . .                               | 2               | 2          | —          | —          | —          |                                     |
| Exstirpatio glandul. Bartholin. . . . .                 | 2               | 2          | —          | —          | —          |                                     |
| Perinaeoplastik . . . . .                               | 1               | 1          | —          | —          | —          |                                     |
| Operation d. Blasenscheidenfistel . . . . .             | 2               | 1          | —          | 1*         | —          | *) auf die chirurg. Station.        |
| Operation d. Mastdarmscheidenfistel . . . . .           | 1               | 1          | —          | —          | —          |                                     |
| Prolapsoperationen . . . . .                            | 12              | 12         | —          | —          | —          |                                     |
| Scheidennaht . . . . .                                  | 1               | 1          | —          | —          | —          |                                     |
| Exstirpation eines Carcinomrecidivs d. Vagina . . . . . | 1               | 1          | —          | —          | —          |                                     |
| Discission . . . . .                                    | 4               | 4          | —          | —          | —          |                                     |
| Abrasio mucosae . . . . .                               | 41*             | 39         | —          | —          | —          | *) 2 noch in Beh.                   |
| Keilexcision a. d. Portio . . . . .                     | 3               | 3          | —          | —          | —          |                                     |
| Emmet'sche Operation . . . . .                          | 2               | 2          | —          | —          | —          |                                     |
| Ausräumung von Aborten . . . . .                        | 6               | 6          | —          | —          | —          |                                     |
| Excochleation inoperabler Uteruscarcinome . . . . .     | 8               | —          | 8          | —          | —          |                                     |
| Ventrosixation . . . . .                                | 4               | 4          | —          | —          | —          |                                     |
| Operation n. Alexander-Rocher . . . . .                 | 2*              | 1          | —          | —          | —          | *) 1 noch in Beh.                   |
| Baginale Totalexstirpation:                             |                 |            |            |            |            |                                     |
| a) wegen Carcinom . . . . .                             | 1*              | 1          | —          | —          | —          | *) kombiniert mit Laparotomie.      |
| b) " Myom . . . . .                                     | 3               | 3          | —          | —          | —          |                                     |
| Myomotomie . . . . .                                    | 9               | 4          | —          | —          | 5*         | *) 1 an Pneumon., 4 an Peritonitis. |
| Ovariectomie . . . . .                                  | 10              | 8          | —          | —          | 2*         | *) 1 an Lungenembolie, 1 Periton.   |
| Tubectomie . . . . .                                    | 6               | 4          | —          | —          | 2*         | *) 1 an Pleus, 1 an Peritonitis.    |
| Exstirpation extrauteriner Fruchtsäcke . . . . .        | 7               | 7          | —          | —          | —          |                                     |
| Exstirpation einer Pankreaszyste . . . . .              | 1               | 1          | —          | —          | —          |                                     |
| Probelaaparotomie . . . . .                             | 4               | 3          | —          | —          | 1*         | *) durch gebroch. jauchig. Abscess. |
| Operation der Bauchhernie . . . . .                     | 1               | 1          | —          | —          | —          |                                     |
| Incision parametrit. Exsudate . . . . .                 | 3               | 3          | —          | —          | —          |                                     |
| <b>Zusammen</b>                                         | <b>139</b>      | <b>117</b> | <b>8</b>   | <b>1</b>   | <b>10</b>  | <b>3 noch in Beh.</b>               |



## VII. Bericht über die Poliklinik für Frauenkrankheiten.

Von Dr. Münchmeyer.

Dieselbe wurde bis zum 1. Mai von Hofrat Dr. Osterloh, von dann ab von Dr. Münchmeyer jeden Dienstag nachmittags von 3—4 Uhr unter Assistenz der Hilfsärzte der gynäkologischen Station abgehalten. 357 Kranke suchten in der genannten Zeit ärztliche Hilfe, und wurde ihnen dieselbe in 48 Sprechstunden und insgesamt 738 Untersuchungen und Beratungen zu teil. Von den 357 Kranken besuchten die Poliklinik einmal 165, zweimal 100, dreimal 45, viermal 16, fünfmal 17, sechsmal 6 und mehr wie sechs= bis zwölfmal 8.

Als Erkrankungen wurden in das Journal eingetragen:

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Innere Erkrankungen . . . . .                       | 13  |
| Chirurgische Erkrankungen . . . . .                 | 5   |
| Anaemie, Chlorose und deren Folgezustände . . . . . | 10  |
| Störungen der Gravidität, normale Gravidität        |     |
| Aborte . . . . .                                    | 26  |
| Erkrankungen der Vulva . . . . .                    | 5   |
| Erkrankungen der Blase . . . . .                    | 2   |
| Descensus und Prolapsus der Scheide u. d. Uterus    | 147 |
| Deviationen des Uterus . . . . .                    | 59  |
| Endometritis und Metritis . . . . .                 | 40  |
| Oophoritis und Salpingitis . . . . .                | 11  |
| Parametritis . . . . .                              | 13  |
| Carcinoma uteri . . . . .                           | 8   |
| Myoma uteri . . . . .                               | 4   |
| Erkrankungen d. Mamma . . . . .                     | 2   |
| Enteroptose . . . . .                               | 4   |
| Vorstellung nach Operationen . . . . .              | 8   |

357.

## VIII. Abteilung für Augenkranke.

Oberstabsarzt Dr. Heymann.

## 1. Übersicht über die behandelten Krankheitsfälle.

| Krankheitsname.                                        | Bestand am<br>1. Jan. 1898. | Zugang<br>im Jahre. | Summa.     | Abgang     |                 |                 | Verlegt. | Bestand am<br>31. Dez. 1898. | Bemerkungen.                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
|                                                        |                             |                     |            | Geheilt.   | Ge-<br>bessert. | Un-<br>geheilt. |          |                              |                               |
| Krankheiten der Lider . . . . .                        | —                           | 10                  | 10         | 8          | 2               | —               | —        | —                            |                               |
| Krankheiten der Thränen-<br>wege . . . . .             | 1                           | 5                   | 6          | 3          | 2               | —               | —        | 1                            |                               |
| Krankheiten der Muskeln                                | —                           | 9                   | 9          | 6          | 2               | 1               | —        | —                            |                               |
| Krankheiten der Binde-<br>haut . . . . .               | 1                           | 6                   | 7          | 2          | 3               | —               | —        | 2                            |                               |
| Strophulöse Binde- und<br>Hornhautentzündung . . . . . | 1                           | 47                  | 48         | 40         | 5               | —               | 2        | 1                            |                               |
| Gutartiges Hornhaut-<br>geschwür . . . . .             | —                           | 11                  | 11         | 9          | 1               | —               | 1        | —                            |                               |
| Bösartiges Hornhaut-<br>geschwür . . . . .             | —                           | 12                  | 12         | 7          | 3               | —               | —        | 2                            |                               |
| Parenchymatöse Horn-<br>hautentzündung . . . . .       | 2                           | 6                   | 8          | 4          | 4               | —               | —        | —                            |                               |
| Anderer Hornhautkrank-<br>heiten . . . . .             | —                           | 6                   | 6          | 3          | 3*              | —               | —        | —                            | *) 1 a. Wunsch<br>vorz. entl. |
| Lederhautentzündung . . . . .                          | 1                           | —                   | 1          | 1          | —               | —               | —        | —                            |                               |
| Regenbogenhautentzün-<br>dung . . . . .                | —                           | 11                  | 11         | 6          | 4               | 1               | —        | —                            |                               |
| Niederhaut-, Netzhaut- und<br>Sehnervenerkrankungen    | 2                           | 14                  | 16         | 4          | 7               | 4*              | —        | 1                            | *) 1 a. Wunsch<br>vorz. entl. |
| Höchstgrad. Kurzsichtigkeit                            | —                           | 2                   | 2          | 2          | —               | —               | —        | —                            |                               |
| Altersstaar . . . . .                                  | —                           | 21                  | 21         | 19         | 1               | 1*              | —        | —                            | *) nicht oper.                |
| Wundstaar . . . . .                                    | —                           | 7                   | 7          | 3          | 3               | 1               | —        | —                            |                               |
| Schichtstaar . . . . .                                 | —                           | 7                   | 7          | 3          | 4*              | —               | —        | —                            | *) Vor beend.<br>Aufs. entl.  |
| Nachstaar . . . . .                                    | 1                           | 8                   | 9          | 5          | 3               | 1               | —        | —                            |                               |
| Grüner Staar . . . . .                                 | 1                           | 11                  | 12         | 5          | 5               | 1*              | —        | 1                            | *) Operation<br>verweigert.   |
| Schwund des Augapfels                                  | 1                           | —                   | 1          | 1*         | —               | —               | —        | —                            | *) Durch<br>Enucleation.      |
| Trigenimusneuralgie . . . . .                          | —                           | 1                   | 1          | —          | 1               | —               | —        | —                            |                               |
| Schwere Verletzungen,<br>Verbrennungen u. . . . .      | 2                           | 15                  | 17         | 11         | 4               | 2               | —        | —                            |                               |
| Zur Begutachtung . . . . .                             | —                           | 9                   | 9          | —          | —               | 9               | —        | —                            |                               |
| <b>Summa</b>                                           | <b>13</b>                   | <b>218</b>          | <b>231</b> | <b>142</b> | <b>57</b>       | <b>21</b>       | <b>3</b> | <b>8</b>                     |                               |

## 2. Poliklinik der Augenabteilung.

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Krankheiten der Lider . . . . .                                | 49  |
| Krankheiten der Thränenwege . . . . .                          | 11  |
| Krankheiten der Augenmuskeln . . . . .                         | 15  |
| Krankheiten der Bindehaut . . . . .                            | 146 |
| Skrophulöse Binde- und Hornhautentzündung . . . . .            | 80  |
| Anderere Hornhautkrankheiten . . . . .                         | 50  |
| Lederhautentzündung . . . . .                                  | 2   |
| Regenbogenhautentzündung . . . . .                             | 16  |
| Krankheiten der Aderhaut, Netzhaut und des Sehnerven . . . . . | 31  |
| Krankheiten des Linsensystems . . . . .                        | 71  |
| Grüner Staar . . . . .                                         | 8   |
| Schwund des Augapfels . . . . .                                | 2   |
| Fremdkörper der Binde- und Hornhaut . . . . .                  | 31  |
| Anderere Verletzungen . . . . .                                | 23  |
| Anophthalmus nach Enukleation . . . . .                        | 13  |
| Anomalien der Refraktion und Akkomodation . . . . .            | 236 |

Summa 784

## 3. Operationsverzeichnis.

|                                                                                                                 | Summa. | durch Herrn<br>Dr. Czuzmann<br>operiert. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| Ausschälung einer Lidcyste . . . . .                                                                            | 1      | 1                                        |
| Lidspaltenerweiterung nach Schwabe . . . . .                                                                    | 1      | 1                                        |
| Verpflanzung des Wimperbodens . . . . .                                                                         | 2      |                                          |
| Lidplastik wegen Ektropium . . . . .                                                                            | 2      | 1                                        |
| Schielopoperation . . . . .                                                                                     | 8      |                                          |
| a) Rücklagerung . . . . .                                                                                       | 7      | 2                                        |
| b) Vorlagerung . . . . .                                                                                        | 1      |                                          |
| Staphylom-Operation . . . . .                                                                                   | 1      | 1                                        |
| Sklerotomie . . . . .                                                                                           | 1      |                                          |
| Iridektomie . . . . .                                                                                           | 21     |                                          |
| a) wegen grünen Staars . . . . .                                                                                | 8      | 1                                        |
| b) zu optischen Zwecken . . . . .                                                                               | 10     |                                          |
| c) bei Verletzungen . . . . .                                                                                   | 3      |                                          |
| Diszission der Linse bei Schichtstaar, Wundstaar, Nach-<br>staar und bei hochgradiger Kurzsichtigkeit . . . . . | 22     | 1                                        |
| Extraktion der luxierten Linse . . . . .                                                                        | 1      | 1                                        |
| Extraktion des grauen Staars . . . . .                                                                          | 25     |                                          |
| a) ohne Iridektomie . . . . .                                                                                   | 6      | 2                                        |
| b) mit Iridektomie . . . . .                                                                                    | 19     | 2                                        |
| Enukleation des Augapfels . . . . .                                                                             | 10     | 3                                        |
| Ausräumung der Augenhöhle . . . . .                                                                             | 1      | 1                                        |
| Summa                                                                                                           | 96     |                                          |

Summa 96

## IX. B e d i n g u n g e n

für die

Aufnahme in das Krankenhaus der ev.-luth. Diakonissen-Anstalt  
zu Dresden.

Erwachsene und Kinder beiderlei Geschlechts, ohne Unterschied der Konfessionen, werden in das Krankenhaus der Diakonissen-Anstalt aufgenommen. Das letztere zerfällt in vier Abteilungen: eine Abteilung für innere Krankheiten (Oberarzt Med.-Rat Dr. Richard Schmalz); eine Abteilung für chirurgische Krankheiten (Oberarzt Hofrat Dr. Rupprecht); eine Abteilung für Augenkrankheiten (Oberarzt Oberstabsarzt Dr. Heymann) und eine Abteilung für Frauenkrankheiten (Oberarzt Dr. Münchmeyer). Ausgeschlossen sind Krankheitsformen, welche in die Klasse des Siechtums gehören, also weder Heilung noch wesentliche Erleichterung durch ärztliche Hilfe zulassen; ferner sind ausgeschlossen Epilepsie und Geisteskrankheiten.

Kranke, die im Krankenhause Aufnahme finden sollen, müssen zuvor angemeldet werden. Die Anmeldungen, seien sie persönlich oder schriftlich, haben in der Expedition des Krankenhauses, Holzhofgasse 29, rechts vom Eingang zu geschehen, und ist dabei ein Zeugnis über die Krankheit beizubringen bez. einzusenden. Über die Aufnahmefähigkeit entscheiden die Ärzte. Nur in ganz dringenden Fällen kann die Aufnahme ohne vorherige Anmeldung erfolgen, worüber der z. B. diensthabende Hilfsarzt entscheidet.

Die Pflegesätze für jeden Tag in dem Krankenhause sind wie folgt festgestellt:

a) für Saalfranke:

Erwachsene . . . . . Mk 2.—;

Kinder bis mit dem 14. Jahre . . . . . " 1.50;

b) für Privatfranke in Sälen bis zu 3 Betten " 6.—;

c) für Privatfranke in Einzelzimmern . . . . . " 10.—.

Der Aufnahmetag wird angerechnet, sobald die Aufnahme vor mittags 12 Uhr, der Entlassungstag, sobald die Entlassung nach mittags 12 Uhr erfolgt.

Für den Pflegesatz wird den Saalkranken die volle Verpflegung einschließlich der Medikamente und Verbände und der ärztlichen Behandlung gewährt. Für Privatfranke ist den Oberärzten die Honorarberechnung vorbehalten.

Bei der Aufnahme sind die Pflegegelder für 15 Tage voranzuzahlen und dabei eine schriftliche Erklärung bezüglich der pünktlichen Zahlung der weiteren Pflegegelder bei längerem Aufenthalt des Kranken im Krankenhause abzugeben. Diese Erklärung erstreckt sich auch auf etwa erforderlich werdenden außerordentlichen Aufwand, wie Bandagen, mechanische Hilfsmittel zc., sowie für den Todesfall auf die Berechtigung einer besonderen Vergütung, welche bei Saalkranken für Erwachsene 4 Mk., für Kinder 3 Mk. beträgt, bei Privatkranken nach der Höhe eines Tagepflegejahres berechnet wird.

Gesuche um Freistellen sind an die Krankenhaus-Verwaltung der Diakonissen-Anstalt zu richten.

Zu den Freistellen im Krankenhause der Anstalt gehören die zwölf Staatsfreistellen für Angehörige des früheren Amtshauptmannschaftsbezirks Dresden und die drei Freistellen der Meißner Kreise.

Auf den Staatsfreistellen zu Verpflegende sollen, wie alle anderen Kranken, zuvor angemeldet und muß ein ärztliches Zeugnis für sie beigebracht werden, und ist von den Heimatsgemeinden schriftlich die Erklärung abzugeben, daß sie für den Kranken den täglichen Verpflegungszuschuß von 50 Pf. zu zahlen bereit sind.

Auch bei den Meißner Freistellen ist vorherige Anmeldung der Kranken notwendig. Außerdem aber ist erforderlich: eine obrigkeitliche Bescheinigung über die Heimatsangehörigkeit des Kranken im alterbländischen Meißner Kreise, ein ärztliches Krankheitszeugnis, sowie eine Bescheinigung, daß der betreffende Kranke nicht an Ort und Stelle verpflegt werden kann, endlich ein Armutzeugnis.

## X. Ausnahme-Bedingungen

für das

### Siechenhaus Bethesda

in Niederlöbnitz bei Dresden.

Post: Kößchenbroda.

Nächste Haltestelle der Leipzig-Dresdner Eisenbahn: Weintraube.

§ 1. Das Siechenhaus Bethesda in Niederlöbnitz ist eine Filialanstalt der evang.-luth. Diakonissen-Anstalt in Dresden, in welcher Sieche, Nervenkranken, Geisteschwache, Altersschwache, Epileptische, Blöde und gebrechliche Kinder, ausnahmsweise auch Gemütskranken, Aufnahme finden. Geisteskranken und solche Blöde, bei welchen Zerstörungsmannie vorhanden ist, und die sonst ihrer Umgebung nachteilig werden können, sind von der Aufnahme aus-

geschlossen. Sollte dieser Fall während des Aufenthaltes in Bethesda bei Pflöglingen eintreten, so muß deren Entlassung vorbehalten werden. Bethesda eignet sich außerdem sehr zur Erholungsstätte für Rekonvaleszenten.

§ 2. Die Pflöglinge werden in 3 verschiedenen Häusern und die Erwachsenen in 3 nach Zimmer und Kost verschiedenen Klassen verpflegt.

#### A. Hauptgebäude.

Dasselbe besteht aus 2 Flügeln, welche durch die Kapelle verbunden sind. In demselben werden Erwachsene — Männer und Frauen — aufgenommen.

Die Männerstation hat 3 Krankensäle zu 8 bis 10 Betten, 1 Privatzimmer II. Klasse zu 3 Betten und 4 einzelne Zimmer für Privatfranke I. Klasse. Auch befindet sich daselbst ein Zimmer zum Tagesaufenthalte der Pflöglinge.

Die Frauenstation hat 8 Krankensäle zu 6 bis 10 Betten, 4 Privatzimmer II. Klasse zu 2 bis 6 Betten und 8 einzelne Zimmer für Privatfranke I. Klasse. Für Frauen, welche für kürzere Zeit einen Erholungsaufenthalt begehren, ist 1 Zimmer mit 3 Betten verfügbar. Das erste sowohl als auch das zweite Obergeschoß hat außerdem je 1 Tageszimmer, woselbst die Pflöglinge, die nicht bettlägerig sind, sich während des Tages aufhalten, lesen, sich beschäftigen und ihre Mahlzeiten einnehmen. Im Sommer können die Pflöglinge neben den 4 großen Verandas auch die Gärten Bethesdas zu freier Bewegung benutzen. Ausgänge in die Umgebung werden unter Berücksichtigung des Zustandes des Patienten mit oder ohne Begleitung gestattet.

#### B. Das Blödenhaus.

Dasselbe ist in erster Linie ein Asyl für nicht bildungsfähige Blöde. Es werden daselbst weibliche Blöde — Kinder wie Erwachsene — verpflegt und versorgt. Blöde Knaben werden nur ausnahmsweise aufgenommen und dann nur bis zum 6. Lebensjahre behalten. Die blöden Kinder werden ihrem Zustande entsprechend unterwiesen, beschäftigt und erzogen. Die Pflöglinge des Blödenhauses schlafen nach deren Alter getrennt in 4 Sälen zu 6 bis 8 Betten und 2 kleineren Zimmern zu 2 bis 3 Betten. Tagsüber sind sie in 2 Tagessälen vereinigt.

#### C. Das Kinderheim.

In demselben empfangen sieche Kinder, welche an Tuberkulose, englischer Krankheit oder sonstigen Verkrümmungen oder Verfrüppelungen leiden, dauernde Pflege (orthopädische Behandlung), Erziehung und einigen Schul- und Handfertigungsunterricht. Auch können einige erholungsbedürftige Kinder auf Zeit Aufnahme finden.



Es werden Knaben wie Mädchen vom 1. bis 16. Lebensjahre aufgenommen. Die Pfléglinge des Kinderheims können, wenn sie herangewachsen sind, in das Hauptgebäude übergehen.

Der Hauptzweck der Pflege und Erziehung im Kinderheim aber ist, die aufgenommenen Kinder womöglich zu erwerbsfähigen Menschen heranzubilden, die später in die Lehre treten oder in Dienst gehen können. Wenn es möglich ist, werden die Kinder auch konfirmiert, doch gewöhnlich, ihres körperlichen Zustandes wegen, erst im Alter von 16 Jahren.

Das Kinderheim hat 2 Schulzimmer und 3 Werkstätten, 3 Schlafsäle zu 10 bis 15 Betten, 6 Isolierzimmer, 2 Schlafsäle für erholungsbedürftige Kinder und 2 Krankenzimmer, 1 Turnsaal, 1 Speisesaal, 1 Kleinkinderzimmer. Das Kinderheim ist ausgestattet mit elektrischer Beleuchtung und Dampfniederdruckheizung und von einem großen Garten mit Spielplatz umgeben.

§ 3. Die Direktion des Siechenhauses Bethesda hat der Rektor der Diakonissen-Anstalt in Dresden, die Leitung des Hauswesens führt eine Diakonissin als Oberin. In allen Verwaltungsangelegenheiten steht das Siechenhaus unter dem Vorstand der Diakonissen-Anstalt. Die Pflege der Siechen geschieht durch Diakonissen, denen die Schülerinnen der mit Bethesda verbundenen Marienschule zur Hilfe beigegeben sind. Auf der Männerstation sind 2 Krankenwärter angestellt. Die geistliche Versorgung liegt in den Händen des 2. Pastors der Diakonissen-Anstalt mit Ausnahme des Kinderheims, welches dem 4. Pastor unterstellt ist. Die ärztliche Oberleitung haben die Oberärzte am Krankenhause der Diakonissen-Anstalt, außerdem ist ein in Niederlöbniß wohnender bewährter Arzt als Hausarzt angestellt.

§ 4. Gesuche um Aufnahme von Siechen sind an die Verwaltung des Siechenhauses Bethesda in Niederlöbniß zu richten.

In dem Aufnahmegesuch ist auch die Religion bezw. Konfession des Aufzunehmenden mit anzugeben.

§ 5. Der Pflegesatz einschließlich ärztliche Behandlung beträgt:

in der III. Klasse monatlich 42 Mk. — Pf.

" " II. " " 75 " — "

" " I. " " 120 bis 150 Mk. je nach den

gestellten Ansprüchen.

In der I. Klasse ist eine Entschädigung für das Waschen der Wäsche zu bezahlen. Bei besonderen Ansprüchen an Bedienung und Beköstigung tritt eine entsprechende Erhöhung ein.

Das Pflegegeld ist vierteljährlich an das Siechenhaus Bethesda in Niederlöbniß voraus zu zahlen.

Verläßt ein Pflégling I. oder II. Klasse die Anstalt vor Ablauf des Monats, so verbleibt das gezahlte Pflegegeld für den

Abgangsmonat in der Kasse des Hauses. Bei Saalkranken (III. Klasse) werden in diesem Falle vorausgezählte Pflegegelder mit 1 Mk. 40 Pf., 1 Mk. bzw. 80 Pf. für jeden Tag zurück-  
erstattet. Dieselben Sätze werden auch bei Aufnahme eines Siechen innerhalb eines Monats berechnet.

Für Kinder bis zum vollendeten 9. Lebensjahre beträgt das monatliche Pflegegeld 24 Mk., für Kinder vom 10. bis 14. Lebensjahre 30 Mk. monatlich.

Die Wäschebereitung ist im allgemeinen für die II. und III. Klasse in den Pflegeätzen einbegriffen. Für allen besonderen Aufwand in Bezug auf Wäsche, Kleidung, Bandagen, Stelzfüße und dergleichen haben die Pfleglinge oder deren Versorger aber selbst aufzukommen. Macht sich die zeitweise Aufnahme eines Siechen im Krankenhause der Diakonissen-Anstalt notwendig, so kann die Ergänzung zu den dortigen Pflegeätzen mit 60 Pf. bei Erwachsenen, 50 Pf. bei größeren und 70 Pf. bei kleineren Kindern besonders in Rechnung gestellt werden. Die Beerdigungskosten im Falle des Todes eines Pfleglings werden von der Anstalt nicht übernommen.

§ 6. Jeder eintretende Pflegling hat an Wäsche, Kleidung etc. Folgendes mitzubringen:

A. Für das Hauptgebäude.

Männer: 3 vollständige Anzüge, darunter einen für Sonntag, 4 Hemden, 6 Taschentücher, 4 Paar wollene und 4 Paar baumwollene Strümpfe, 4 Halstücher, 2 Kopfbedeckungen, 4 Paar Unterbekleider, 2 Paar Halbstiefel oder Halbschuhe, 1 Paar Filzschuhe, 1 Zahnbürste, 1 weiten und 1 engen Kamm, 1 Wasch-  
lappen.

Frauen: 2 Anzüge für die Woche, 1 vollständigen Anzug für den Sonntag, 4 Hemden, 4 Nachtjacken, 4 Nachthauben, 4 Schürzen, 6 Taschentücher, 4 Paar wollene und 4 Paar baumwollene Strümpfe, 6 kleine weiße Halstücher, 4 Unterröcke darunter 2 warme, 2 Paar Schuhe, 1 Paar Filzschuhe, 2 Kopftücher oder Hauben oder 1 Hut, 1 Waschlappen, 1 Zahnbürste, 1 engen und 1 weiten Kamm.

B. Für das Blödenhaus.

Erwachsene: 2 Anzüge für die Woche, 1 vollständigen Anzug für den Sonntag, 6 Hemden, 4 Nachtjacken, 6 Schürzen, 4 Paar wollene und 4 Paar baumwollene Strümpfe, 4 Unterröcke darunter 2 warme, 6 Taschentücher, 2 Paar Schuhe, 1 Paar Filzschuhe, 1 Waschlappen, 1 Zahnbürste, 1 engen und 1 weiten Kamm.

Kinder: 2 Anzüge für die Woche, 1 Anzug für den Sonntag, 6 Hemden, 6 Nachthemden, 6 Paar wollene und 6 Paar baumwollene Strümpfe, 4 Unterröcke, 6 Paar Höschen, 6 weiße Halstücher, 6 Schürzen, 6 Vorbindeläße, 6 weiße Unterlagen, 2 Paar Schuhe (Filzschuhe), 1 Waschlappen, 1 engen und 1 weiten Kamm.

### C. Für das Kinderheim.

Knaben: 3 vollständige Anzüge, 1 Winterrock, 6 Taghemden, 6 Taschentücher, 4 Paar wollene und 4 Paar baumwollene Strümpfe, 3 Paar Unterhosen, 2 Kopfbedeckungen, 2 Paar Lederschuhe, 1 Paar Filzpantoffel, 1 engen und 1 weiten Kamm, 1 Waschlappen, 1 Zahnbürste.

Mädchen: 3 Kleider, 4 Unterröcke, 2 Leibchen, 6 Hemden, 1 warme Jacke, 6 Taschentücher, 4 Paar wollene und 4 Paar baumwollene Strümpfe, 2 Paar Schuhe, 1 Paar Filzpantoffel, 1 Winterhaube, 1 Sommerhut, 1 engen und 1 weiten Kamm, 1 Waschlappen, 1 Zahnbürste.

§ 7. Nach Eingang eines Aufnahmegesuches werden von der Verwaltung Bethesda's dem Aufnahmesuchenden zugesendet:

1. Zwei Fragebogen, von denen der eine von dem bisherigen Arzt des Kranken, der andere durch die Aufnahmesuchenden oder deren Vertreter auszufüllen sind.
2. Einen Verpflichtungsschein über Zahlung des Pflegegeldes und sonstiger Verläge, bei welchem die Unterschrift von seiten der Heimatsbehörde zu beglaubigen ist.

Die beiden Fragebogen und der Verpflichtungsschein sind vor der Ankunft des Aufnahmesuchenden an die Verwaltung Bethesda's zurück zu senden. Bei Kindern ist das Taufzeugnis (Geburtschein) und der Impfschein beizulegen. An Sonn- und Feiertagen finden weder Aufnahmen noch Entlassungen von Pfleglingen statt.

§ 8. Die Angehörigen eines Pfleglings erhalten durch die Oberin von Zeit zu Zeit Nachricht über dessen Befinden. Es sind deshalb etwaige Wohnungsveränderungen der Verwaltung Bethesda's anzuzeigen.

§ 9. Nach erfolgter Aufnahme ist jeder Bewohner Bethesda's der daselbst bestehenden Hausordnung unterworfen. Besondere Kurcn und Mittel können nur mit Genehmigung des Anstaltsarztes in Anwendung gebracht werden. Der Direktion der Anstalt steht das Recht zu, Pfleglinge, die sich der Hausordnung beharrlich nicht fügen, zu entlassen.


§ 10. Außer einigen für Bethesda gestifteten, zum Teil nicht voll dotierten Freibetten, deren Besetzung entweder seitens der Stifter vorbehalten ist oder dem Rektor der Diakonissen-Anstalt zusteht, bestehen noch einige

von den Oberlausitzer Landständen,

" " Meißner Kreisständen,

" " Bezirksverbänden Dresden=Altstadt, Meissen,  
Pirna und Freiberg

auf eine Reihe von Jahren bewilligte Freibetten.



OTTO & LEHMANN  
Buchbinderei  
DRESDEN N.

ne eln!

[Faint, illegible text on a vertical strip on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

