

Phæn. V.

*adumbratum est,] nihil aquæ per fundi foramina emittit, sed pendulam gestat ac pro lubitu transfert: quo eodem modo Siphon simplex sive rectus (quem rectè vulgo einen Heber appellant, ad differentiam siphonis reflexi accommodè magis ein Gieher nuncupandi) organum cauponibus nostris usitissimum, angustioris, tam suprà quam infrà osculi ac ventris in medio laxioris, [Vid. lit. H. num. 3.] dum mersus alterâ sui extremitate vinoque onustus supernè clauditur admoto pollice, & sic in liberum aërem protrahitur, nihil vini effundit, ultrò citroque licet, prout usus postulat, delatus; & quo patet dolium etiam, supernè probè obturatum, vino vel cerevisiæ, per patulum licet inferius epistomium, exitum non concedit, prout caponum famulis & ancillis etiam est notissimum.*

Phæn. VI.

X. Quamprimum autem in hoc casu aut pollex remotus ab orificio clepsydræ vel siphonis superiore [Vid. lit. F. num. 3.] aut obturaculum dolii superum laxatum fuerit, abs quæ mora haustus antè liquor è perforato fundo aut aperto inferiùs orificio largiter profluit; admoto denuò obturamento mox iterum in ipso medio fluxu sistendus. Nec est quod quidquam hic addamus, præterquam hoc unum; quos habentus circa vulgationes liquores, aquam, cerevisiam, vinum &c. præstitit effectus clepsydra, nos etiam circa Mercurium seu argentum vivum tentasse, & eosdem deprehendisse, cum difficultate tamen aliqua; ut ex postea dicendis amplius elucescet.

XI. In his omnibus casibus quia pendulas in perforato clepsydræ fundo aquas &c. ab aëre forinsecus obnitente sustentari credebamus, vi hypotheseos infrà prolixius applicandæ; non poteramus non inde inferre: siquidem ita res habeat, necessum esse, hoc sustentaculo remoto liquorem statim effluere, ac tursum admisso iterum sisti. Nec mora, paratam ad Phænom. V. conditiones clepsydræ, h.e. obturaculo cereo clausam ac insuper vesicâ suillâ obligatam, intra-