

XIII. DE FRUTICIBUS.

138. Sambucus, Berberis, Ribes, Rubus, Idæus, Hedera, Ligustrum, Balsamum, Sabina, Siliqua (ceratium) solanum, spinosusq; Paliurus, Dumus item (sentis ac vepres) frutices cluent.

139. Arundines, Cannæ, & Junci in palustribus proveniunt.

140. Ex scirpo enodi (cui typhæ innascuntur) succiso tegetes conficiunt.

141. Boleti, Tubera, Capreolini, & Ruffuli inter fungos præstantissimi sunt.

XIII. Von Sträuchen und Stauden.

138. Der Hollunder/der Berberstrauch/ & Johannisbeerstrauch/der Brombeerstrauch/der Himbeerstrauch/ der Epheu/ die Reinweide/ der Balsam/ der Sevenbaum/ die Johannisbrodt Stauden/ der Nachtschatte/ und die stacheliche Meelbeerstaude wie auch & Dornstrauch/ werder Sträuche genennet.

139. Das Rohr/ das Schilff/ die Binsen kommen in sumpffichten ortern herfür.

140. Aus den abgeschnittenen Binsen (Sembden) ohne Knoten (darauß die Marrenkolben wachsen) macht man die Flechten/ (Zacken/ Decken.)

141. Die Pülze (die Pfifferlinge) die Morchen/ die Hirschbrunsten/ die Reißken sind unter den Kochschwämmen die besten.

XIV.