ERSTE TAFEL.

SAEUREN

besitzen einen eigenthümlichen Geschmack, färben die mehrsten blauen Pflanzenpigmente roth, und verbinden sich mit Alkalien, Erden und Metalloxyden zu Salzen.

I. IHRE MISCHUNG IST BEKANNT.

A. *Enthalten Oxygen als Bestandtheil.*

a. ERSTE GATTUNG.

Das Oxygen ist verbunden mit einem unzerlegten Stoffe.

CHARAKTERISTIK: alle diese Säuren lassen sich durch verbrennliche Körper zerlegen; sie entstehen dadurch und werden dadurch auf ihre Grundlage reducirt. Durch Verbindung der Grundlage mit Oxygen, kann man sie wieder erzeugen.

Die Grundlage Stoff.

	BESTANDTHEILE.	
Schwefelsäure (Acide sulfurique)	46, 3 Schwefel	37, 5 Oxygen.
Schwefligte Säure (Acide sulfureux)	Schwefel	Oxygen.
Salpetersäure (Acide nitrique)	25, 0 Azot	75, 0 Oxygen.
Salpetrigte Säure (Acide nitreux)	25, 0 Azot	75, 0 Oxygen.
Phosphorsäure (Acide phosphorique)	40, Phosphor	60, Oxygen.
Phosphorigte Säure (Acide phosphoreux)	30, Phosphor	70, Oxygen.
Kohlensäure (Acide carbonique)	27, 34 Kohlenstoff	72, 13 Oxygen.
Arseniksäure (Acide arsenique)	Arsenik	Oxygen.
Arsenigte Säure (Acide arsenical)	Arsenik	Oxygen.
Molybdänsäure (Acide molybdique)	Molybdän	Oxygen.
Wolframsäure (Acide tungstique)	Wolfram	Oxygen.
Chromsäure (Acide chromique)	Chromium	Oxygen.

b. ZWEITE GATTUNG.

Das Oxygen ist mit zwei unzerlegten Stoffen verbunden.

CHARAKTERISTIK: sie lassen sich durch die zur Zeit bekannten unzerlegbaren Körper nicht zerlegen, erleiden aber eine Zersetzung, wenn sie einer hohen Temperatur oder der Einwirkung des Oxygens ausgesetzt werden. Sie lassen sich auch in einer gewissen Ordnung eine in die andere verwandeln, und bestehen sämtlich aus gepaart Bestandtheilen, die durch das verschiedenartige quantitative Verhältniß die verschiedenen Säuren bilden.

	BESTANDTHEILE.
Essigsäure (Acide acetique)	Diese Säuren bestehen sämtlich aus Kohlenstoff, Hydrogen und Oxygen, deren quantitative Verhältniß dieser Bestandtheile auseinander in den verschiedenen Säuren, so noch nicht alles ausgemacht werden
Ameisensäure (Acide formique)	
Boraxsäure (Acide boracique)	
Arsenikäure (Acide arsenique)	
Citronensäure (Acide citrique)	
Weinsteinsäure (Acide tartrique)	
Gallussäure (Acide gallique)	
Benzoesäure (Acide benzoique)	
Bernsteinsäure (Acide succinique)	
Honigsteinsäure (Acide mellitique)	
Milchsteinsäure (Acide lactique)	

c. DRITTE GATTUNG.

Das Oxygen ist mit drei unzerlegten Stoffen verbunden.

CHARAKTERISTIK: sie verhalten sich im wie die Säuren der zweyten Gattung, bilden aber bei ihrer Zerlegung durch Venus Ammoniak, und lassen sich ebenfalls durch Veränderung der Verhältnisse zwischen ihren Bestandtheilen, in Basen verwandeln.

	BESTANDTHEILE.
Milchzuckersäure (Acide sacho-lactique)	Diese Säuren bestehen ebenfalls aus Kohlenstoff Hydrogen, Azot und Oxygen. Die quantitative Verhältniß dieser Bestandtheile ist noch nicht bestimmt worden.
Aepfelsteinsäure (Acide malique)	
Fettsäure (Acide sebacique)	
Blausäure (Acide prussique)	

B. *Enthalten kein Oxygen.*

d. VIERTE GATTUNG.

CHARAKTERISTIK: werden durch Oxygen nicht, so bald sie an eine Basis gebunden sind. Bis jetzt ist nur eine einzige der dieser Säuren bekannt.

Hydrothionsäure (Acide hydrothionique)

Die Bestandtheile dieser Säure sind Schwefel und Hydrogen.

ANMERKUNG. Man zählte diesen Körper sonst nicht zu den Säuren und nannte ihn geschwefeltes Wasserstoffgas (Gaz hydrogène sulfuré) allein es besitzt alle Eigenschaften einer Säure, wie der berühmte Berthollet gezeigt hat. Es rothet die blauen Pflanzenpigmente, verbindet sich mit Alkalien, Erden und Metalloxyden. Zersetzt die Salze, schlägt den Schwefel aus seiner Auflösung in Salpetersäure u. s. w. Deswegen stehe ich ihn den Säuren bei.

II. IHRE MISCHUNG IST NOCH UNBEKANNT.

e. FUENFTE GATTUNG.

CHARAKTERISTIK: sie lassen sich durch verbrennliche Körper nicht zerlegen und nur Zeit durch die Basen nicht zersetzen lassen.

	BESTANDTHEILE.
Flußsäure (Acide fluorique)	Unbekannt.
Boraxsäure (Acide boracique)	Unbekannt.
Salzsäure (Acide muriatique)	Unbekannt.
Oxydirte Salzsäure (Acide muriatique oxigéné)	Salzsäure und Oxygen.

Folgende Säuren werden von einigen Chemikern als besondere Säuren betrachtet, aber es ist noch nicht von allen erwiesen, ob sie wirklich von andern Säuren verschieden sind, und von einigen weiß man es mit Gewißheit, daß sie mit andern ganz übereinkommen.

Arseniksäure (Acide fumique) ist nämlich Citronensäure in Folge einer Verbindung von Aepfelsäure und Essigsäure. Ebenso hat man sie für eine besondere Säure gehalten.

Kampfersäure (Acide camphique). Wird sich wahrscheinlich bei genauerer Untersuchung wie die vorige verhalten. Sie ist in der Pappe der Seidenwürmer in einem eigenen Behältnisse in der Nähe der Aftern enthalten, und vor der Verwandlung mit einer in der Puppe selbst ec.

Milchsäure (Acide lactique). Scheint nichts anders als eine mit etwas Essigsäure und Kali verunreinigte Essigsäure zu seyn. Scheele fand sie zuerst in der saueren Molken.

Zuckersäure Säure (Acide saccique), wird durch mehrere Destillation aus Milchzucker gewonnen, und soll auch Berthollet eine eigenthümliche Säure seyn. Thenard untersuchte sie letzthin vor kurzer Zeit sehr genau, und fand, daß sie nichts anders ist, als eine Essigsäure, welche aus dem thierischen Zuckerstoffe sich bildende thierische Materie aufgelöst enthält. Von dieser letztern rührt die Eigenschaft her, verschiedene Metalloxydsalzen einen zu schlagen.

Brenzlige Hefensäure (Acide pyro-ligneux), wird durch mehrere Destillation aus dem Holze gezogen, und nämlich eine mit brenzlichem Oel verunreinigte Essigsäure ist sie.

Brenzlige Weinsteinsäure (Acide pyro-tartareux), wird durch mehrere Destillation aus dem Weinstein gezogen, und ist nämlich Essigsäure.

Brenzlige Zuckersäure (Acide pyro-saccique), entsteht durch die mehrere Destillation des Zuckers, des Gummi, der Stärkmehls u. s. w. und ist nämlich Essigsäure.

Kampfersäure (Acide camphorique), ist gar nicht von der Benzoesäure verschieden.

Essigte Säure (Acide acetous), ist von der Essigsäure blos durch das beigemischte Wasser unterschieden.

Chlorindensäure. Diese will Deschamps aus der gelben Chlorinde erhalten haben. Allein ihre Eigenthümlichkeit ist noch sehr problematisch.

Eichenrindensäure. Die Basis, womit die Riegel Rinde und Sauerkleie der Eichenrinde (Cortex quercinus L.) bedeckt sind, spaltete dann einer Behandlung saures sich aus, dem einige Chemiker unter dem Namen Eichenrindensäure aufgestellt haben. Vauquelin hat aber gezeigt, daß diese Flüssigkeit nichts anders als eine Mischung aus Essigsäure, Kyrotäure und Saurekleesäure ist.

	Schwefelsäure.	Schwefligte Säure.	Salpetersäure.	Salpetrigte Säure.	Phosphorsäure.	Phosphorigte Säure.	Kohlensäure.	Arsenicksäure.	Arsenigte Säure.	Molybdänsäure.	Wolframsäure.	Chromsäure.	Essigsäure.	Saure Essigsäure.	Kyrotäure.	Aepfelsäure.	Citronensäure.	Weinsteinsäure.	Gallussäure.	Benzoesäure.	Bernsteinsäure.	Honigsteinsäure.	Milchzuckersäure.	Milchsteinsäure.	Schleimsäure.	Fettsäure.	Blausäure.	Blausäure.	Hydrothionsäure.	Fettsäure.	Boraxsäure.	Salzsäure.	Oxydirte Salzsäure.
Aggregatzustand des Stoffes in der gewöhnlichen Temperatur.	Tropfbarflüssig.	Gasförmig.	Tropfbarflüssig.	Dampfförmig.	Fest, krystallisirt.	Dampfförmig.	Gasförmig.	Fest.	Fest; durchsichtig wie Glas.	Fest; pulverartig.	Fest; pulverartig.	Fest; in länglichten rhomboidalen Krystallen.	Fest; aber er in einer Temperatur von 80° Fahrenh.	Fest; in prismatischen weißen Krystallen.	Fest; in paleorangefarbiger Gestalt.	Tropfbarflüssig.	Fest; in rectangulären prismatischen Krystallen.	Fest; in verschiedenen elastischen selbstständigen Krystallen.	Fest; in cubischen prismatischen zugespitzten Krystallen.	Fest; in silberweißen glänzenden nadelförmigen Krystallen.	Fest; in dreiseitigen geraden rhomboidalen abgestumpften Säulen.	Fest; krystallisirt in sechsseitigen hexaëdrischen rhomboidalen Säulen.	Fest; krystallisirt in sternförmigen Nadeln.	Fest; weiß und pulverartig.	Zerfließlicher Krystall.	Tropfbarflüssig.	Fest.	Dampfförmig.	Gasförmig.	Gasförmig.	Fest; in glänzend schuppigen Krystallen.	Gasförmig.	Dampfförmig, gelb gefärbt. In niederer Temperatur krystallisirt sie aus.
Verhalten der Säure zum Wasser.	Löst sich in allen Verhältnissen mit Wasser vereinigt und zieht es aus der Atmosphäre an.	Löst sich in allen Verhältnissen mit Wasser vereinigt.	Löst sich in allen Verhältnissen mit Wasser vereinigt.	Wird von dem Wasser absorbirt.	Löst sich leicht in Wasser, mit welchem sie sich zerfließt.	Wird von dem Wasser schnell absorbirt.	Wird von kaltem Wasser absorbirt, von heißem aber nicht.	Löst sich in zwei Theilen Wasser, und zieht die Feuchtigkeit auch aus der Luft an.	Fordert 15 bis 20 Theile kochendes Wasser zur Lösung.	Fordert zur Lösung gleich Theile kaltes Wasser.	Fordert zu Theile siedendes Wasser zur Lösung.	Löst sich leicht im Wasser.	In allen Verhältnissen mit dem Wasser vereinigt.	Löst sich in gleich viel siedendes Wasser.	Löst sich leicht in 2 Theilen siedendes Wasser.	Löst sich nur in sehr viel siedendem Wasser.	Löst sich nur in einer gewissen Menge siedendes Wasser.	Löst sich leicht in Wasser.	In kaltem Wasser schwer und in heißem leicht löslich.	In drei Theilen kochendem Wasser löslich.	Löst sich leicht im Wasser.	Löslich im kochenden Wasser.	In sehr geringer Menge im kochenden Wasser.	In kaltem Wasser schwer auflöslich.	In allen Verhältnissen mit dem Wasser vereinigt.	Löst sich schwer im Wasser.	Wird von kaltem Wasser nicht absorbirt.	Wird von kaltem Wasser leicht absorbirt.	Wird von Wasser schnell absorbirt.	Im Wasser sehr schwer zu lösen.	Wird von Wasser schnell absorbirt.	Wird von kaltem Wasser schnell absorbirt.
Verhalten der Säure im Feuer und gegen brennbare Körper.	Löst sich bei starkem Feuer verflüchtigen.	Im Feuer flüchtig und verwandelt sich in Gas.	Löst sich in der Hitze.	Im Feuer flüchtig.	Sehr feuerbeständig, und Hitze in einer durchsichtigen breiten Masse.	Flüchtig.	Flüchtig.	Im strengen Gluthfeuer beständig: im heftigen Feuer verwandelt sie sich wieder in arsenigte Säure.	Löst sich im strengen Feuer verflüchtigen.	Verflüchtigt sich in starkem Feuer und sublimirt sich in Nadeln.	Feuerbeständig.		Löst sich destillire.	Schleimirt sich zum Theil, und wird zum Theil zersetzt.	Wird zersetzt.	Wird zersetzt.	Wird zersetzt.	Wird zersetzt.	Schleimirt sich bei mäßigem Feuer.	Schleimirt sich bei mäßigem Feuer,	Schleimirt sich in mäßigem Feuer.	Verflüchtigt sich, wird aber doch die hat gefarbt.	Verflüchtigt sich.	Wird zersetzt.	Wird im Feuer zersetzt.	Verflüchtigt sich.	Wird zersetzt.	Flüchtig.	Flüchtig.	Flüchtig.	Schmelzen zu einer glasähnlichen Masse und ist sehr feuerbeständig.	Flüchtig.	Sehr flüchtig.
Verhalten der Säure durch Alkohol.	Löst sich damit und verwandelt denselben durch Destillation in Schwefeläther.	Wird von demselben absorbirt, ohne ihn zu verändern.	Zersetzt denselben, vielleicht auch Entmischung und erzeugt Salpeteräther.	Verändert den Alkohol nicht.	Löst sich in demselben, aber nicht zu verändern, und erzeugt keinen Phosphoräther.	Löst sich damit, aber nicht zu verändern.	Löst denselben nicht verändert.	Löst sich damit, ohne ihn zu verändern, aber eine Veränderung hervor zu bringen.	Löst sich in demselben, bringt aber keine Veränderung hervor.	Löst sich nicht in demselben auf.	Löst sich damit, ohne ihn zu verändern.		Geht mit demselben einen Essigäther.	Löst sich damit, ohne ihn zu verändern.		Löst sich damit, ohne ihn zu verändern.	In großer Menge damit destillirt, bildet sich Benzoëäther. Bringt keine Veränderung hervor.	Löst sich in demselben, gibt aber keinen Aether.	Löst sich in demselben, ohne ihn zu verändern.	Löst sich nicht und gibt in großer Menge digerirt einen bittern Aether.	Löst sich damit, ohne ihn zu verändern.		Löst sich nicht.	Löst sich nicht.	Löst sich	Löst sich damit vereinigen und lässt sie wieder als Fett.		Wird durch sie abgeschieden.	Wird durch sie abgeschieden.	Löst sich, und scheint mit ihm gewissen Aether zu bilden.	Löst sich in sehr geringer Menge.	Wird abgeschieden.	Wird abgeschieden und in verdünnte Schwefelsäure verwandelt.

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
http://digital.slub-dresden.de/ppn329980572/14
gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG