

Præterea ex observationibus, pristinis seculis plus morabatur in primo quadrante Eclipticæ quam in secundo & in 2. pluribus dieb⁹ quam in 4. & in 4. pluribus quā in 3. At ex observationibus ab A. Ch. 1400. circiter, huc usque, evidens est, plus morari Solem in 2. quadrante Eclipticæ. Tribuitur autem hæc diversitas ab Astronomis Apogeo Solis, quod in quo quadrante est, in eo etiam plus Sol moratur. Hujus vero locus. S. S. S. lentissimo licet gradu movetur, & ab initio mundi ex V in ☽ secesit.. Ex quo etiam factum ut anno Tropico inæqualitatem adscripserint aliqui quæ tamen differentia ex subtilitate Mathematica orta inter insensibiles rejici potest, præsertim cum Apogei motus juxta Ricc. non absolvat circulum nisi annis 21245.

§. 13. Juxta hunc circulum totum cœlum in duo hemisphæria dividitur ; licet enim hoc officium priùs etiam Äquatori attribuerimus, huic tamen magis convenit, sic enim australes stellæ perpetuo tales, Septentrionales itē semper in suo hemisphærio manent, cum latitudo earum quæ ab Ecliptica numeratur, varietur nunquam, quod secundum Äqu. non fit. Et quia hic circulus norma est motus veri, hinc etiam omnes longitudines in eo numerantur sumendo initium à principio. V. S. S. Idem circulus est causa inæqualitatis dierum & noctium in sphæra Obl. & vicissitudinis tempestatum ; Item varietatis ortuum & occasuum. Quæ omnia prolixius persequi instituti ratio non permittit ; sed hic subsistentes.

*Debitas Deo laudes, quas E⁹ cœli enarrant,  
devoto corde dicimus !*



Arthm 188, 36

