

pri sit aptū. Sciendum tamen lac mulieris aut asi-
 e, non semper conuenire hecticis, imò aliquando
 acidum, siue cui butyrum detractum est, iisdem
 tilius est, quàm lac mulieris aut asinæ. Primo, quā
 cū hectica est solutio uentris. Deinde quā eo est
 spatio de coagulatione lactis in stomacho, uel de
 dore uehementis febris, uel quando stomachus per
 cholericus est, ut lac in cholera cōuertat. Tertio,
 quando cum hectica coniungitur putrida, et præci-
 uè, cū in inferiorib. fuerint multæ oppilationes,
 lac acidū restringit uentrē, nec facile in cholera
 uertitur, ut cui butyrū, per quod facile inflamma-
 ur, exemptū sit. Nec in putrida febre eadē ratione
 eile putrescit. Quarto, si stomachus fuerit sordi-
 us, nā in hoc lac facilimè corrumpitur. Quinto si
 eticus abominetur lac dulce ac integrum, acidum
 erò siue à butyro seiunctū non exhorreat. Tertiu
 t, lac uaccinū et ouiu magis nutrire, quia alijs pin-
 uiora sunt, & crassiora, ut dicit Auicenn. 2. Can.
 ap. 444. Lac inquit, omnis animalis, cuius ræo-
 natio prolixior est prægnatione mulieris, est ma-
 : quapropter proportionabile est illud, quod pro-
 imū est, sicut uaccinū. Rhaz. uerò 3. ad Mans. cap.
 5. sic inquit: Vaccinū lac omni lacte cuiuslibet al-
 erius animalis crassis iudicetur, quod etiā omnib.
 orporis pinguedinē adipisci uolētibus cōuenictus
 xistit. Quartū est, lac nocere febricitātib. et caput
 olentib. cuius causa adsignata est cap. 7. DE